

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ (МИНТАҚАВИЙ) МАРКАЗИ

**“БИОЛОГИЯ”
йўналиши**

**“ЎСИМЛИКЛАР БИОТЕХНОЛОГИЯСИ”
модули бўйича
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА**

Тошкент – 2016

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ МИНТАҚАВИЙ МАРКАЗИ**

“ЎСИМЛИКЛАР БИОТЕХНОЛОГИЯСИ”

модули бўйича

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент 2016

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2016 йил 6 апредидаги 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчи:

ЎзМУ, Буриев З.Т.
Нарбабаева Р.Б.

Тақризчи:

Byoung Ryong Jeong
Professor and Doctor of
Philosophy in Horticulture
Department of Horticulture
Gyeongsang National
University **Republic of
Korea**

**Ўқув -услубий мажмуа ЎзМУнинг Университет Кенгашининг 2016 йил 7сентябрдаги
1-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.**

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	11
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	20
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ	49
V. КЕЙСЛАР БАНКИ	51
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ	53
VII. ГЛОССАРИЙ	54
VIII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:	59

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Мазкур дастур ривожланган хорижий давлатларнинг олий таълим соҳасида эришган ютуқлари ҳамда орттирган тажрибалари асосида “Биология” қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналиши учун тайёрланган намунавий ўқув режа ҳамда дастур мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди.

Ўсимликлар биотехнологияси ўқув фанини ўзлаштириш жараёнида педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчилари биотехнология ва Ўсимликлар биотехнологиясини пайдо бўлиши, ўсимлик тўқималари култураси, озуқа муҳити таркиби, вектор дизайн ва конструкция, агробактерия орқали трансформация, микропротектли бомбардимон орқали трансформациялаш, трансформация қилинган тўқималарни регенерацияси ва селекцияси, хужайраларнинг хусусиятлари, йўналишлари, ҳамда тизимлари хақида тасаввурга эга бўладилар.

Тирик организмлардаги турли фермент системаларидан фойдаланиб, Ўсимлик биотехнологияси фани жуда катта тезлик билан ривожланаётган фан бўлиб, олимлар XXI аср фани деб қарамоқдалар. Ўсимликлар биотехнологияси усулларидан фойдаланиб янги навлар яратиш биотехнологиясини халқ хўжалиги, тиббиёт ва қишлоқ хўжалигига қўллаш истиқболларини биладилар ва улардан фойдалана олишади;

Модулнинг мақсади ва вазифалари.

Ўсимликлар биотехнологияси модулининг мақсади ва вазифалари:

-педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчиларини агробактерия орқали трансформация, микропротектли бомбардимон орқали трансформациялаш, трансформация қилинган тўқималарни регенерацияси ва селекциясини объект сифатида ўргатишдан иборатdir. Ген, оқсил ва ферментлар мухандислиги усулларидан микрохажм даражасида фойдаланиш. Тингловчилар ушбу фанни ўзлаштириш жараёнларда каллус тўқималарини селекция қилиш, трансген уруғларни скрининг қилиш GUS, GFP таҳлили борасида баъзи биологик усулларни қўллаш, каби технологик жараёнлар тўғрисида керакли билимга эга бўладилар.

Ўсимликлар биотехнологияси фанини ўқитишинин вазифаси педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчиларига ҳозирги замон ўсимликлар биотехнологияси ҳамда уларга чегарадош бўлган фанлар ютуқларига асосланган ҳолда хужайралар асосида янги технологик жараёнлар яратиш ва ўсимликлар биотехнологияси назариясининг асосларидан билим беришдан иборатdir. Ҳозирги кунда бу соҳани жадал суръатларда ривожланиши натижасида, замон талабига жавоб бера оладиган мутахассисларни тайёрлаш талаб этилмоқда. Шу сабабли педагог кадрларни

қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчиларига ўсимликлардан биотехнологик жараёнларда фойдаланиш йўлларини очиб бериш замонавий илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ёрдам беради ва бу фанни биология ва турдош фанлар соҳаларида педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсида билим олаётган тингловчиларга ўргатиш замон талабига мовофиқлиги билан ажратиб туради.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар.

“Ўсимликлар биотехнологияси” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- замонавий биотехнологиянинг ривожланиш йўналишлари ва ютуқлари;
- замонавий биотехнология усуллари ўрганиш мақсадларида биотехнологик изланишларнинг асосий йўналишлари;
- ген ва хужайра муҳандислиги ҳақида тасаввурга эга бўлиши;
- биотехнологиянинг молекуляр йўналишларини;
- ўсимлик ген муҳандислиги ва трансген ўсимликларни;
- ўсимликлар хужайра муҳандислиги ютуқларини, фермент ва оқсил муҳандислиги усуллари ҳақида **билимларга эга бўлиши**;

Тингловчи:

- Ўсимликлар биотехнологияси соҳасидаги муаммолар, энг сўнгти ютуқлар ва янги ишланмалар;
- Ўзбекистондаги биотехнология муаммоларини билиши ва улардан фойдалана олиши **кўникма ва малакаларини эгаллаши**;

Тингловчи:

- Ўсимликлар ва уларнинг манбаларидан оқилона фойдалана олиш;
- олинган натижаларни экспериментал ва статистик таҳлил қила олиш;
- Ўсимликлар биотехнологияси соҳасида янгиларни яратা олиш **компетенцияларни эгаллаши лозим**.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар.

“Ўсимликлар биотехнологияси” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;

- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерфаол таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги.

Ўсимликлар биотехнологияси фанини ўзлаштиришда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчилари биологиядан: микробиология ва вирусология, генетика, молекуляр биология, биохимия, биофизика, физиология, ботаника ва зоология конунлари ҳакида тушунчага эга булишлари керак. Биохимиядан - ферментатив реакциялар механизмлари, ишлаш жараёнлари; хужайра биологиясидан- хужайра тузилиши, хужайрада асосий жараёнларнинг кечиши, хужайраларнинг купайиши; молекулар биологиядан-ДНК ва РНК тузилиши, транскрипция, трансляция қонунлари, рибосомалар тузилиши, генетик код структура элементлари, замонавий компьютер техникиси замонавий услублар ёрдамида организмларда содир бўладиган мураккаб жараёнларни умумлаштириш учун етарли билим ва кўникмаларга эга бўлиши талаб этилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни.

– Республикализнинг иқтисодиёти фундаментал фанларнинг ривожланишига ва унинг ютуқларига ҳам боғлиқ. Ҳозирги замон биологиясининг кескин равишда ривожланувчи соҳаси бу биотехнология фанидир. Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар замонавий биотехнологияда хужайраларни ген ва хужайра муҳандислиги ҳакида тасаввурга эга бўлиши, биотехнологиянинг молекуляр йўналишларини, ўсимлик хужайра муҳандислиги соҳасидаги мавжуд муаммоларни баҳолашга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					
		Хаммаси	Аудитория ўқув юкламаси			жумладан	
			Жами	Назарий	Амалий машғулот	Кўчма машғулот	Мустакил тальим
1.	Кириш. Ўсимлик биотехнологиясининг асосий принциплари. Лаборатория хавфсизлиги қоидалари. Сток тайёрлаш.	4	4	2	2		
2.	Вектор дизайнни ва конструкция. Озуқа тайёрлаш ва ифлосланишни текшириш.	8	6	2	2	2	2
3.	Микропротектли бомбардимон орқали трансформациялаш. Агрокултура ўсиши, тўқималар нишонини тайёрлаш.	6	6	2	4		
4.	Трансформация қилинган тўқималарни регенерацияси ва селекцияси. Микро-ташувчи қопламани тайёрлаш, баллистик орқали ДНК кўчириш.	4	4	2	2		
5.	Ўсимликлар биотехнологияси маълумотларни тўплаш ва бошқариш. РНК ва VIGS. таҳлили	8	6	2	2	2	2
Жами:		30	26	10	12	4	4

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Кириш. Ўсимлик биотехнологиясининг асосий принциплари. Ўсимлик тўқималари култураси, озуқа муҳити таркиби.

Ўсимлик тўқималари култураси, озуқа муҳити таркиби. Озиқланиши. Фитогармонлар. Углеводлар ва гел турлари. Антибиотиклар, хужайра озуқасини тайёрлаш ва сақлаш. Ифлосланиш муаммолари Ўсимлик анатомияси ва ривожлантириш шархи. Эксплант манбалари. Хўжайралар ҳосил бўлиши ва хўжайра турлари.

2-мавзу: Вектор дизайнни ва конструкция, Вектор таркиблари. Промоторлар ва инконсерлар.

Селекция ва Скрининг қилувчи маркерлар.

Бактерия хужайралари ва плазмида ажратиш. Агробактерия орқали трансформация. Агробактерия шархи. Бир ва иккипаллалиларни протоколлари қўш векторлар. Агробактерия хужайралари ва трансформацияси. Ўсимликни атсептик ўстириш. Озуқа тайёрлаш ва ифлосланишни текшириш.

3-мавзу: Микропротектли бомбардимон орқали трансформациялаш ДНКни кўчириб ўтказиш. ДНКни кўчириш параметрлари. Микро- ташувчини трансформацияга тайёрлаш.

Микро-ташувчини трансформацияга тайёрлаш. Тўқималар нишонини тайёрлаш. Хўжайрани озиқланиши ва эксплант ажратиш. Каллусларни кўчириш бактерия хўжайраларини ўсиши плазмида ДНК ажратиш. Арабидопсис ва жўхори трансформацияси. Агрокултура ўсиши, тўқималар нишонини тайёрлаш.

4-мавзу: Трансформация қилинган тўқималарни регенерацияси ва селекцияси. Озуқа манипуляциялари. Каллусни кўчириш ва селекция скрининг қилиш.

Скрининг маркерлар билан тест ўтказиш. Регенерация ва трансген ўсимлик. Молекуляр генетик ва экспрессия таҳлили. Фитотрон ва унда трансген ўсимликларни ўстириш. Микро-ташувчи қопламани тайёрлаш, баллистик орқали ДНК кўчириш.

5-мавзу: Ўсимликлар биотехнологияси маълумотларни тўплаш ва бошқариш.

Ўсимликлар биотехнологияси маълумотларни тўплаш ва бошқариш. Маълумотлар базаси. Эксперимент дизайнни ва анализи маълумотларни. Хулосалаш ва талқин қилиш. Ўсимлик биотехнологиясини ривожланиши ва муаммолари. Ҳосил бўлган системанинг таъсири (Risk assessment. РНК ва VIGS. Фармацевтика, хатарни таҳлил қилиш, янгиликни тадбиқ қилиш.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

Ўқув машғулотларни ташкил этиш бўйича кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан кўрсатма ва тавсиялар ишлаб чиқилади. Унда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчилари асосий маъруза мавзулари бўйича олган билим ва кўнималарини машғулотлар олиб бориш жараёнида янада бойитадилар. Шунингдек, дарслик ва ўқув қўлланмалар асосида тингловчилар билимларини мустахкамлашга эришиш, тарқатма материаллардан фойдаланиш, илмий мақолалар ва тезисларни тайёрлаш орқали тингловчилар билимини ошириш, мавзулар бўйича кўргазмали қуроллар тайёрлаш ва бошқалар тавсия этилади.

Амалий машғулотларда тингловчилар ўсимликлар биотехнологияси асосларидан олган назарий билимларни мустахкамлаши, амалий машғулотлар бажарилиши мумкин. Олинган билим ва кўнималар дарсликлар, қўлланмалар, маъруза материаллари, илмий мақола ва тезислар ёрдамида, тарқатма материаллардан фойдаланилган холда мустахкамланади.

1-амалий машғулот: Бактерия ҳужайралари ва плазмида ажратиши.

Ўсимлик ҳужайра ва тўқималарини *in vitro* усулида култиватция қилиш учун озуқа мухитини тайёрлаш. Озуқа мухитларни тайёрлашнинг протоколи. Ўсимликларнинг изолирланган ҳужайра ва тўқималари күлтуралари билан ишлашда ўтказиладиган стерилизация усуллари.

2-амалий машғулот: Каллус тўқима күлтураси.

Ҳужайралар ҳосил бўлиши жараёнларининг таҳлили. Тамки каллус тўқимасили олиш ва унинг субкултиватцияси. Каллус күлтураларининг морфологик ва ўсиш кўрсаткичларини аниқлаш.

3-амалий машғулот: Ҳужайра суспензиялари күлтураси.

Суспензион күлтурани олиш ва субкултиватцияси. Ҳужайра хаётчанлигини баҳолаш ва суспензион күлтураларнинг агрегирланиш даражаси.

4-амалий машғулот: Ўсимликлар ҳўжайраси күлтурасидаги дифференциацияси.

Тамаки ҳужайраси күлтурасидаги морфогенезга йўналтирилган фитогормонларнинг таъсири.

5-амалий машғулот.

Ўзбекистонда ўсимлик махсулотлари етиштиришда амалга ошириладиган биотехнологик жараёнлар.

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИНГ ШАКЛИ ВА ТАРКИБИ

Тингловчи мазкур фан бўйича мустақил таълим тайёрлаши мобайнидаги мажбуриятлари:

- фан бўйича адабиётлар ва қўлланмалар боблари ва таркибини ўрганиб чиқиши;
- маъruzанинг маълум қисмини тарқатма материаллар ёрдамида ўзлаштириш;
- маҳсус адабиётларни қўллаган холда модул мавзулари устида ишлаш
- илмий-тадқиқот ишларини бажариш билан боғлиқ бўлган фаннинг бўлимларини чуқур ўрганиш;
- Ўқитишниниг интерфаол усулларидан, масофавий таълимдан фойдаланиш.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қўйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сухбатлари (кўрилаётган лойиха ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хуносалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (лойиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Ўқув-топшириқ турлари	Максимал балл	Баҳолаш мезони		
			2,5	"аъло" 2,2-2,5	"яхши" 1,8-2,1
1.	Тест-синов топшириқларини бажариш	0,5	0,4-0,5	0,34-0,44	0,28-0,3
2.	Ўқув-лойиха ишларини бажариш	1	0,9-1	0,73-0,83	0,56-0,7
3.	Мустақил иш топшириқларини бажариш	1	0,9-1	0,73-0,83	0,56-0,7

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

«Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи.

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қилади;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурый ахборотлр билан тўлдирилади ва

Намуна:

Нанозарраларнинг тирик организмларда қўлланилиши

Одам организмида		Ҳайвон организмида		Ўсимлик организмида	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

“Кейс-стади” методи.

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетидаги амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қўйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари.

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблиқ иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гурӯҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсикларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гурӯҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс. ДНК дан тайёрланган наноқурилма (Гарвард университети олимлари яратган) ва “Ўргимчак” нанороботи (Колумбия университети олимлари яратган) ўзларининг кимёвий таркиби билан фарқланади. Амалиётда кўпроқ уларнинг қайси биридан фойдаланиш қулайроқ?

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:


- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарған асосий сабабларни белгиланғ (индивидуал ва кичик гурұхда).
- Амалиётта икки нанороботни қўллаш бўйича афзалликлар ҳақидаги маълумотларни жамланг (жуфтликлардаги иш).

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзууни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯхий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна.

Фикр: “Ўсимликлар биотехнологияси тушунчаси ва унинг тарихи”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Ассесмент” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш қўрсаткичи ва амалий кўникмаларини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўникмалар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент” лардан маъруза машғулотларида тингловчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

Намуна. Ҳар бир катакдаги тўғри жавоб 5 балл ёки 1-5 балгача баҳоланиши мумкин.



Тест

- 1. Амплификация нима?**
- A. РНК молекуласини полимераза ферменти ёрдамида синтези
 - B. Генни (ДНК молекуласи ёки унинг фрагменти) изчилик билан кўп маротабалаб нусҳаланиши
 - C. ДНК молекуласининг водород боғлар ёрдамида боғланиши
 - D. ДНК дан РНК синтези



Қиёсий таҳлил

- Ампликон жараёнини таҳлил қилинг?



Тушунча таҳлили

- ДНК қисқармасини изоҳланг...



Амалий қўникма

- ПЗР қўйиш учун керакли тажрибаларни кетма-кетлиги бўйича бажаринг?

“Инсерт” методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод тингловчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билмларни ўзлаштирилишини енгиллаштириш мақсадида қўлланилади, шунингдек, бу метод тингловчилар учун хотира машқи вазифасини ҳам ўтайди.

Методни амалга ошириш тартиби:

- ўқитувчи машғулотга қадар мавзунинг асосий тушунчалари мазмунни ёритилган инпут-матнни тарқатма ёки тақдимот кўринишида тайёрлайди;
- янги мавзу моҳиятини ёритувчи матн таълим олувчиларга тарқатилади ёки тақдимот кўринишида намойиш этилади;
- таълим олувчилар индивидуал тарзда матн билан танишиб чиқиб, ўз шахсий қарашларини маҳсус белгилар орқали ифодалайдилар. Матн билан ишлашда талабалар ёки қатнашчиларга қуидаги маҳсус белгилардан фойдаланиш тавсия этилади:

Белгилар	1-матн	2-матн	3-матн
“V” – таниш маълумот.			

“?” – мазкур маълумотни тушунмадим, изоҳ керак.			
“+” бу маълумот мен учун янгилик.			
“–” бу фикр ёки мазкур маълумотга қаршиман?			

Белгиланган вақт якунлангач, таълим олувчилар учун нотаниш ва тушунарсиз бўлган маълумотлар ўқитувчи томонидан таҳлил қилиниб, изоҳланади, уларнинг моҳияти тўлиқ ёритилади. Саволларга жавоб берилади ва машғулот якунланади.

“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод тингловчилар ёки қатнашчиларни мавзу буйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу буйича дастлабки билимлар даражасини ташхис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;
- тингловчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки гурухли тартибда);
- тингловчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши ҳақида ёзма маълумот берадилар;
- белгиланган вақт якунига етгач ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тўғри ва тўлиқ изоҳини ўқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади;
- ҳар бир иштирокчи берилган тугри жавоблар билан ўзининг шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниқлайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

Намуна: “Модулдаги таянч тушунчалар таҳлили”

Тушунчалар	Сизнингча бу тушунча қандай маънени англатади?	Қўшимча маълумот
Biosensor	Биологик елиб чиқишига эга бўлган ва оптик ёки электрик ўзгартиришига олиб келувчи детектордан ташкил топган қурилма.	
Surfactant	Амфи菲尔 модда бўлиб, юзадан суюқлик тортилишини камайтиради.	

Phospholipid	Манфий зарядланган фосфат гурухини ўзида сақловчи липид.	
Hydrogel	Сувдан иборат полимер занжир.	
Kevlar	Ароматик полиамилдардан ташкил топган жудаям мустаҳкам толаларнинг бир тури	
Kinesin	Модда солинган микротрубкалар бўйлаб ҳаракатланувчи оқсиллар синфи.	
Lab-on-a-chip	Жудаям кам ҳажмдаги суюқлик намуналарини (бир неча пиколитр ҳажмли) текширувчи асбоб.	

Изоҳ: Иккинчи устунчага қатнашчилар томонидан фикр билдирилади. Мазкур тушунчалар ҳақида қўшимча маълумот глоссарийда келтирилган.

Венн Диаграммаси методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;
- навбатдаги босқичда иштирокчилар тўрт кишидан иборат кичик гуруҳларга бирлаштирилди ва хар бир жуфтлик ўз таҳлили билан гуруҳ аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

Намуна: Ўсимликлар биотехнологияси тушунчаси ва унинг тарихи. Фан сифатида ривожланиши



“Брифинг” методи

“Брифинг”- (инг. briefing-қисқа) бирор-бир масала ёки саволнинг муҳокамасига бағишлиланган қисқа пресс-конференция.

Ўтказиш босқичлари:

1. Тақдимот қисми.
2. Муҳокама жараёни (савол-жавоблар асосида).

Брифинглардан тренинг якунларини таҳлил қилишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, амалий ўйинларнинг бир шакли сифатида қатнашчилар билан бирга долзарб мавзу ёки муаммо муҳокамасига бағишлиланган брифинглар ташкил этиш мумкин бўлади. Тингловчилар томонидан олмб борилган тажрибалар натижаларини тақдимотини ўтказишида ҳам фойдаланиш мумкин.

“Портфолио” методи

“Портфолио” – (итал. portfolio-портфель, ингл.хужжатлар учун папка) таълимий ва касбий фаолият натижаларини аутентик баҳолашга хизмат қилувчи замонавий таълим технологияларидан ҳисобланади. Портфолио мутахассиснинг сараланган ўқув-методик ишлари, касбий ютуқлари йиғиндиси сифатида акс этади. Жумладан, тингловчиларнинг модул юзасидан ўзлаштириш натижасини электрон портфолиолар орқали текшириш мумкин бўлади. Олий таълим муассасаларида портфолионинг қуидаги турлари мавжуд:

Фаолият тури	Иш шакли	
	Индивидуал	Гурухий
Таълимий фаолият	Талабалар портфолиоси, битирувчи, докторант, тингловчи портфолиоси ва бошқ.	Талабалар гурухи, тингловчилар гурухи портфолиоси ва бошқ.
Педагогик фаолият	Ўқитувчи портфолиоси, раҳбар ходим портфолиоси	Кафедра, факультет, марказ, ОТМ портфолиоси ва бошқ.

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

**1-мавзу: Ўсимлик биотехнологиясининг асосий принциплари.
Ўсимлик тўқималари култураси, озуқа муҳити таркиби.**

РЕЖА:

- 1.1. Ўсимлик тўқималари култураси тарихи.**
- 1.2. Озуқа муҳит компонентлари ва уларнинг тайёрланиши.**
- 1.3. Ўсимликларни ўстириши регуляторлари.**
- 1.4. Витаминлар, углеводлар ва гекситлар.**

Таянч иборалар: трансген ўсимлик гени ўзгартирилган ўсимликлар, биотехнологик культура, *in vitro*, Ўсимликларни ўстириши регуляторлари. яра-шифо, каллус, озиқланиши фитогармонлар, углеводлар, гел, антибиотиклар, эксплант, меристематик тўқималар.

1.1 Ўсимлик тўқималари култураси, тарихи.

Озуқа муҳити таркиби. Озиқланиши. Фитогармонлар. Углеводлар ва гел турлари. Антибиотиклар, хужайра озуқасини тайёрлаш ва сақлаш. Ифлосланиш муаммолари Ўсимлик анатомияси ва ривожлантириш шархи. Эксплант манбалари. Хўжайралар ҳосил бўлиши ва хўжайра турлари.

Ўсимлик хужайраси *in vitro*, аксеник ёки стерил култура номлари билан ҳам аталади, улар амалий тадқиқотларда, шунингдек, тижорат мақсадида қўллаш муҳим ҳисобланади. Шунга қарамай, Стреет (1977) бу атамалар учун кўпгина чеклов ишлатишни тавсия этади, яъни ўсимлик тўқималарининг культураси учун одатда асептик хужайра культураси, тўқималар, органлар ва уларнинг компонентларидан фойдаланиб, *in vitro* физик ва кимёвий шароитлари остида белгиланади.

Балки, ўсимлик тўқималарининг культурасига биринчи қадам Хенри-Луюс Духамил ду Монсею томонидан 1756 йил қўйилган. У ўзининг янги изланишлар фаолияти давомида ўсимликларда яра-шифо, каллус ривожланишини кузатганди.

Шлейден (1838) ва Шванн томонидан хужайра назарияси кенг микроскопик тадқиқотлар туфайли, мустақил ва деярли бир вақтнинг ўзида кашф этилди.

Бу назарияни моҳияти шундан иборатки, хужайра бу функция ва структурали автономлик қобилиятига эга яхлит организм. Бу ғоя бир неча тадқиқотчилар томонидан синалган ва Вучтинг (1878) ишида каллус шаклланиши ва ўсимлик сегментларининг бўлиниш доирасида балки муҳим

бўлгандир. У бир илдиз сегмент юқори қисми куртаклари ва пастки учи ҳар доим каллус тўқималарини ҳосил қилган ёки жуда юпқа ўлчамли сегментлардан мустақил илдизлар олишга эришганини маълум қилган эди.

У қутбли ривожланишини кўрсатиб берди ва бу хужайралар вазифаси эканлигини тан олди, ҳамда уларнинг жойлашуви кесилган жойларга яқинлиги маълум бўлди. Дастребки ўсимлик тўқималарининг культураси учун асосий назария Готлиб Хаберландт томонидан 1902 йилда таклиф этилган, яъни унинг тажрибалари тўқималар ягона хужайраданлиги ҳақида эди.

Готлиб Хаберландт бу ҳақида шундай деган эди “Менинг изланишларим, юқори ўсимликларнинг вегетатив хужайраларидан тўқималар ажратиб олиш ҳаракатлари тизимсиз ташкил қилинган эди. Бироқ, бундай культура тажрибалар натижалари бошланғич организм эга бўлган хужайра имкониятлари ва хусусиятлари ҳақида қизиқарли тушунчларни намоён қилиш керак. Бундан ташқари, кўп хужайралари бутун организм хужайраларининг ички-муносабатлар ва бир-бирини тўдирувчи таъсиrlари ҳақида маълумот беради”.

Унинг эксперементлари фотосинтетик япроқ хужайраларидан ва бошқа функцияли ҳар хил хужайралар билан ажратилганлари муваффақиятсиз бўлган бўлсада, аммо шунга қарамасдан у шундай деб башорат қилган эди. “Ривожланган вегетатив хужайралардан сунъий эмбрион етишириш мумкин”. У шу тариқа аниқ тотипотентлик (бир хужайрадан ҳосил бўлган ҳар хил хужайраларни бўлиниш қобилияти) концепциясига асос солди ва кейинчалик шуни таъкидладики, бу ”ажратилган ўсимлик хужайраларини озуқа муҳитида ўстириш техникасини ўрганиш янги эксперементларни муҳим муоммоларини хал қилишга имкон беради”. Ўша 1902 йилги унинг дастребки тажрибаси асосида Хаберландт олдин ва кейин ҳам ҳақли равишда “ўсимлик тўқималари культурасининг отаси” деб тан олинган эди.

Ўсимлик тўқималарининг культураси ҳақидаги дастребки маълумотларни батафсил Ваёт (1963), Божвани ва Раздан (1983) ва Гаутрет (1985) лар ишларида кўриш мумкин. Котт (1922), Хаберландт талабаси ва Роббин (1922) лар бошқача усуулларни қўллаб, илдиз учларидан ажратган хужайраларини ўстиришда муваффақиятга эришишди. Бу усул Ваёт (1934) томонидан помидор илдиз учларининг номаълум хужайраларини, экспланлар меристематик хужайраларини қўлланиши туфайли муваффақият қозонишга олиб келди.

Кейинги тадқиқотлар натижасида илдиз культураси учун тўлиқ белгиланган озуқа муҳитида ўстиришига рухсат этилди. Бундай илдиз культураси дастреб вирусли тадқиқотлар ва кейинчалик физиологик тадқиқотлар учун муҳим восита сифатида фойдаланилган. Бундан ташқари, Лоо (1945) ва Болл (1946) томонидан куртак культураси ҳам яхши натижаларни берди. Эмбриогенез культураси ҳам XIX асрнинг дастребки йилларида, яъни Ханнинг 1904 йилда карам ва 1906-йилда Бровнинг арпа культураларидан эмбрионларни олиниши билан бошланган эди (Моннер 1995). Эмбриогенез культураси муваффақиятли давом этиб, *Linum perenne* ва *L. austriacum* ўсимликларини ўлик уруғларида ҳам ҳал қилинди. Тукеу (1934) айрим эртапишар мевали дараҳт турларининг тўлиқ эмбрионал ривожланиши учун *in vitro* культураси татбиқ этди, бу эса *in vitro* соҳасининг ривожланишидаги

дастлабки изланишлардан бири эди. Бу янгилик ўсимликларни барвақт ўстириш имконини берди. Биринчи ҳақиқий ўсимликлар тұқималар күльтураси Гаутрет томонидан (1934, 1935) *Acer pseudoplatanus* камбий тұқималаридан олинган. У, худди шунингдек *Ulmus campestre Robinia pseusing* ва *Salix capraea* ларнинг бир хил экспланларини Кпор әритмасининг агарли қаттиқ озуқа мұхитида глюкоза ва цистеин гидрохлоридлардан фойдаланиб, юқори натижага әришди. Кейинчалик индол сирка кислота ва құшымча В витаминлар имкониятлари сабзи илдиз тұқималари учун күп ёки оз бўлиш кераклигини бир вақтнинг ўзида Гаутрет (1939) ва Нобекоурт (1939) лар ҳамда *Nicotiana glauca* ва *N. langsdorffii* гибридларининг шиш тұқималари билан қайсики ауксин талаб қилинмаган ҳолатда ҳам бу тұқималарнинг давомли ўсиши мумкинлигини ҳаттоқи ҳар хил илдиз ва куртаклар ҳосил қилишини Ваёт (1939) томонидан исботланди. Бирок, барча дастлабки экспланлар бошланғич меристематик тұқималар олгунча фойдаланилади.

Шундай бўлса-да, бу кашфиётлар *in vitro* күлтурадан фойдаланган ҳолда кейинги йилликларда белгиланган босқичда сезиларли даражада ошади.

1.2 Озуқа мұхит компонентлари ва уларнинг тайёрланиши.

Тұқималар күльтурасида озиқа мұхитини танлаш ёки ривожлантириш муваффақиятга әришиш учун мұхимдир. Битта озиқа мұхити барча ҳұжайраларнинг ўсишига ёрдам бермайды ва бир эксплантни ҳар хил ўсиш жараёнларида озуқаны тез-тез алмаштириш керак бўлади. Бир манба қидируви тегишли озуқа мұхитни танлаш учун фойдаладир. Гарсия ва бошқалар (2011) самарали ўсимлик ўстириш регуляторлари учун, асосий озуқа учун тузли таркиблар, натижалар учун статистик анализларига фойдали қўлланмасини тақдим этди. Худди шу тарзда, Ниедз ва Эванларнинг (2007) MS анорганик тузларини эксплант ўсишига таъсирларини ўрганиш учун ўқув қўлланмасидан фойдаланиш мумкин. Агар қўлланма ўсимликтага хос бўлмаса, мос озуқаны ривожлантириш синов ва хатоликларга асосланган бўлади.

Ушбу ёндашувда озуқанинг ривожланиши хужайралар күлтурасининг тузилишига боғлиқ бўлади. Бу қўлланмамиз муайян мақсадда яъни бошланғич каллус, соматик эмброгенез, чанг күльтураси ёки куртак кўпайтириш учун озуқа мұхитини ривожлантиришдаги бошланғич фойдали маълумот бўлиб хизмат қиласи.

Умуман олганда озуқа мұхити таркибларига анорганик тузлар ва органик бирикмалар худди ўсимликларни ўстирувчи регулятори каби, витаминлар, углеводлар, гекситлар ва гелларни ўз ичига олади. Бундан ташқари, озуқа мұхити шунингдек аминокислоталар, антибиотиклар ва табиий бирикмаларни ҳам қамраб олади.

Анорганик тузлар.

Анорганик тузли моддалар бир биридан фарқ қилиш мумкин. Овен ва Миллер (1992) лар тұқималар күльтурасида кенг ишлатиладиган озуқа мұхит таркибларини диққат билан текширди ва илк нашрлардаги кичик хатоликларга

ишора берган ҳамда бу 1-, 2 жадвалда анорганик туз компонентларининг одатдаги белгиланган микдорлари келтирилган.

1-Жадвал. Murashige ва Skoog нинг анорганик тузли эритма таркиби

№	Кимёвий номи	Концентрацияси (сток г/л)
1	Нитратли эритма	
	Аммоний нитрат (NH_4NO_3)	165.0
	Калий нитрат (KNO_3)	190.0
2	Сулфатли эритма	
	Магний сульфат ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	37.0
	<i>Рух сульфат</i> ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	0.86
	Мис сульфат ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)	0.0025
3	Тузли эритма	
	Калций хлорид ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	44.0
	Калий йодид (KI)	0.083
	Кобальт хлорид ($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)	0.0025
4	ПБМ ли эритма	
	Калий фосфат (KH_2PO_4)	17.0
	Натрий молибдат ($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	0.025
	Борий кислота (H_3BO_3)	0.620
	Натрий молибдат ($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	2.784
5	Na_2EDTAли эритма	
	Темир сульфат($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)	0.025
	Этилендиаминтетрасирка кислота (Na_2EDTA)	3.724

Murashige ва Skoog¹ (MS) (1962) моддаси энг кўп қўлланилган ва муҳим тузли озукларни таёrlашда фойдаланилган.

MS ни кенг қўлланилиши кўтилганди, аммо ўша пайтда *in vitro* усулида хўжайраларни ўстиришда ўсимлик тўқималаридан ажralаётган қўшимча туз

экстрактларини текширилаётганлиги сабабли, дастлабки натижалар яхши бўлмади.

MS моддаси тамаки хўжайралари ўсиши учун анорганик озуқаларда чеклов бермайди ва органик қўшимчалари масалан ачитқи экстракти, кокос ёнғоғи сути, казеин гидролизат ҳамда ўсимлик экстраклари ҳам кўп ўтмай анорганик тузлар учун муҳим манбаларга айланди.

MS Фан Цитата Индексида (Science Citation Index) MS 1962 классик номи билан белгиланди ва бу ўсимлик тўқималар культураси хақидаги кўплаб мақолаларда жуда кенг фойдаланилди. MS анорганик тузларининг бошқа туз моддаларидан фарқланиш хусусияти шуки, уларнинг таркиби нитратли, калийли, аммонийлиги бўлиши билан юқори ҳисобланади. 1-жадвалда MS анорганик туз эритмалари берилган бўлиб, бу туз эритлари охирги озуқа концентрациясига келгунча 100 марта тайёрланган ва ҳар бир эритмага фоиз ҳисобида 10 мл ҳар 1000 мл озуқага тайёрланади. NaFeEDTA эритмаси эса ёруғдан сақланиш учун жигарранг рангли шиша идишда ёки алумин фалга билан ҳимояланган бўлиш керак.

Жамланган туз эритмаларни ишлатишдан олдин сифати аниқланади ва озуқа тезроқ тайёрланади. Туз стоклари энг яхши музлатгичда сақланади ва бу бир неча ойлар учун барқарордир. Эритмалар ҳар доим шиша-дистилланган ёки минерал сувлардан тайёрланади ва барча стокларга аниқ ном ҳамда сана қўйилади.

Кимёвий Реагент- синф вакиллари (тозаловчи) ҳар доим максимал тозаликни таъминлаш учун ишлатилади. Бир қанча тузларни бирлаштириб, туз эритмаларини қисқартириш мумкин. Бу омиллар бирлаштирилган моддаларни турғун ва чукмага тушиш қобилиятидан далолат беради.

Одатда нитратли эритмалар чўқмали бўлади ва қўллашдан олдин кристаллари тўлиқ эригунча қиздирилади. Агар ҳар қандай эритмалар идиши туби булутли ва чўқмали кўринса, уларни ишлатиш мумкин эмас.

1.3 Ўсимликларни ўстириш регуляторлари.

Ўсимликларни ўстириш учун ишлатиладиган регуляторларининг тури ва концентрацияси фарқ қиласи шунга кўра бу хужайралар культураси учун нишон ҳисобланади. Шу асосда, 2-жадвалда ўсимликларни ўстиришда энг мос бўлган регуляторлари, уларнинг қисқартма шакллари ва уларнинг молекуляр оғирликлари кўрсатилган.

2-жадвал. Ўсимликлар тўқималар культурасида кўп қўлланиладиган асосий анорганик тузларни миллиграммда ҳар бир литр озуқа учун ишлатиш миқдори. (Овен ва Миллер (1992), B5^b Гамборг ва бошқалар. (1968), N6^c Нич and Нич (1969). WP^d Ллойд ва Мкковн (1980)).

Кимёвий формуласи	Ваёта (1963)	B5 ^b	N6 ^c	WP ^d
NH_4NO_3				400
$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$		134	463	
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	720	246	185	370

KCl	65			
KNO ₃	80	2528	2830	
KH ₂ PO ₄			400	170
K ₂ SO ₄				990
NaH ₂ PO ₄ ·H ₂ O	19	150		
Na ₂ SO ₄	200			
CaCl ₂ · 2H ₂ O		150	166	96
Ca(NO ₃) ₂ · 4H ₂ O	300			556
Na ₂ EDTA · 2H ₂ O		37.2	37.2	37.2
FeSO ₄ · 7H ₂ O		27.8	27.8	27.8
Fe ₂ (SO ₄) ₃	2.5			
H ₃ BO ₃	1.5	3	1.6	6.2
CoCl ₂ · 6H ₂ O		0.025		
CuSO ₄ · 5H ₂ O	0.001	0.025		0.25
MnSO ₄ · H ₂ O		10		
MnSO ₄ · 4H ₂ O	7		4.4	22.3
MoO ₃	0.0001			
Na ₂ MoO ₄ · 2H ₂ O		0.25		0.25
KI	0.75	0.75	0.8	
ZnSO ₄ · 7H ₂ O	3	2	1.5	8.6

Ауксин гурухига IAA, NAA, 2,4-D ёки IBA гормонлари кириб, улар энг кўп ўсимлик хужайраларининг бўлиниши ва илдиз ҳосил қилиши учун талаб қилинади. Ауксин юқори концентрацияларда морфогенезни тўхтатиш мумкин. 2,4-D ауксини кўпроқ бошланғич каллус ҳосил бўлиши учун ишлатилади, қолган IAA, IBA ва NAA лар эса илдиз индукцияси учун ишлатилади. Одатда ауксин эритмалари 200 мл ли мензуркага 10 мг тортилади, кейин 1 M ли NaOH ёки KOH (0.3 мл дан ошмаган ҳолда) дан бир неча томчилар қуилиб, модда кристаллари эругунча қиздирилади ва такрорий 90 мл икки марта дистилланган сув қўшилади ва миқдорли идишни хажмини 100 мл га кўтаради. Ауксин яна 95% ли этанолда ҳам қиздирилиши мумкин ва ҳажми суюлтирилади. Ауксиннинг калийли тузлари сувда яхши эрийдиган бўлади.

№	Ўсимликларни ўстириш регуляторлари	Қисқартманомлари	Молекуляр массалари
1	Abscisic acid	ABA	264.3
2	Indole-3-acetic acid	IAA	175.2
3	Naphthaleneacetic acid	NAA	186.2
4	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid	2,4-D	221.0

5	Indole-3-butyric acid	ИБА	203.2
6	6-Furfurylaminopurine	Кинетин	215.2
7	6-Benzyl-aminopurine	БАП	225.2
8	N6 (2-isopentenyl)-adenine	2iР	203.3
9	Trans-6-(4-hydroxyl-3-methylbut-2-enyl) amino purine	Зеатин	219.2
10	Gibberellic acid	GA3	346.4
11	Thidiazuron	ТДЗ	220.2

IAA эритмалари ҳафталик янги қиланади, чунки IAA ёруғлик ва бир неча соатларда қисқа күнлар ичида ўсимлик тўқималари томонидан деградацияга учрайди. Ауксинлар учун 1 соатга 110–120°C иссиқлик оптималь ҳисобланади. Бироқ, IAA паст pH, кислород, перокслар томонидан ҳам парчаланган; синтетик ауксинлардан NAA ва 2,4-D лар, табий мавжуд бўлган ауксин IAA га нисбатан анча барқарордир.

Цитокинилар гуруҳи Кинетин, ВА, Зеатин ва 2iР лардан таркиб топиб, улар ҳужайра бўлиниши, куртаклар кўпайиши ва куртак морфогенезида муҳим роль ўйнайди. Thidiazuron (TDZ; N-, Fanil-N1-1,2,3-tiadiazol-5-ylurea) цитокинин фаолиятига эга бўлиб, у асосан паҳтада дефолиантлар (баргларни тўкувчи препарат) сифатида қўлланилади.

Унинг яна паст концентрацияли эритмаси куртакни шаклланишида ҳам самарали ҳисобланади. Цитокинин эритмалари ҳам худди ауксин эритмалари каби тайёрланади, фақат фарқли 1M ли HCl ва сувдан кристаллар эригунча бир неча томчи томизилади. Юмшоқ қиздириш одатда кристалларни тўлиқ эриши учун талаб қилинади. Эритмада кристалларнинг чўкишини олдини олиш учун 2 марта дистилланган сувдан тез-тез қўшиб турилади.

Микдорли идишдаги эритмани ҳажми керакли микдорга етказилади. Цитокинин эритмаларини ҳам бир неча ойлар давомида музлатгичда сақлаш мумкин. Агар тажрибалар узоқ муддатли давом этса, бу ҳолатда айрим фотокимёвий деградацияга учраши мумкин. Цитокинилар (кинетин ва зеатин) иссиқликка чидамли; уларнинг маҳсулотлари 1 соат 120°C дан кўтарилса ҳам бўзилмайди. 2iР ва ВА лар учун 20 минут 100°C температура турғундир.

Гиббереллин каллус тўқималарини ўсишини, ауксинга боғлиқ ҳолдаги илдиз шаклланишини тўхтатади, шунинг учун ҳам ўсимлик тўқима культурасида кам ишлатилади. Бироқ, у морфогенетик талқиқотларда фойдалидир. Гиббереллин эритмалари кристалларини сувда эритиш орқали тайёрланиб, pH 5.7га келтирилади. GA3 ишқорий муҳитда ҳаракатсиз изотопларга айланади ва кислотали муҳитда ҳамда юқори температурада эса фаолиятсиз биологик шаклларга айланади. GA3 эритмалари иссиқликка чидамли эмас ва унинг активлиги 20 минут 114°Cда 90% дан юқорига кўтарилади. Гиббереллин эритмалари ҳар доим янги тайёрланиши ва озуқага қўшишдан олдин фильтр стерилизациядан ўтказиш лозим.

ABA (Abscisic acid) эмброгенез культурасида мұхим бўлиб, ўсимлик барг ва меваларини ўзилишида ҳамда тиним даврида иштирок этувчи гормон ҳисобланади. ABA иссиқликка чидамли, аммо ёруғликка таъсирчандир. Чунки, ABA нинг 2-сис изомерини қисман 2-транс изомерига айланиши туфайли ёруғликда биологик фаоллиги пасаяди. Эрималарини сувда тайёрлаш мумкин.

1.4. Витаминлар, углеводлар ва гекситлар.

Витаминлар фермент реакцияларида каталитик вазифаны бажаради. Тиамин (B1) витаминлар ичида ўсимлик ҳужайралари учун аҳамиятлидир. Бошқа витаминлар масалан, никотин кислота (B3) ва пиридоксин (B6) лар ҳужайралар қультураси озуқасига қўшилади ва ҳужайралараро реакциясини кучайтириш мумкин. Витамин эритмалари энг яхши музлатгичлардан сақланади ва 10 мл аликоватларда тайёрланиб, ҳар бир озуқа литрига ишлатилади. Бу витамин эритмалари қуйидагича; 5 мг никотин кислотаси ва 5 мг пиридоксин гипохлорид ҳар 100 мл га сувга тайёрланади. Тиамин эритмаларида 40 мг тиамин гидрохлорид 1000 мл сувда эритилади. Бошқа кенг тарқалган витамин хиллари учун Ваэт (1963, 1943) ҳисоби бўйича миллиграммда ҳар озуқа литрга; 0.5 никотин кислота, 0,1 пиридоксин гидрохлорид ва 0,1 тиамин гидрохлорид, B5 Гамборгда миллиграммда ҳар озуқа литрга; 100 инозит, 1.0 никотин кислота, 1.0 пиридоксин гидрохлорид, ва 10.0 тиамин гидрохлорид, Murashige ва Skoog (1962) да миллиграммда ҳар озуқа литрга; 0.5 никотин кислота, 0.5 пиридоксин гидрохлорид, 0,1 тиамин гидрохлорид ишлатилади. Кўп тадқиқотларда витамин эритмалари озуқага автоклов қўйишдан олдин қўшилади, лекин, маҳсус витаминлар тадқиқотларида улар фильтр стерилизация қилиниши лозим.

Углеводлар.

Умуман қультурада яшил ҳужайралар фотосентитик фаол бўлмайди ва углевод манбаларини талаб қилмайди. Ҳужайралар қультурасида одатда сахароза ёки глюкозанинг 2-5% лиси фойдаланилади. Бошқа углевод манбалари, мисол учун фруктоза ва крахмал ҳам худди шундай қўлланиши мумкин. Углеводларнинг қуи даражаларидан протопласт қультурасида, аммо кўп юқори бирикмаларидан эмброгенез ёки чанг қультурасида қўлланилиши мумкин. Агар улар автокловда узоқ муддат туриб қолса, карамелизацияга (шакар ранги жигар рангли бўлиши) дучор бўлади ва амино бирикмалари билан реакцияга киришади (Майллард реакцияси). Карамелизация шакарлар кўп қиздирилганда, камайтирилганда ва меланоидинлардан (меланоидин-жигарранг, юқори молекулар вазнли, гетроген полимер) юз беради, бу жараён қайсики, юқори вазнли молекулар бирикмалар ҳужайраларни ўсишига тўскинлик қиласи. Автоклавда стерилланган озуқанинг ранги сарик ёки қўнғир ранг бўлса, у ҳолда бу озуқа муддат автоклавда ушланганини англатади. Бундай озуқа ишлатишга яроқсиз ҳисобланади.

Гекситлар.

Гекситол мио-инозитол тўқималар культураси учун муҳим ҳисобланиб, циклитол биосинтези, захира сифатида полигидрат бирикмаларни сақлаш, уруғларнинг униши, глюкоза транспорти, минерал озиқланиш, углерод метаболизми, мембрана таркиби, хужайра девори шаклланиши, гормонал гомеостаз ва стресс физиологияси жараёнларида иштирок этади. Мио-инозит *in vitro* да ўсишни кўчайтирувчи шунингдек, балки углевод манбалари баъзи ҳолатда витаминларга ўхшаш деб ҳам аталади. Маннитол ва сорбитол гекситол гуриҳига кириб, протластларни ажратиш учун яхши осмотикдир.

Назоррат саволлари:

1. Ўсимлик тўқималари култураси ҳақида умумий тушунча.
2. Озуқа муҳити ва уларнинг турлари.
3. Ўсимлик тўқималари култураси ва уларнинг озиқланиши.
4. Озуқа муҳити тайёрлашда фитогармонларнинг ўрни.
5. Углеводлар ва гел турлари биласизми?
6. Антибиотиклар аҳамияти.
7. Хужайра озуқасини тайёрлаш ва сақлаш қоидалари.
8. Ифлосланиш муаммолари келиб чиқиш сабаблари.
9. Ўсимлик анатомияси ва ривожлантириш шархи.
10. Эксплант манбалари ҳақида нималарни биласиз?
11. Хўжайралар ҳосил бўлиши ва унинг қандай турлари бор?

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ibrahim, A. S., El-Shihy, O. M., & Fahmy, A. H. (2010). Highly efficient *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of elite Egyptian barley cultivars. *American–Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 4, 403–413.
- 2.Li, J. F., Park, E., Arnim, A. G., & Nebenfuhu, A. (2009). The FAST technique: A simplified *Agrobacterium*-based transformation method for transient gene expression analysis in seedlings of *Arabidopsis* and other plant species. *Plant Methods*, 5, 6–21.
- 3.Liu, G., & Godwin, I. (2012). Highly efficient sorghum transformation. *Plant Cell Reports*, 31, 1–9.
- 4.Lowe, B. A., Prakash, N. S., Way, M., Mann, M. T., Spencer, T. M., & Boddupalli, R. S. (2009). Enhanced single copy integration events in corn via particle bombardment using low quantities of DNA. *Transgenic Research*, 18, 831–840.
- 5.Ozawa, K. (2009). Establishment of a high efficiency *Agrobacterium*-mediated transformation system of rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Science*, 176, 522–527.
6. C. Neal Stewart, Jr. Plant biotechnology and genetics:principles, techniques, and applications John Wiley & Sons, Inc. 2008.—416 p.
7. Nigel G. Halford. Plant Biotechnology Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, John Wiley & Sons Ltd, 2006.—317 p.

2-мавзу- Вектор дизайнни ва конструкция, вектор таркиблари. промоторлар ва инконсерлар. Селекция ва скрининг қилувчи маркерлар.

РЕЖА:

- 2.1. Бактерия ҳужайралари ва плазмида ажратиши.*
- 2.2. Плазмидалар ўз хусусиятига кўра бўлиниши.*
- 2.3. ДНК бўлагини ажратиши.*

Таянч иборалар: Бактерия, ҳужайра, плазмида, агробактерия трансформация, протоколлар, қўш векторлар, атсептик, ўстириш, ифлосланишни текшириш, тубан, эукариот, организм, хромосома, ўлчам, халқасимон, чизиқсимон, структура, мини-хромосома, плазмида, касал, чақиравчи, микроб, антибиотик, тоифа, автоном, репликация.

2.1 Бактерия ҳужайралари ва плазмида ажратиши.

Агробактерия орқали трансформация. Агробактерия шархи. Бир ва иккипаллалиларни протоколлари қўш векторлар. Агробактерия ҳужайралари ва трансформацияси. Ўсимликни атсептик ўстириш. Озуқа тайёrlаш ва ифлосланишни текшириш.

Бактерия ва тубан эукариот организмлар ҳужайраларида асосий хромосомадан ташқари, кичик ўлчамга эга бўлган халқасимон ёки чизиқсимон. Биотехнология асослари 79 структурага эга бўлган қўшимча хромосомалар мавжуддир бу мини-хромосомалар - плазмидалар деб аталади.

Плазмида ДНК си кўпи билан 3-10 тагача генларни ўзида сақлади. Бу генлар, асосан антибиотик ёки заҳарли токсинларни парчаловчи ферментларни синтезига жавобгардир. Шу туфайли плазмидалар бактерия, ачитқи ва замбуруғларнинг антибиотик ва заҳарли токсинларга чидамлилигини таъминлайди.

2.2. Плазмидалар ўз хусусиятига кўра бўлиниши.

Плазмиданинг антибиотик парчаловчи генлари бир плазмидадан иккинчисига транспозонлар билан бирикка нҳолатда ҳам қўчиб ўта олади. Бу молекуляр жараён касал чақиравчи микробларнинг антибиотикларга чидамлилигини ниҳоятда оширади. Плазмидалар ўз хусусиятига кўра иккига бўлинади:

Биринчиси - транспозон ёки бактериофаг ирсий молекуласи каби ҳужайра асосий хромосомасининг маҳсус ДНК изчиллигини кесиб, рекомбинация бўла оладиган плазмидалар. Бундай рекомбинацияланувчи

плазмидалар трансмиссибл, яъни наслдан-наслга ўтувчи плазмидалар деб аталади. Трансмиссибл плазмида асосий хромосомага бириккандан кейин ўз

мустакиллигини йўқотади. Асосий хромосомадан мустакил равища ўз-ўзини репликация қила олмайди.

Айни пайтда бундай плазмидаларда жойлашган генлар асосий хромосомада ўз фаолиятини бажаради. Ҳужайра бўлингандан рекомбинацияланувчи плазмида генлари асосий хромосома генларига бириккан ҳолда наслдан-наслга ўтади.

Иккинчи - плазмидалар деб аталади. Бундай плазмидалар асосий хромосамага бирика

олмайди, асосий хромосомалардан мустакил равища ўз-ўзини репликация йўли билан ўнлаб ва ҳатто юзлаб марта кўпайтира олади. Автоном плазмидалар бактерия ёки замбуруғ бўлингандан қиз ҳужайралар орасида тасодифий равища тақсимланади. Шу билан бирга автоном плазмида бир ҳужайрадан иккинчисига ҳужайра қобиги ва мембраннынг тешикларидан ўта олади.

Табиатда бирор микроорганизм ҳужайрасига ташқаридан ёт генетик материал кирса, у дархол ҳужайра нуклеаза ферментлари орқали парчалаб ташланади. ДНК молекуласини майда бўлакларга бўлувчи ферментлар -

кесувчи эндонуклеазалар ёки рестриктазалар деб аталади. Ҳар бир рестриктаза тўрт ёки кўпроқ маҳсус нуклеотид жуфтларни таниб олиб боғланади ва ДНК молекуласини кесади. Айрим рестриктазалар ДНК кўш занжирини қайчи сингари шартта икки бўлакка бўлади. Бундай рестриктазаларга Alu I, Dra I, Hae III, Hpa I, EcoR V, HinC II, Pvu II, Rsa I, Sca I, Sma I ва бошқаларини мисол қилиб келтириш мумкин (4.4-жадвал).

Шу билан бирга қўш занжир ДНК молекуласини "ёпишқоқ" учлар ҳосил қилиб кесувчи рестриктазалар ҳам мавжуд (Aat II, Acc III, Apa I, Bam HI, EcoRI, Hind III ва бошқалар). Бу рестриктазалар функцияси жиҳатдан

транспозазага ўхшашибги кўриниб турибди. Шунинг учун ҳам бу рестриктазалар ҳосил қилган "ёпишқоқ" учлардан фойдаланиб, ҳар хил ДНК бўлакларини бир - бирига боғлаш осонлашади. Ана шу хусусияти туфайли бу хил рестриктазалар ген мухандислигига кенг қўлланилади.

Ҳозирги кунгача 500 дан ортиқ хилма хил рестриктазалар тоза ҳолда ажратиб олинган ва ўрганилган. Одатда, микроорганизм ирсий моддасининг хромосомаси бир неча миллион нуклеотид жуфтлари изчиллигидан иборат. Ўсимлик ёки ҳайвон геноми бир неча юз миллиондан то 1 миллиардгacha нуклеотид жуфтлари изчиллигидан тузилган. Бундай буюк молекулани юқорида қайд қилинган хилма-хил рестрикцион эндонуклеазалардан фойдаланиб, кўплаб бўлакларга бўлиш мумкин. Эндонуклеаза иштирокида парчаланган ДНК бўлаклари электрофорез ускунасида маҳсус молекуляр "элак" тешикларидан юқори кучланишли электр майдони таъсирида

молекуланинг заряди ва ўлчамига биноан ажратилади. ДНК бўлаги маҳсус бўёқ билан бўяш натижасида ультрабинафша нурлари ёрдамида оддий кўз билан кўрилади.

2.3. ДНК бўлагини ажратиш.

ДНК нинг майда бўлаклари электр майдонида гел ғовакларидан йирик бўлакларга нисбатан тез ҳаракат қилгани учун уларнинг стартдан босиб ўтган масофасини ўлчаб ДНК бўлагининг катта-кичиклиги аниқланади. Электрофорез ускунасида бир-биридан фақат бир нуклеотид кам ёки кўплиги билан фарқланувчи ДНК бўлагини ажратиш мумкин. Рестрикцион эндонуклеаза ферментларининг очилиши ва электрофорез ускунасида ДНК бўлакларини ўта аниқлик билан бир-биридан ажратишнинг такомиллашуви, гигант ДНК молекуласидан исталган ДНК бўлагини ажратиб олиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганимизда, ген мухандислиги биотехнологиясининг моддий асосларига бактерияларни клонлаш, трансформация ва трансдукция жараёнлари, транспозонлар, плазмидалар ва рестрикцион эндонуклеаза ферментларини тўла фундаментал асосларини ўрганиш киради. Юқорида қайд қилинган биологик фаол моддалар ген мухандислиги биотехнологиясининг амалий жараёнларида ўта қимматли омил ҳисобланади.

Назоррат саволлари:

1. Плазмиданинг антибиотик парчаловчи генларининг ахамияти?
2. Бактерияларни клонлаш босқичлари.
3. Ферментларини тўла фундаментал асослари нималардан иборат.
4. ДНК молекуласидан ДНК бўлагини ажратиб олиш.
5. Ҳозирги кунда ажратиб олинган рестриктазаларнинг холати.
6. Плазмида ДНК си қанча генларни ўзида сақлайди?
7. Микроорганизм ирсий моддасининг хромосомаси қанча нуклеотид жуфтларидан иборат.
8. Бактерия хужайраларидан плазмида қандай ажратилади?
9. Биотехнология асослари қанча структурага эга бўлган қўшимча хромосомалардан иборат.
10. Ўсимлик ёки ҳайвон геноми қанча нуклеотид жуфтлари изчилигидан тузилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ibrahim, A. S., El-Shihy, O. M., & Fahmy, A. H. (2010). Highly efficient *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of elite Egyptian barley cultivars. *American–Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 4, 403–413.
2. Li, J. F., Park, E., Arnim, A. G., & Nebenfuhu, A. (2009). The FAST technique: A simplified Agrobacterium-based transformation method for transient gene expression analysis in seedlings of *Arabidopsis* and other plant species. *Plant Methods*, 5, 6–21.
3. Liu, G., & Godwin, I. (2012). Highly efficient sorghum transformation. *Plant Cell Reports*, 31, 1–9.
4. Lowe, B. A., Prakash, N. S., Way, M., Mann, M. T., Spencer, T. M., & Boddupalli, R. S. (2009). Enhanced single copy integration events in corn via particle bombardment using low quantities of DNA. *Transgenic Research*, 18, 831–840.
5. Ozawa, K. (2009). Establishment of a high efficiency *Agrobacterium*-mediated transformation system of rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Science*, 176, 522–527.
6. C. Neal Stewart, Jr. Plant biotechnology and genetics:principles, techniques, and applications John Wiley & Sons, Inc. 2008.—416 p.
7. Nigel G. Halford. Plant Biotechnology Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, John Wiley & Sons Ltd, 2006.—317 p.

**З-мавзу: Микропротектли бомбардимон орқали трансформациялаш
динки кўчириб ўтказиш. ДНКНИ кўчириш параметлари.
микроташувчини трансформацияга тайёрлаш**

РЕЖА:

- 3.1. Сунъий шароитда рекомбинант ДНК олии ва генларни клонлаш.*
- 3.2. Рестриктаза-лигаза усули.*
- 3.3. Линкер молекулаларидан фойдаланиши усулида – ДНК олии.*
- 3.4. Вектор молекулалари.*

Таянч иборалар: Микро-ташувчи, трансформация, тайёрлаш, тўқима, нишон тайёрлаш, озиқланиши, эксплант, ажратиш, каллус, кўчириш, бактерия, хўжайра, ўсиш, плазмида, ДНК ажратиш, арабидопсис, трансформация, агрокультура, ёпишқоқ.

3.1 Сунъий шароитда рекомбинант ДНК олиш ва генларни клонлаш.

Илк бор 1972 йилда АҚШ олимлари *Бойер* ва *Коэн* томонидан амалга оширилган. Бу олимлар *E.coli* бактериясининг хромосома ДНК сига ва шу бактерия плазмидасига алоҳида идишларда *EcoRI* рестриктаза ферменти билан ишлов берганлар. Плазмида таркибида факат 1 дона *EcoRI* рестриктаза ферменти таниб кесадиган маҳсус нуклеотидлар изчиллиги бўлганлиги сабабли фермент плазмиданинг халқасимон ДНК кўш занжирини факат бир жойдан кесиб, плазмидани «ёпишқоқ» учли очиқ ҳолатга ўтказади. Хромосома ДНК молекуласида *EcoRI* рестриктаза ферменти таний оладиган маҳсус нуклеотидлар изчиллиги қандай бўлса, бу молекула шунча бўлакка бўлинади.

Турли хил ўлчамга эга бўлган ДНК молекуласи электрофорез услуби ёрдамида ажратиб олинади. Ажратиб олинган «ёпишқоқ» учли хромосома ДНК си бўлаги очиқ ҳолатдаги “ёпишқоқ” учли плазмида ДНК си билан аралаштирилиб лигаза ферменти ёрдамида тикилади (уланади). Натижада плазмида таркибида хромосома ДНК бўлаги киритилади.

Шу боисдан рекомбинант ДНК га қуидагича тариф бериш мумкин: ҳар қандай тирик организм ирсий молекуласининг исталган бўлагини вектор молекулаларига бирикишдан ҳосил бўлган сунъий ДНК - рекомбинант ДНК дейилади.

Рекомбинант ДНК олишнинг учта усули мавжуд:

- коннектор усули: - рестриктаза-лигаза; - линкер молекулаларидан фойдаланиш усули. Коннектор усулида - рекомбинацияда иштирок этувчи

ДНК бўлагининг 3' учига дезоксинуклеотидл- трансфераза ферменти ёрдамида маълум узунликдаги олиго (dA) - сегменти уланади. Иккинчи учига эса олиго (dT) - сегменти уланади. Бу ДНК бўлаклари аралаштирилганда dA ва dT сегментларнинг водород боғлари асосида комплементар бирикиши туфайли

халқасимон ДНК структураси ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган ДНК даги бир занжирли бўш жойлар ДНК-полимераза I ферменти ёрдамида тўлдирилади.

3.2. Рестриктаза-лигаза усули.

Рестриктаза-лигаза усули - энг содда ва осон рекомбинант ДНК олиш усули ҳисобланади. Бу усулда ДНК молекуласи ва вектор плазмида «ёпишқоқ» учлар ҳосил қилувчи рестриктаза билан қирқилади ва аралаштирилган ҳолда маълум шароитда реассоциация қилинади. Комплементарлик хусусиятига кўра ДНК молекулалари ўзаро водород боғлари ёрдамида бирикиб халқасимон структура ҳосил қиласида ва ДНК занжирининг бирикмаган жойлари ДНК-лигаза ферменти ёрдамида уланади.

3.3. Линкер молекулаларидан фойдаланиш усулида – ДНК олиш.

Линкер молекулаларидан фойдаланиш усулида – ДНК молекуласига ва вектор плазмидага T4 фаг ДНК-лигаза ферменти ёрдамида маҳсус нуклеотид кетма-кетлигига эга бўлган линкер молекула уланади. Олинган икки турдаги ДНК молекуласи рестриктаза ферменти ёрдамида қирқилиб, аралаштирилган ҳолда реассоциация қилинади. ДНК ва вектор плазмида молекулаларининг бирикмаган жойлари ДНК-лигаза ферменти ёрдамида уланади. Шу йўсинда рекомбинант ДНК молекуласи ҳосил бўлади.

ДНК полимераза, ДНК синтез бир фермент, (Леҳман бошқ, 1958). 1955 йилда Артур Корнберг томонидан изолятсия қилинди; ДНК лигаз, бирга ДНК "елимлар" икки учи, 1966 (Вайсс ва Ричардсон, 1967) йилда Бернард Вайсс ва Чарлз Ричардсон изолятсия қилинган, деб бир фермент; бир тақиқлаш эндониклеаз (ҳам чеклаш фермент деб номланувчи), бир ДНК молекуласи билан таянч жуфтлигига хос қисқа кетликлар тан ва шу нуқтада молекуласи кесади бир фермент, 1970 (Смит ва Уилсоҳ, 1970) йилда Ҳамилтон Смит билан характерланади. Корнберг ва Смит ҳар икки Нобел мукофоти олган.

Янги молекулаларни ҳосил қилиш учун бир синов найчасидан бирга, ДНК таъмирлаш муайян жойларда уни кесиш ва унинг дона ёпишиб учун молекуляр воситалари энди мавжуд эди. Уларни ресомбининг кейин чеклаш ферментлар билан вирусли ва бактериал ДНК-кетликлар кесиш ва бир ДНК молекуласи қуриш 1972 йилда Пол Берг томонидан ишлатилган (Жексон ва бошқ, 1972.); У Берг нинг тажрибалардан сўнг бир йил 1980 йилда Нобел мукофотига сазовор, Станлей Соҳен, Энни Чанг, Ҳерберт Боер ва Роберт Ҳеллинг чеклаш фермент билан кесиб эди ДНК деб номланган бактериялар кичик, ўз-ўзини репликатсия ДНК молекулалари билан қайта бирлашувчи исботлаб плазмид (Соҳен ва бошқ., 1973). янги плазмид кейин бактериал хужайралар ичига яна бўлиши мумкин ва реплика эди. бактериал хужайралар маданиятли бўлса эди, рекомбинат плазмид нусхаларини олиб, ҳар бир ҳужайра, унда жойлаштирилган ДНК янги парча билан плазмид ДНК катта ҳажмдаги маданияти хавфсиз ҳолатга мумкин. Бу устида ишлаш учун бу этарли ишлаб чиқариш учун клонланмис ва бактериялар қадар булкед керак ҳар қандай турлари ДНК бир қисмини берди. Бу жараён кўпинча ген клонлаш деб аталади. Бу мақсадда танлаш бактерия одатда Э.соли (E. coli) ҳисобланади. Улар

патоген эмас, шундай лабораторияда ишлатыладиган штаммлари ўчириб қилинган бўлса-да, бу, бир инсон ичак бактериялар.

Генларни клонлаш қилиши қобилияти ген тузилиши ва функтсияси, молекуляр таҳлил қўллаб-кувватлади. Баъзи одамлар янги бир фан тармоғи сифатида бу қаралади ва молекуляр биология, деб атади. Унинг тижорат эксплуататсия биотехнология деб аталади ва бу биринчи мисол фарматсевтика саноатида эди; Э. бобини ичида бир таҳрирланган инсон ген ишлаб инсулин 1981 йилда АҚШ озиқ-овқат ва фарматсевтика идораси томонидан тасдиқланган. (1977, Сангер эт ал Махам ва Гилберт, 1977.), Ва 1983 йилда, Кори Муллис 1977 йилда, Валтер Гилберт ва Фред Сангер алоҳида бир ДНК молекуласи нўклеотидлерден навбатини белгилаш учун усулларини ишлаб: икки бошқа ютуқлар эътиборга лойик бир усул бактериялар (Муллис ва Фалоона, 1987) клонлаш ҳолда полимераз занжир реактсияси ДНК қисқа бўлимлар ташкил булкед (амплификатор) мумкин бўлган томонидан (ПСР) деб номланган ихтиро. Барча уч Нобел мукофоти олган. ДНК молекуласи нўклеотид кетма-кетликни аниқлаш усуллари ишлаб чиқилган ва лойиҳалар бутун геномларі нўклеотид кетмакетликни олиш учун бошланган 1990 йиллар бошида томонидан бундай даражада автоматлаштирилган эди. Инсон геном геномун биринчи лойиҳаси 2001 йилда чоп этилган биринчи завод Геном кетма-кетлиқдаги 2000 йилда чоп этилган Арабидопсис, ва биринчи ҳосил ўсимлик геном мажмуасини 2002 йилда гуруч эди чоп керак эди.¹

3.4. Вектор молекулалари.

Рекомбинант ДНК ни автоном репликация бўлиши учун жавоб берадиган ДНК бўлаги - **вектор** молекулалари дейилади. Вектор молекулалар ўз вазифасига кўра икки типга

бўлинади:

Биринчиси -автоном репликация бўлувчи векторлар.

Иккинчиси - хромосомага интеграция бўлувчивекторлар. Вектор молекулалар ген мухандислиги биотехнологиясида генларни клонлашда ва трансформация қилишда асосий иш куроли бўлиб хизмат қиласи. Вектор молекулалари вазифасини фаг ДНК лари, плазмидалар ва ўсимликларни хлоропласт ҳамда митохондриал ДНК лари ўташи мумкин. Хўжалик аҳамияти қимматли бўлган генларни ажратиш учун ген банки (библиотекаси) тузилади. Хромосомал ДНК асосида ген библиотекасини тузиш қуидагича амалга оширилади:

ДНК ва вектор молекулалар рестриктаза ферменти ёрдамида қирқилади ва маълум шароитда реассоциация қилинади; Нуклеотидлар орасида уланмай қолган бўшлиқ ДНК- лигаза ферменти ёрдамида ўзаро бириктирилади; Олинган рекомбинант ДНК бактерия хужайрасига трансформация қилинади. Хромосомал ДНК да мавжуд генларни тўла клонлаш учун ДНК ўлчамига ва олинган клонларни сонига эътибор бериш керак. Бу кўрсатгич қуидаги

¹ Adrian Slater, Nigel W. Scott, Mark R. Fowler Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants 2nd Edition USA, 2008 English

формула ёрдамида ҳисобланади: бунда, х-клонланаётган ДНК ўлчами, у-гаплоид геномнинг ўлчами ва р 0,99 га teng бўлса, 99% хромосомал ДНК нинг мос қисми клонланади.

Генларни клонлашда кўпинча кДНК библиотекасини тузиш мақсадга мувофиқдир. Бу ҳолда махсус поли (Y) ва олиго (dT) колонкалари ёрдамида учларида поли (A) нуклеотидлар кетма-кетлигини сақловчи иРНК, тРНК ва

рРНК дан ажратиб олинади. Олинган иРНК молекуласи олиго (dT) нуклеотидлари билан аралаштирилиб реассоциация қилинади. Бунда иРНК молекуласининг поли (A) учida dA-dT қўш занжирли сегмент ҳосил бўлади. Ушбу икки занжирли сегментнинг олиго (dT) учи кДНК синтезини амалга оширувчи ревертаза ферменти учун праймер (кДНК синтезининг бошланиш нуқтаси) вазифасини ўтайди.

Синтез қилинган кДНК молекуласи қисқа учли икки занжирли структура билан тугалланади. кДНК синтезида матрица вазифасини ўтаган иРНК молекуласи NaOH билан парчаланади, натижада қисқа икки занжирли ва тўлиқ иРНК молекуласига комплементар бўлган бир занжирли кДНК

молекуласи ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган қисқа икки занжирли структура кДНК нинг иккинчи занжирини синтез қилишда праймер вазифасини ўтайди.

Назорат саволлари:

1. Озиқ-овқат махсулотлари саноати биотехнологиясида ген мухандислиги соҳасини ўрганишдан мақсад нима?
2. Ген мухандислиги усулларининг имкониятларини айтиб беринг.
3. Ген мухандислиги қандай даражаларда амалга оширилади?
4. Грансген – организм нима?
5. ДНК репликация ҳақида маълумот беринг.
6. Трансляция жараёни ҳақида маълумот беринг.
7. Транскрипция жараёни ҳақида маълумот беринг.
8. Генетик код нима?
9. Терминаторлар деганда нимани тушинасиз?
10. Мутация нима?
11. Клон нима?
12. Клонлаш жараёнига изоҳ беринг.
13. Транспозонлар нима?
14. Плазмидаларга таъриф беринг.
15. Рестриктазаларга изоҳ беринг.
16. Рекомбинант ДНК деганда нимани тушинасиз?
17. Рекомбинант ДНК олиш усулларини айтиб беринг?
18. Вектор молекулалари нима ва уларнинг типларига изоҳ беринг.
19. Трасформация нима?
20. Лигаза ферментларига изоҳ беринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ibrahim, A. S., El-Shihy, O. M., & Fahmy, A. H. (2010). Highly efficient *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of elite Egyptian barley cultivars. *American–Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 4, 403–413.
2. Li, J. F., Park, E., Arnim, A. G., & Nebenfuhu, A. (2009). The FAST technique: A simplified Agrobacterium-based transformation method for transient gene expression analysis in seedlings of *Arabidopsis* and other plant species. *Plant Methods*, 5, 6–21.
3. Liu, G., & Godwin, I. (2012). Highly efficient sorghum transformation. *Plant Cell Reports*, 31, 1–9.
4. Lowe, B. A., Prakash, N. S., Way, M., Mann, M. T., Spencer, T. M., & Boddupalli, R. S. (2009). Enhanced single copy integration events in corn via particle bombardment using low quantities of DNA. *Transgenic Research*, 18, 831–840.
5. Ozawa, K. (2009). Establishment of a high efficiency *Agrobacterium*-mediated transformation system of rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Science*, 176, 522–527.
6. C. Neal Stewart, Jr. Plant biotechnology and genetics:principles, techniques, and applications John Wiley & Sons, Inc. 2008.—416 p.
7. Nigel G. Halford. Plant Biotechnology Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, John Wiley & Sons Ltd, 2006.—317 p.

4-мавзу: Трансформация қилингандык түқималарни регенерацияси ва селекцияси. Озуқа манипуляциялари. Каллусни қўчириш ва селекция скрининг қилиш.

РЕЖА:

- 4.1. Ажратиб олинган ҳужайралар ва түқималарни ўстириши.*
- 4.2. Эксплантлардан каллус түқимаси культурапарини олиш.*
- 4.3. Регенерация ва трансген ўсимлик.*

Таянч иборалар: Скрининг маркер, тест, регенерация, трансген, ўсимлик, молекуляр, генетик, экспрессия, таҳлили, фитотрон, микро-ташувчи, қоплама, тайёrlаш, баллистик, ДНК қўчириш,

4.1. Ажратиб олинган ҳужайралар ва түқималарни ўстириши.

Ажратилган түқималар культураси одатда каллусли ёки шиш (жуда кам ҳолатда) түқима бўлиши мумкин. Каллусли культура табақалашмаган дедифференцированный) ҳужайралардан ташкил топган, тартибсиз түқималардир. Кейинроқ улар каллуслига ихтисослашади, яъни ўзига хос равишда табақалашади. **Каллус** - дегани қадоқ (қотиб қолган) деган маънени англатиб, *in vitro* шароитида алоҳида олинган түқималарни (эксплантылар) бир қисмида ва бутун ўсимликни бир қисмида (шикастланганда) пайдо бўлиши мумкин. *In vitro* шароитида каллус түқима, асосан оқ ёки сариқроқ, жуда ҳам кам ҳолатларда оч-яшил рангда бўлади. Каллус ҳужайралар қариганда, тўқ қўнғир рангга кирадилар, бунга сабаб уларда фенол бирикмаларини тўпланиши билан боғлиқ.

Вақт ўтиши билан феноллар оксидланиб, линонга айланадилар. Улардан қутулиш мақсадида озуқа муҳитига антиоксидантлар қўшилади.

Каллус түқималар аморф бўлиб, маълум бир анатомик тузилишга эга маслар, аммо келиб – чиқиши ва ўстириш шароитига қараб ҳар хил консистенцияга (суюқ - қуюқ ва ҳ.к) эга бўладилар:

Биринчи – уваланиб кетадиган, пўк ҳолатда кичик агрегатларга енгил майдаланиб кетадиган, кучли сувланган ҳужайралар;

Иккинчи – ўрта зичли яхши намоён бўлиб турадиган меристемаали ўчоқлар;

Учинчи – зич ҳолатда, унда камбий (ўсимлик псўтлоғи тагидаги бўлинувчан ҳужайралар) элементлари ва ўтказувчи тизим табақалашган дифференцияция) ҳолатда учрайди.

Ўсимлик ҳужайрасини табақасизланиши ва уни каллусга айланниши учун шарт бўлган шароит-бу озуқа муҳити таркибида икки фитогормонларни яъни ауксинлар ва цитокиниларни бўлишидир. Ауксинлар ҳужайраларни табақасизланишини (дедифференцияция) чақириб, уларни бўлинишга

тайёрлайди, цитокининлар табақасизланган хужайраларни бўлинишига (трольифорция) олиб келади.

Агар таркибида гормон сақламаган озуқа муҳитига поя, барг ёки илдизни бир қисмини тиқиб қўйилса, хужайраларни бўлиниши амалга ошмайди ва каллус тўқима ҳосил бўлмайди. Бу табақалашган хужайраларни бўлинаолмаслиги билан боғлиқдир (3.1-расм).

Охирги босқични (фазани) характерли томони - хужайрани иккиламчи қобиғини қалинлашуви ва хужайрани бўлинишга бўлган қобилиятини йўқотишидир. Дифференциацияга учраган хужайралар яна қайтадан бўлиниш қобилиятига эга бўлиши учун, уларни дедифференциация бўлиши шарт, яъни хужайра худди меристемаа ҳолатига қайтиши керак. Табақаланган хужайраларни қўпайтириш тартибсиз, анархия шаклида ўсишга олиб келади ва оқибатда каллус тўқима ҳосил бўлади.

Шундай қилиб, ихтисослашган хужайраларни каллус тўқималарга айланиши ҳужайра бўлинишини кучайтириш билан боғлик бўлиб, табақалаш жараёнида, ҳужайра бўлиниш қобилиятини йўқотади. Ҳар бир хужайранинг ўсиши уч босқичда ўтади:

бўлиниш;
чўзилиш;
табақаланиши (дифференцировка).

Озуқа муҳити таркибида цитокининларни бўлмаслиги тамаки ўсимлигини ўзак қатлами паренхимасида ҳужайра циклини тўсиб қўяди. Шунинг учун ҳам агар озуқа муҳити таркибида фақатгина ауксин бўлса, ҳужайра бўлинмайди ва тўрт кунлик даврдан кейин чўзилиб, ўсишга ўтади.

Ауксинларсиз, фақат цитокининларни ўzlари ҳам гормон сақламаган озуқа муҳитига ўхшаб, ўсимликни қаришига олиб келади. Тамаки ўсимлиги мисолида келтирилган далиллар.

4.2. Экспланлардан каллус тўқимаси культураларини олиш.

Турли хил
экспланлардан каллус
тўқимаси культураларини
олиш:
1-гулбарг;
2-барг;
3-поянинг бир қисми;
4-гул чангиги;
5-илдиз.

Бирта гормон сақлаган озуқа муҳитида каллусли тўқима ҳосил бўлишини барчасини тушунтира олмайди. Бунга зид бўлган мисоллар ҳам бор. Масалан, бугдойни етилмаган куртакларида цитокининсиз 2,4-Д сақлаган озуқада каллус ҳосил бўлиши ёки кунгабоқарни уруғ палласида цитокинин сақлаган, ауксин сақламаган озуқада каллус ҳосил бўлиши ва ҳ.к. Кузатиладиган натижалар кўпроқ эндоген гормонларга, аникроғи у ёки бу экспланти ҳужайрасида

сақланадиган гормонлар билан яъни ҳужайрани гормонал статуси билан боғлиқ эканлиги исботланган.

Хужайра биотехнологияси – ҳужайра, тўқима ва протопластларни ишлатишга асосланади. Ҳужайраларни манипуляция (фаолиятига қандайдир ўзгаришлар киритиш) **қилиши** учун, уларни ўсимликдан ажратиб олиш, ўсимлик организмидан ташқарида яшashi ва кўпайиши учун шароит туғдириб бериш лозим. Ажратиб олинган ҳужайра ва тўқималарни сунъий озуқа муҳитида, стерил шароитда (*in vitro*) ўстириш, усули *ажратилган тўқималар культураси* деб ном олди ва уларни биотехнологияда ишлатиш мумкинлиги сабабли, катта аҳамият касб этди.

Ажратиб олинган ҳужайралар ва тўқималарни ўстириш учун мўлжалланган озуқа муҳитлари ўсимликларни яхши ўсиши учун керак бўлган барча макроэлементлар (азот, фосфор, калий, кальций, магний, олтингугурт ва бошқалар) ва микроэлементлар (бор, марганец, рух, мис, молибден ва бошқалар) ҳамда витаминалар, углеводлар, фитогормонлар ёки уларни синтетик аналогларини сақлаши керак. Баъзи озуқа муҳитлари аминокислоталар, казеин гидролизати, ЭДТА (этилендиаминтетрасирка кислота) ёки уни натрийли тузи (бу туз темирни ҳужайрага киришига ёрдам беради) ва бошка керакли моддалар саклайди.

Озуқа муҳитлари қаттиқ (агарли) ҳамда суюқлик шаклида ўсимлик турларига мос равища тайёрланади. Қаттиқ муҳитлар тайёрлашда агар-агар, яъни денгиз ўтларидан олинадиган полисахарид қўшилади. Бунда агарнинг 58 % эритмаси тайёрланади.

Кукун холатидаги озуқалар кўпинча микроорганизмларни дифференциациялашда, одатда стандарт сифатида қўлланилади. Озуқа муҳитлари таркиби ўстирилиши керак бўлган хар бир ўсимлик ва хайвон ҳужайра, тўқималарига мос қилиб танланади. Асосан организмларни кўпайтиришда Мурасиге-Сқуг, Гамборг, Хеллер муҳитлари қўлланилади.

Озуқа муҳитлари таркибини 6 та асосий компонентлари ташкил қиласи:

1. макроэлементлар;
2. микроэлементлар;
3. темир манбайи (хелат шаклида);
4. витаминалар;
5. углерод манбайи;
6. фитогормонлар.

Макро- ва микроминерал тузлар озуқа муҳитининг асосини ташкил этади: азотли бирикмалар - нитратлар, нитритлар, аммоний тузлари; фосфор - фосфат тузлари; олтингугурт - сульфатлари шаклида ҳамда сувда эрувчан K^+ , Na^+ , Ca^{+2} , Mg^{+2} тузлари;

Темир хелат шаклида ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) билан биргаликда ўсимлик қзлаштириши учун қулай шакилда қўлланилади.

Витаминалар: биологик катализаторлар – В гурухи (B1, B6, B12), С (аскорбин кислотаси), PP (никотин кислотаси).

Углеводлар: сахароза, глюкоза, фруктоза (20-60 г/л)

Фитогормонлар: ауксинлар (ИУК, НУК), цитокининлар (кинетин, зеатин, мочевина), гиббереллинлар (гиберрелл кислотаси).

Каллус тўқима олиш учун, алохига холларда озуқа муҳитига кокос ёнгогини (какос сути), каштан дараҳтини эндоспермасини кушилади. Карбон сувлар озуқа учун энг керакли компопенентлар ҳисобланади. Бунга сабаб, кўп холларда ажратиб олинган ҳужайра ва тўқималарни автотроф озиқланишга қурблари етмайди. Карбон сув сифатида кўпроқ 2-3 % ли сахароза ёки глюкоза эритмасидан фойдаланилади.

Фитогормонлар ҳужайраларни табақаланиши (**дедифференцировка**) ва ҳужайра бўлинишини кучайтириш (**индукция**) учун керак. Шунинг учун хам каллусли тўқималар олиш учун мўлжалланган озуқа муҳити таркибида албатта **ауксинлар** (ҳужайра бўлинишини кучайтирувчи) бўлиши шарт. Поя морфогенезини индукция қилишда муҳит таркибидаги ауксинлар микдорини камайтириш ёки бутунлай олиб ташлаш мумкин.

Гормон сақламайдиган озуқа муҳитида шиш ва “ўрганганд” тўқималар ўсади. Хар икки гурух гормонларига ёки улардан бирортасига автономлик, бу ҳужайраларни узларини гормон синтез қилиш хусусияти билан боғлик.

Ауксин манбаи сифатида озуқа муҳитига 2,4-дихлорфенокси сирка кислота (2,4-Д), индолил-3-сирка кислота (ИУК), L-нафтил сирка кислота (НУК) кўшилади. Яхши ўсуви каллус олиш учун кўпроқ 2,4-Д дан фойдаланилади, чунки ИУК, 2,4-Д га нисбатан 30 маротаба кучиздир.

Сунъий озуқа муҳитига қўшиш учун, цитокинин манбаи сифатида, кинетин, 6-бензиламинопурин (6-БАП) ва зеатин ишлатилади. 6-БАП ва зеатин ажратилган тўқималарни ўсишига органогенезни индукциясига кинетинга нисбатан фаолроқ таъсир кўрсатади. Баъзи бир озуқа муҳитлар таркибига аденин хам қўшилади.

Ҳозирги пайтда жуда кўп сонли озуқа муҳитларни таркиби аниқ бўлсада, ажратиб олинган ўсимлик тўқималарини *in vitro* шароитида ўстириш учун Т. Мурасиге ва Ф. Скуг муҳитлари ишлатилади. Бу муҳитни таркиби биринчи маротаба 1962 йилда эълон қилинган ва у жуда яхши балансланган озуқа моддалари таркибига эга ва бошқалардан аммонийли ва нитратли азотни нисбати билан фарқ қиласи (1-жадвал).

**Үсімликларни ажратиб олинган тұқымаларини ўстириш учун
ишлатыладиган озуқа мұхитларини таркиби**

Компонент	Озуқа мұхити таркиби, мг/л				
	Knudson C	Murashige & Skoog	Harvais I A	Van Waes & Deberg	
				ВМ 1	ВМ 2
Ca(NO ₃) ₂ *4H ₂ O	1000		400		
(NH ₄) ₂ SO ₄	500				
KNO ₃		1900	200		
CaCl ₂ *2H ₂ O		440			
NH ₄ NO ₃		1650	400		
KH ₂ PO ₄	250	170	200	240	240
KCl			100		
MgSO ₄ *7H ₂ O	250	370	200	100	100
FeSO ₄ *7H ₂ O	25	27,95		27,95	27,95
Na ₂ ЭДТА		37,23		37,23	37,23
Темир хелати			5 мл		
CoCl ₂ *6 H ₂ O		0,025	0,02		
ZnSO ₄ *7H ₂ O		8,6	0,5	10	10
H ₃ BO ₃		6,2	0,5	10	to
MgSO ₄ *4H ₂ O	7,5	22,3	0,5	25	25
CuSO ₄ *5H ₂ O		0,025	0,5	0,025	0,025
Na ₂ MoO ₄ *2H ₂ O		0,25	0,04	0,25	0,25
KI		0,83	0,1		
Глицин		2		2	2
Мезоинозит		100		1200	1200
Никотин кислота		0,5	5	5	5
Тиамин		0,1	5	0,5	0,5
Пиридоксин		0,5	0,5	0,5	0,5
Фолий кислотаси				0,5	0,5
Биотин				0,05	0,05
Казеин гидролизати				500	500
L -глютамин				100	100
6-БАП					0,2
Сахароза	20000	30000		20000	20000
Картошка экстракти			100 мл		
Агар - агар	17500	10000	10000	6000	6000
pH	4,8-5,2	5,7	6,0-6,4	5,8	5,8

Хужайра органоидлари билан ишлашда асосан қуидагилар талаб этилади:

1. Озуқа мұхити тайёрлаш учун маҳсус жой;
2. Стерил ҳолатда әкишни амалға ошириш учун стерил бўлган ламинар-бокс ёки маҳсус герметик хона;
3. Каллус қультураларни ўстириш учун доимо ҳарорати бир хил ушлаб туриладиган маҳсус хона ёки термостат;
4. Суспензион ҳужайра қультураси учун микробиологик чайқалатгич (качалка).

Кўпчилик тадқиқотчилар озуқа мұхити тайёрлаш учун алоҳида хоналар бўлиши зарурлигини таъкидлашади. Мободо бунинг имкони бўлмаган ҳолларда, чинни ва шиша идишларнинг стериллигини таъминлаш зарур. Яъни хонадаги баъзи бир асбоб-ускуналарда чанглар ва турли хил моддалар бўлмаслиги, масалан: Петри чашкаси устки қисмида, тарозилар ёки pH-метр электродларида кимёвий моддалар қолдиқлари озуқа мұхитига тушмаслигига имкон яратиш зарур.

Экиш амалға ошириладиган хоналар ва асбоб-ускуналарнинг тозалиги, стериллиги тажриба ишларини амалға оширишда энг зарур манба ҳисобланади. Яъни яхши стерил, тоза ишчи жойида тажриба ишларини олиб бориш, маҳсус асбоб ускуналар излашдан кўра қулайроқдир.

Кўпчилик тадқиқотчилар озиқа мұхити тайёрлаш учун алоҳида хоналар бўлиши зарурлигини таъкидлашади. Мободо бунинг имкони бўлмаган ҳолларда, чинни ва шиша идишларнинг стериллигини таъминлаш зарур. Яъни хонадаги баъзи бир асбоб-ускуналарда чанглар ва турли хил моддалар бўлмаслиги, масалан: Петри чашкаси устки қисмида, тарозилар ёки pH-метр электродларида кимёвий моддалар қолдиқлари озуқа мұхитига тушмаслигига имкон яратиш зарур.

4.3. Регенерация ва трансген ўсимлик.

Муваффиқиятли биотехнологияни йўлга қўйиш учун, ўсимликни такомиллашибтиришда мұхим кетма-кетликдаги самарали регенерация усуллари бўлган бутун ўсимлик эксплантларни ўстириш ёки каллус тўқималар қультурасидан фойдаланилади. Эксплантлар, каллус тўқималар ёки ягона хужайраларидан етук ўсимликлар олиш ўсимлик ген мұхандислигига энг мұхим ҳисобланади ва хужайраларни танлашда қўйидаги ноёб хусусиятлар; сомоклонал вариантлар, такрорий клонал кўпайтириш, вирусдан ҳоли ўсимликлар, гаплоид ва ёки полиплоид ўсимликлар, эмбрион ҳосил қилиши, гермаплазмада сақланиши ва бошқалар талаб қилинади. Регенерацияланиши йўллари турли даражада бўлиши кўзатилган. Бу назария барча хужайраларнинг генетик қобилиятини ўз ичига олади ва уларни бевосита ривожланиш тўлиқ ўсимлик ичиди; улар тотипотен ҳисобланади. Бироқ, ҳамма хужайраларни ҳам тотипотенлик экпрессия қобилиятига эга деб бўлмайди. Эксплантлар юқори даражадаги фарқли хужайралардан таркиб топган бўлиб, яъни барг, поя, илдиз ва гул тўқималари каби. Етилмаган эмбрионлар, ўсимлик меристемалари ва бошқа меристема хужайраларнинг илдиз ҳосил қилиш системаси фарқланмаган. Жараҳотланган эксплантлар ўстириш учун қўйилади ва одатда жароҳатланган эксплант каллус тўқималарини бўлиниши ва ўсишини

кучайтиради; жараҳотланиш эксплантларда дедифференцияланишини юзага келтиради Сугияма (1999). Меристематик қисмлар бир каллус түқималаридан ривожланади ва новда, соматик эмрион ёки илдиз шаклланиши қобилияти туфайли органларни ҳосил қиласы. Бу жараён оралиқ каллус босқичи бўлгани учун бу билвосита органогенез деб ҳисобланади.

Назорат саволлари:

1. Ҳужайра биотехнологияси деб нимага айтилади?
2. Ҳужайра органоидлари қандай ишлатилади?
3. Озуқа мұхитлари таркибини нечта компонентлари ташкил қиласы?
4. Ҳужайра органоидлари билан ишлашда нималар талаб этилади?
5. Озуқа мұхити тайёрлаш учун қандай элементлар талаб этилади?
6. Стерил ҳолатда әкишни амалга ошириш учун ишлатиладиган асбоблар?
7. Каллус күльтураларни ўстириш учун қандай омиллар ва озуқа мұхити мухим.
8. Суспензион ҳужайра күльтураси учун энг аҳамиятли жараёнлар нималардан иборат.
9. Ҳужайрани әкишни амалга оширишда нималарга аҳамият бериш керак.
10. Түқималарини *in vitro* шароитида ўстириш учун қандай озуқа мұхитлари ишлатилади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ibrahim, A. S., El-Shihy, O. M., & Fahmy, A. H. (2010). Highly efficient *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of elite Egyptian barley cultivars. *American–Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 4, 403–413.
2. Li, J. F., Park, E., Arnim, A. G., & Nebenfuhu, A. (2009). The FAST technique: A simplified *Agrobacterium*-based transformation method for transient gene expression analysis in seedlings of *Arabidopsis* and other plant species. *Plant Methods*, 5, 6–21.
3. Liu, G., & Godwin, I. (2012). Highly efficient sorghum transformation. *Plant Cell Reports*, 31, 1–9.
4. Lowe, B. A., Prakash, N. S., Way, M., Mann, M. T., Spencer, T. M., & Boddupalli, R. S. (2009). Enhanced single copy integration events in corn via particle bombardment using low quantities of DNA. *Transgenic Research*, 18, 831–840.
5. Ozawa, K. (2009). Establishment of a high efficiency *Agrobacterium*-mediated transformation system of rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Science*, 176, 522–527.
6. C. Neal Stewart, Jr. Plant biotechnology and genetics:principles, techniques, and applications John Wiley & Sons, Inc. 2008.—416 p.
7. Nigel G. Halford. Plant Biotechnology Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, John Wiley & Sons Ltd, 2006.—317 p.

5-мавзу: Ўсимликлар биотехнологияси маълумотларни тўплаш ва бошқари.

РЕЖА:

- 5.1. Ўсимликлар биотехнологияси маълумотларни тўплаши.**
- 5.2. Қишлоқ хўжалигида энг муҳим ўсимликларнинг трансген навлариdir.**
- 5.3. Замонавий биотехнология соҳасида етакчи АҚШ ва Гарбий Европа мамлакатларида биотехнологияни ривожланиши.**

Таянч иборалар: маълумот, тўплаш, бошқариш, база, эксперимент, дизайнни, анализ, система таъсири, даража, малака.

5.1. Ўсимликлар биотехнологияси маълумотларни тўплаш.

Биотехнология бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Кўлингиздаги китобнинг ушбу бўлимининг асосий вазифаси, йўналишнинг ривожланиш истиқболларини таҳлил қилиб чиқиш ва янги биотехнологияни механизмларини тавсифлашдан иборат. Ҳозирги даврда биотехнологиянинг ютуқларидан қуидаги соҳаларда фойдаланиш истиқболли ҳисобланади: Озиқ-овқат саноати, фармацевтика, кимёвий ва нефтигаз саноати соҳаларида - янги моддаларнинг биосинтези ва биотрансформацияси жараёнларида, хоссалари (хусусиятлари) олдиндан белгиланган бактериялар, ачитқи ва мицелиал замбуруғларнинг трансген штаммларидан фойдаланиш;

5.2. Қишлоқ хўжалигида энг муҳим ўсимликларнинг трансген навлариdir.

Қишлоқ хўжалигида – энг муҳим ўсимликларнинг трансген навларини яратиш, ўсимликларни ҳимоя қилувчи биологик воситалар, бактериал ўғитлар, биогумус, тупроқни қайта тикловчи воситаларда микробиологик тавсиф;

Чорвачиликда – ўсимлик, микроб массалари ва қишлоқ- хўжалиги чиқиндилари асосида самарали озуқа моддалари тайёрлаш, эмбриогенетик усууллар асосида чорва молларининг янги зотларини яратиш;

Энергетикада – микробиологик синтез ва фотосинтетик жараёнларнинг янги турлари асосида биоэнергиянинг янги манбаларини яратиш, биогаз тайёрлашда биомассанинг биоконверсияси;

Тиббиётда – тибиёт биопрепаратлари, моноклонал антителлалар, диагностика учун препаратлар, Биотехнология асослари 539 вакциналар, иммунобиотехнологияни ривожланишига хизмат қилувчи рақобатбардош биопрепаратлар яратиш;

Экологияда – оқава сувларни тозаловчи ва агросаноат чиқиндиларини қайта ишлатадиган экологик хавфсиз технологиялар яратиш, экотизимини тузиш ва ҳ.к.

Охирги йилларда биология соҳасида амалга ошган инқилобий ўзгаришлар, биотехнологиянинг ривожланишида ҳам катта роль ўйнади ва унинг янги, истиқболли йўналишларини очилишига, биологик жараёнлардан ишлаб чиқаришда фойдаланиш чегараларининг кенгайишига олиб келди.

5.3. Замонавий биотехнология соҳасида етакчи АҚШ ва Фарбий Европа мамлакатларида биотехнологияни ривожланиши.

Бир сўз билан айтганда “Замонавий биотехнология”, - инсон ва ҳайвон, ўсимлик ва микроорганизмларнинг ҳужайра ва тўқималарини ёки уларнинг алоҳида қисмларини утилизация (қайта ишлаш, фойдаланиш) қилиш мақсадида, биокимё, микробиология, молекуляр биология ва муҳандислик фанларининг имкониятларини ишлатиш орқали пайдо бўлган илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган истиқболли йўналишдир. У оддий шароитда осон топиладиган ва қайта тикланадиган манбалардан, инсон ҳаёти ва саноат учун зарур ва муҳим бўлган моддаларни кам энергия сарф қилган ҳолда, ишлаб чиқариш имконини беради.

“Замонавий биотехнология” деганда ҳозир бу соҳанинг икки йирик йўналиши кўзда тутилади: - ген ва ҳужайра муҳандислиги. Дарҳақиқат, бу икки йўналиш ушбу мураккаб ва кўплаб фанлар оралиғидаги технологиянинг энг катта қисмини ташкил қиласи ва жуда ҳам кенг бўлган, ишлатилиш имкониятларига эгадир. Ўтган асрнинг охирги йигирма йилларида айнан мана шу соҳада, биологик фаол моддалар ишлаб чиқариш бўйича катта муваффақиятларга эришилди. Энг аввало, бу инсулиннинг ген муҳандислик препаратлари, инсонни ўстириш гормони, интерферонлар, интерлейкинлар, эритропоэтин, тўқима плазминогенларининг активатори, қатор моноклонал антителлалар ва вакциналар ишлаб чиқаришнинг саноат технологиясининг яратилганлигидир.

Замонавий биотехнологиянинг усулларидан фойдаланиб,

доривор моддалар ишлаб чиқариш бўйича илмий ва амалий ишлар АҚШ, Япония ва Фарбий Европанинг баъзи мамлакатларида фаол олиб борилмоқда. Бу малакатларда биотехнологияни ривожлантириш учун ажратилган маблағнинг учдан икки қисми сарфланмоқда. Бу мамлакатларнинг деярли барчасида, биотехнологик лойиҳаларни қўллаб-қувватловчи давлат дастурлари қабул қилинган ва муҳим фундаментал тадқиқотлар ҳамда янги биотехнологик махсулотларни халқ хўжалигига фойдаланиш бўйича фаол амалий ишлар олиб борилмоқда.

Замонавий биотехнология соҳасида етакчи мамлакат

АҚШ да фундаментал ва амалий тадқиқотларни олиб бориш мақсадида кўплаб ихтисослашган биотехнологик фирмалар ташкил қилинган ва улар Давлат ҳамда хусусий маблағлардан фойдаланиб, энг йирик мутахассисларни жалб этиб, қисқа мuddатда тиббиёт учун қатор оқсил махсулотлари ишлаб

чиқариш технологияларини яратишга эришдилар. Биотехнологиянинг ривожланиши бўйича Япония жаҳонда иккинчи ўринда туради. Агар,

биотехнологияни анъанавий соҳалари – ферментлар, антибиотиклар, аминокислотлар ишлаб чиқариш бўйича Япония жуда ҳам кучли бўлса, замонавий биотехнология махсулотлари яратиш соҳасида, уларни ривожлантиришга киришилган. Бу мақсадда Япониянинг ривожланиши учун анъанавий йўл танланган, яъни илмий-техникавий ахборотдан амалиётда фойдаланиш ва ген мухандислиги технологиялари бўйича патент ва лицензияларни ва микроорганизмлар штаммларини четдан сотиб олиш мўлжалланган. Шунинг билан бир қаторда Япониялик мутахассисларни тез муддатда чет элларда малакаларини ошириш ҳам университетлар ва саноат фирмалари лабораторияларида ген мухандислиги бўйича ўзларининг илмий ва амалий ишларини кенгайтиришга ҳам алоҳида эътибор берилган.

АҚШ ва Япония қатори, биотехнология Фарбий Европа мамлакатларида ҳам тезкорлик билан ривожланиб бормоқда. Бу мамлакатлар яқин келажакда биотехнологик махсулотлар бозорида катта таъсирга эга бўлишлари кутилмоқда. АҚШ га ўхшаб, Фарбий Европа мамлакатларида ҳам ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб, кичик биотехнологик фирмалар сони кескин ошиб кетди. Улар, асосан авваллари фундаментал тадқиқотлар олиб борган лабораториялар асосида ташкил этилди. Улардан кўпчилиги ҳозирги вақтда саноат корпорациялари ва молия идоралари томонидан молиялаштирилган ёки ҳукумат томонидан молиявий муҳофаза қилинган.

Буюк Британияда ҳам биотехнологиянинг ривожланиши анча сезиларли даражада, уларда асримизнинг бошига келиб, шу соҳада фаолият кўрсатувчи 58 та фирма рўйхатдан ўтказилган эди. Бундай фирмаларнинг сони Францияда 51 та, Германияда 48 та эди.

Шунингдек, биотехнология Голландия, Италия, Дания, Швеция ва бошқа мамлакатларда ҳам жуда тез суръатларда ривожланиб бормоқда.

Биотехнологик жараёнлардан фойдаланиш кейинги йилларда айниқса, Хитой ва Ҳиндистонда ўта даражада ривожланиб бормоқда. Ишчи кучини, энергияни, сувни ва бошқа керакли омилларни Европа мамлакатлариға нисбатан арzonлиги Осиё мамлакатларида қўшма корхоналар яратиш имконини яратди. Биотехнологик усуллар асосида дори- дармонлар (антибиотиклар, витаминалар, органик ислоталар ва ҳ.к.), озуқа оқсилилари ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Бу мамлакатларда биологик газ тайёрлаш жуда ҳам сифатли йўлга қўйилган. Ният қиласизки, мамлакатимизда ҳам биотехнологик жараёнлардан фойдаланиш тез орада кенгроқ йўлга қўйилади

ва жаҳон стандартлари асосида ривожланган давлатлардаги каби ишлай бошлайди. Бунинг учун энг аввало билимдон инсонлар, иқтисодчилар ва етук малакали биотехнологлар.

Назорат саволлари:

1. Биотехнологик усуллар асосида дори- дармонлар ишлаб чиқариш
2. Биотехнологик фирмаларнинг фаолияти
3. Яқин келажакда биотехнологик махсулотлар бозори хақида маълумотлар
4. Замонавий биотехнология соҳасида етакчи мамлакат
5. Утилизация ва биотехнологиянинг ўзаро боғлиқлиги.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ibrahim, A. S., El-Shihy, O. M., & Fahmy, A. H. (2010). Highly efficient *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of elite Egyptian barley cultivars. *American–Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 4, 403–413.
2. Li, J. F., Park, E., Arnim, A. G., & Nebenfuhu, A. (2009). The FAST technique: A simplified Agrobacterium-based transformation method for transient gene expression analysis in seedlings of *Arabidopsis* and other plant species. *Plant Methods*, 5, 6–21.
3. Liu, G., & Godwin, I. (2012). Highly efficient sorghum transformation. *Plant Cell Reports*, 31, 1–9.
4. Lowe, B. A., Prakash, N. S., Way, M., Mann, M. T., Spencer, T. M., & Boddupalli, R. S. (2009). Enhanced single copy integration events in corn via particle bombardment using low quantities of DNA. *Transgenic Research*, 18, 831–840.
5. Ozawa, K. (2009). Establishment of a high efficiency *Agrobacterium*-mediated transformation system of rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Science*, 176, 522–27.

IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ

Үқув машғулотларни ташкил этиш бўйича кафедра профессор-үқитувчилари томонидан кўрсатма ва тавсиялар ишлаб чиқилади. Унда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курси тингловчилари асосий маъруза мавзулари бўйича олган билим ва кўникмаларини машғулотлар олиб бориш жараёнида янада бойитадилар. Шунингдек, дарслик ва ўқув қўлланмалар асосида тингловчилар билимларини мустахкамлашга эришиш, тарқатма материаллардан фойдаланиш, илмий мақолалар ва тезисларни тайёрлаш орқали тингловчилар билимини ошириш, мавзулар бўйича кўргазмали қуроллар тайёрлаш ва бошқалар тавсия этилади.

Амалий машғулотларда тингловчилар ўсимликлар биотехнологияси асосларидан олган назарий билимларни мустахкамлаши, амалий машғулотлар бажарилиши мумкин. Олинган билим ва кўникмалар дарсликлар, қўлланмалар, маъруза материаллари, илмий мақола ва тезислар ёрдамида, тарқатма материаллардан фойдаланилган холда мустахкамланади.

1-амалий машғулот: Бактерия ҳужайралари ва плазмида ажратиш.

Ўсимлик ҳужайра ва тўқималарини *in vitro* усулида қултиватция қилиш учун озуқа мухитини тайёрлаш. Озуқа мухитларни тайёрлашнинг протоколи. Ўсимликларнинг изолирланган ҳужайра ва тўқималари культуралари билан ишлашда ўтказиладиган стерилизация усуллари.

2-амалий машғулот: Каллус тўқима культураси.

Хўжайралар ҳосил бўлиши жараёнларининг таҳлили. Тамки каллус тўқимасили олиш ва унинг субкултиватцияси. Каллус культураларининг морфологик ва ўсиш кўрсаткичларини аниқлаш.

3-амалий машғулот: Ҳужайра суспензиялари культураси

Суспензион культурани олиш ва субкултиватцияси. Ҳужайра хаётчанлигини баҳолаш ва суспензион культураларнинг агрегирланиш даражаси.

4-амалий машғулот: Ўсимликлар ҳўжайраси культурасидаги дифференциацияси.

Тамаки ҳужайраси культурасидаги морфогенезга йўналтирилган фитогормонларнинг таъсири.

**5-амалий машғулот: Ўзбекистонда ўсимлик махсулотлари
етиширишда амалга ошириладиган биотехнологик жараёнлар.**

1. Суспензион култура олишнинг асосий усулларини айтиб ўтинг.
2. Ўсимлик хужайраси суспензион култураларини инициирлаш учун қўлланиувчи каллус тўқималарга қандай талаблар қўйилади?
3. Суспензион култураларнинг ўсиш циклининг ўртача давомийлиги қандай?
4. Хужайравий суспензия субкультивацияси қай тарзда амалга оширилади?
5. Суспензион културалар агрегирланиш даражасига қандай факторлар таъсир қиласи?
6. Суспензион култураларнинг агрегирланиш даражасига кўра турларини санаб ўтинг.
7. Ўсимлик хужайраси ҳаётчанлигини қандай қилиб аниқлаш мумкин?

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

Кейс. Геномика бўйича дарсликлар ва ўкув қўлланмаларнинг муаллифи тажрибали профессорнинг дарсларида фан мурракаб бўлганлиги туфайли-ми, профессор талабчан бўлганлиги туфайли-ми талабаларнинг ўзлаштирилиши юқори эмас эди. Унга фанни янги педагогик технологияларни дарс жараёнига киритишни тавсия этишди. Педагогик унга уйин сифат нарсаларга ўхшаб турган эди ва бирғиккитаси дарс давомида қўллаб, дарсдан ўзи қониқмади.

Талабалар ўзлаштиришини ошириши учун нима қилмоғи керак?

Сиз профессор ўрнида бўлганингизда нима қилган бўлардингиз?

Маъмуриятни ўрнида бўлганингизда нима килган бўлар эдингиз?

Талаба ўрнида бўлганингизда ўзлаштиришини ошириши учун нима қилган бўлар эдингиз.

Кейс. Геномика ўзининг асосида геносистематика деб аталади. Буларнинг фарқи организмлар геномини ўрганишдаги ёндашувда ўз аксини топади. Ҳозирги пайтда геносистематика асосан ДНК бўлакларининг нуклеотид кетма-кетлигини (масалан, генларни) ўрганади ва шу асосда организмларнинг қариндошлиги ҳақида холоса чиқарилади. Геномика эса ядро ва ҳужайра органеллаларини бутун геномларини тадқиқ қиласи ва уларни солишиди.

Қайси маркер организмлар эволюциясини ўрганиши учун муҳим қурол ҳисобланади?

1980 йилларда эволюциянинг муҳим молекуляр маркери – рибосомал РНК таклиф қилинди. Ҳозирги пайтда барча ишлатилаётган маркерлар ичida (гемоглобин, цитохром с ва бошқ.) айнан рРНК филогенетик тадқиқотларнинг оммавий қуроли ҳисобланади. Бунинг бир қанча сабаблари бор:

1. Рибосомал РНК ер юзидаги ҳаётнинг барча ҳужайравий шаклларида учрайди ва уларнинг барчасида бир хил функцияларни бажаради.

2. Рибосомал РНК етарлича консервативдир.

3. Молекуласида ўзгарувчанлиги турлича бўлган участкаларнинг мавжудлиги туфайли рРНК турли таксономик даражада эволюцион қариндошликини аниқлаш учун ишлатилиши мумкин.

4. Генларнинг PCR амплификацияси технологиясининг ривожланиши ва уларнинг нуклеотид кетма-кетлигини тезда аниқлашнинг имконияти турли организмларда рНК нинг тузилиши ҳақида катта маълумотлар базасини олиш имконини беради.

5. рРНК молекуласи барқарор иккиласи структурага эга бўлиб, у анча яхши ўрганилган. Иккиласи структура прокариотларнинг 5S ва 16S молекулаларини учун ва эукариотларнинг 5.8S и 18S учун яхши ўрганилган.

Кейс. Сувда эримайдиган органик моддаларни, ферментлар ёрдамида ўзгартириш усулини топиш мумкинми? Бу муаммони ечиш учун қатор тажрибалар ўтказилган. Оқибатда, агар эритма тўлиқ сувсизлантирилса ва фақат органик эритувчи қолса, ферментларни хусусиятлари ва структураси сақланиб қолиши мумкин эканлиги тасдиқланган.

Шундан кейин, маҳсус микроорганизмлар «конструкция» қилинган. Ген инженерлиги методи ёрдамида, микроорганизмларга, органик муҳитда фермент синтез қилиш хусусияти берилган.

Бундай микроорганизмлар, органик заҳарли муҳит таркибидаги сувда эримайдиган органик моддаларни захарсизлантириш (парчалаш) учун кенг ишлатилиб келинмоқда.

1-савол. Микроорганизмлар сифатида қайси авлод микроорганизмлари ишлатилади?

2-савол. Бу микроорганизмлар асосан қайси сувда эримайдиган органик моддаларни парчалашга мослашганлар?

3-савол. Ген муҳандислиги микроорганизмларнинг бу хоссаларни лимитловчи муаммоларни ҳал қила оладими?

Кейс. Кребс цикли кескин рўй берадиган энземдан энземгачча жараённи ҳосил қилишҳни намойиш этади. Булар шубҳа қилмайдиган тизимлар бўлиб, аммо улар тизимлар биологияси ёндошуви орқали амалга ошмайди, улар замонавий тизимлар биологиясини ҳам яратмайди.

Нима учун? Ушибу ечимни шакллантиринг ва асослаб беринг?

VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

1. *in vitro* шароитида културадаги ўсимлик хужайрасининг тотипотентлиги ва дифференцияция турлари.
2. Дифференцировканинг асосий босқичлари.
3. Хужайранинг компетент ва детерминирланган холати.
4. *in vitro* шароитида юқори ўсимликлар тўқималарининг дифференциацияси ва каллус хосил бўлиши.
5. *in vitro* шароитида ўсимлик хужайрасининг молекуляр-биологик тавсифи ва дифференцировкасининг биокимёвий маркерлари.
6. *in vitro* шароитида културалардаги флоэмогенез ва ксилемоногенез стимуляциясининг физиологик жихатлари.
7. *in vitro* нинг бирламчи ва адVENTив, тўғри ва тўғри бўлмаган морфогенези.
8. Ризогенез ва поя оргоногенезининг морфофизиологик тавсифи.
9. *in vitro* шароитида флорал органогенез индексиясининг шароити.
10. *in vitro* шароитида ўсимликлар регенератцияси.
11. Ўзоқ муддат культиватцияланувчи ўсимлик хужайраси популяцияси.
12. Озиқ-овқат махсулотлари саноати биотехнологиясида ген мухандислиги соҳасини ўрганишдан мақсад нима?
13. Ген мухандислиги усулларининг имкониятлари.
14. Ген мухандислиги қандай даражаларда амалга оширилади?
15. Грансген – организм нима?
16. ДНК репликация ҳақида маълумот.
17. Трансляция жараёни ҳақида маълумот.
18. Транскрипция жараёни ҳақида маълумот.
19. Генетик код нима?
20. Терминаторлар деганда нимани тушинасиз?
21. Мутация нима?
22. Клон нима?
23. Клонлаш жараёнига изоҳи.
24. Транспозонлар нима?
25. Плазмидаларга таърифи.
26. Рестриктазаларга изоҳи.
27. Рекомбинант ДНК деганда нимани тушинасиз?
28. Рекомбинант ДНК олиш усуллари.
29. Вектор молекулалари нима ва уларнинг типларига изоҳ.
30. Трасформация нима?
31. Лигаза ферментлари.

VII. ГЛОССАРИЙ

«Ўсимликлар биотехнологияси» модули бўйича

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
АЛЛЕЛЬ	Ген. Генлар ҳолатининг бири. Масалан: А ёки а.	One of several alternative forms of a gene that occur at a given locus on a chromosome. Most often there are two paired copies of a gene on homologous chromosomes. For each of your gene you get one copy (allele) from each parent. They may be nearly identical in DNA sequence or have slight variations (i.e. mutations).
АМИНОКИСЛОТА	Органик кислота молекуласида бир ёки бир нечта водород атомини аминогруппа NH ₂ га алмашинишдан ҳосил бўлади. Бунда NH ₂ группа кўпинча карбоксил группага қўшни углерод (альфа (α) углерод) атомининг водороди ўрнига киради ва α аминокислота ҳосил бўлади.	Any of a class of 20 molecules that are combined to form proteins in living things. The sequence of amino acids in a protein and hence protein function are determined by the genetic code
АНТИКОДОН	т РНК ўрта қисмидаги 3 та нуклеотид (триплет)дан иборат, и РНК нинг кодонига мос келади. Кодон ва антикодон комплементар бўлса, т РНК олиб келган аминокислота рибосоманинг катта бирлигига қолдирилади ва синтезланётган занжирига уланади.	An anticodon is a unit made up of three nucleotides that correspond to the three bases of the codon on the mRNA. Each tRNA contains a specific anticodon triplet sequence that can base-pair to one or more codons for an amino acid. Some anticodons can pair with more than one codon due to a phenomenon known as wobble base pairing.
БИОПОЛИМЕРЛАР	Юқори молекулали табиий брикмалар (оқсиллар, нуклеин кислоталар, полисахаридлар) бўлиб, молекуласи кўп маротаба такрорланадиган кичик молекулали мономер ёки улар қисмларидан иборат.	Polymers produced by living organisms; in other words, they are polymeric biomolecules.
ГЕНЕАЛОГИЯ	«Genealogia» - сўзидан олинган бўлиб, шажара деган маънони билдиради. Одамнинг бирор белги-хоссасининг авлодларда ирсийланишини тадқиқ этади.	Genealogy is a family history, is the study of families and the tracing of their lineages and history.
ГЕНЕТИК ИНЖЕНЕРИЯ	Ген муҳандислиги рекомбинант ДНКлар технологияси. Генетик ва	Modification of the natural DNA sequence of a gene or genes. Genetic engineering is the basis of

	биокимёвий усуллар ёрдамида организм ёки хужайра биологик ахборотни ўзгариши билан табиатда учрамайдиган, янги хусусиятга эга бўлган генлар тўпламини ва шу асосда янги штамм, нав ва зотларни яратиш.	the modern biotechnological revolution, to which we owe such inventions as insulin-producing bacteria.
ГЕНЕТИК КОД	Нуклеин кислоталар молекуласида ирсий ахборотнинг нуклеотидлар кетма-кетлигига берилишидан иборат. Генетик код Зта харф нуклеотиддан иборат бўлади. Бу триплет дейилади.	Three bases (e.g. 5'CGC3') in a DNA or RNA sequence specify a codon, which codes for an amino acid (e.g. arginine) in a protein. Genes are frequently tens of thousands of base-pairs long. Usually the codons of an exon are in phase within an uninterrupted open reading frame giving rise to long chains of amino acids after ribosomal translation.
ГЕНЛАР ДРЕЙФИ (генетик автоном жараёнлар)	Тасодифий омиллар таъсирида кичик популяцияларда генлар учраш тезлигининг ўзгариши. Одатда популяцияларда ирсий ўзгарувчанлик камайишга олиб келади. Қариндош уруғлар орасидаги никохлар ортиб кетганида бу ҳолат кучаяди. Бунда популяцияда селектив аҳамияти бўлмаган генлар сақланиб қолиши ва кўпайиши мумкин.	Practice of "stimulating biased inheritance of particular genes to alter entire populations. It has been proposed as a technique for changing wild populations of harmful organisms such as mosquitoes to be less dangerous.
ГЕНОМ	Генлар йигиндиси. Хромосомаларнинг гаплоид тўплами. Геномнинг генотипдан фарқи шундаки, у айрим зот ёки навни эмас, балки бир турни характерлаб беради.	A complete set (n) of chromosomes (hence, of genes) inherited as a unit from one parent plus one sex chromosome from the other parent in heterogametic individuals. The full genome sequences are available for hundreds of bacteria and viruses, human, and model organisms like mouse, frog, worm and fruit flies.
ГЕНОТИП	Организмнинг ирсий асоси. Диплоид тўпламдаги барча генлар йигиндиси.	The part (DNA sequence) of the genetic makeup of a cell, and therefore of an organism or individual, which determines a specific characteristic (phenotype) of that cell/organism/individual. Genotype is one of three factors that determine phenotype, the other two being inherited epigenetic factors, and non-inherited environmental factors.

ГОМОЛОГИК ХРОМОСОМА	Катталиги, шакли, генлари бир хил бўлган жуфт хромосомалар.	A couple of homologous chromosomes, or homologs, are a set of one maternal and one paternal chromosomes that pair up with each other inside a cell during meiosis.
ДНК	Дезоксирибонуклеин кислота. Фақат одамдагина эмас, балки барча бошқа эукариотларда, шунингдек, прокариотларда ирсий ахборот сақловчи саналади.	The molecule that encodes genetic information. DNA is a double-stranded molecule held together by weak bonds between base pairs of nucleotides. the four nucleotides in dna contain the bases stranded molecule held together by weak bonds between base pairs of nucleotides. The four nucleotides in DNA contain the bases: adenine (A), guanine (G), cytosine (C), and thymine (T). In nature, base pairs form only between A and T and between G and C; thus the base sequence of each single strand can be deduced from that of its partner.
и РНК	информационон РНК. У ўзида ДНК дан кўчириб олинган ахборотни сақлайди ва оқсил синтези жараёнида матрица (қолип, андаза) вазифасини бажаради. Шунинг учун у и-РНК, матрица-РНК си деб ҳам юритилади.	RNA that serves as a template for protein synthesis.
ИНТРОН	и РНК ниг «ахборотсиз» кисмлар йиғиндиши.	The DNA base sequences interrupting the protein-coding sequences of a gene; these sequences are transcribed into RNA but are cut out of the message before it is translated into protein. Compare exons.
ИРСИЯТ	Ирсийланиш жараёни орқали организмларнинг авлодлар алмашиниши давомида ирсий маълумотларни авлоддан-авлодга ўтказиш жараёни.	The passing of familial elements from one generation to the next.
МОДИФИКАТОР ГЕНЛАР	Организмдаги белги ва хусусиятларнинг ривожланишида иштирок этмай, балки бошқа асосий генларнинг таъсирини ўзгартирувчи, яъни бевосита эмас, билвосита таъсир этувчи генлардир.	Genes that have small quantitative effects on the level of expression of another gene
НУКЛЕИН КИСЛОТА	Юкори молекуляр биополимер бўлиб, жуда кўп	A large molecule composed of nucleotide subunits.

	мономерлардан тузилган органик бирикма. Унинг мономери нуклеотидлар бўлиб, нуклеин кислота полинуклеотид ҳисобланади.	
ПИРИМИДИН	ДНК нинг биринчи занжиридаги пурин азотли асосига комплементар ҳолатда 2 чи занжирида жойлашган азотли асос.	Nitrogen-containing organic bases made from a single ring structure. Includes cytosine and thymine (DNA) and uracil (RNA) that base-pair with purines to form the rungs in the DNA double helical ladder.
ПОЛИМОРФИЗМ	Кўп шаклилий бир тур доирасида бир-биридан кескин фарқ қилувчи индивидларнинг мавжудлиги.	A Difference in DNA sequence among individuals. Genetic variations occurring in more than 1% of a population would be considered useful polymorphisms for genetic linkage analysis. Compare mutation.
ПРОМОТОР	Оперондан олдинда жойлашган триплет гурухларидан бири бўлиб, РНК ва ДНК синтезини катализловчи РНК полимераза билан бирикиш хусусиятига эга.	A site on DNA to which RNA polymerase will bind and initiate transcription.
ПУРИН	Кўш занжирили ДНК молекуласининг 1-занжирида аденин ва тиминдан иборат асос. Комплементарлик қоидасига биноан 1-занжиридаги пурин асоси қаршисида 2-занжирида пиримидин асоси туради.	A nitrogen-containing, single-ring, basic compound that occurs in nucleic acids. The purines in DNA and RNA are adenine and guanine.
р РНК	РНКлар рибосоманинг ҳар иккала суббирликлари таркибида бўлади.	A class of RNA found in the ribosomes of cells.
т РНК	Транспорт рибонуклеин кислота. РНК полимераза ферменти иштироқида ДНК матрицасида синтезланади. т РНК қуий молекуляр массага эга бўлиб, 75-85 нуклеотиддан ташкил топган. У беда барги типидаги кўринишда бўлади. Рибосомаларга аминокислоталарни ташиш вазифасини ўтайди.	A class of RNA having structures with triplet nucleotide sequences that are complementary to the triplet nucleotide coding sequences of mRNA. The role of tRNAs in protein synthesis is to bond with amino acids and transfer them to the ribosomes, where proteins are assembled according to the genetic code carried by mRNA.
УРАЦИЛ	Пиримидин асослари; РНК ва эркин нуклеотидлар таркибида киради.	A common pyrimidine found in RNA, it base pairs with adenine and is replaced by thymine in DNA. Methylation of uracil produces thymine. It turns into

		thymine to protect the DNA and to improve the efficiency of DNA replication. Uracil can base pair with any of the bases depending on how the molecule arranges itself on the helix, but readily pairs with adenine because the methyl group is repelled into a fixed position.
ЦИТОЗИН	Нуклеин кислоталарнинг таркибий қисми бўлган нуклеотидларни ҳосил қилувчи 4 та азотли асоснинг биттаси. Комплментарлик принципига асосан цитозинли азотли асос қаршисида гуанин азотли асос туради.	Pyrimidine base found in RNA and DNA. Cytosine ($C_4H_5N_3O$) forms base-pairs with guanine only. It may become methylated where it occurs consecutively to guanine in the DNA sequence (see 5-methylcytosine).
ЭКЗОН	Ген (ДНК)нинг генетик ахборотга эга бўлган аминокислоталар кетмакетлигини ифодаловчи (кодловчи) қисми. Экзонлар инtron билан галлашиб туради.	The protein-coding DNA sequences of a gene. Compare introns.
ЭКСПРЕССИЯ	Намоён бўлиш - муайян ген томонидан аниқланувчи белгининг фенотипда организмнинг яшаш шароитига қараб намоён бўлиш даражаси.	Production of observable/detectable characteristics of an organism, usually due to the synthesis of protein.

VIII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

Асосий адабиётлар

- 1.**Ibrahim, A. S., El-Shihy, O. M., & Fahmy, A. H. (2010). Highly efficient *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of elite Egyptian barley cultivars. *American–Eurasian Journal of Sustainable Agriculture*, 4, 403–413.
- 2.**Li, J. F., Park, E., Arnim, A. G., & Nebenfuhu, A. (2009). The FAST technique: A simplified Agrobacterium-based transformation method for transient gene expression analysis in seedlings of *Arabidopsis* and other plant species. *Plant Methods*, 5, 6–21.
- 3.**Liu, G., & Godwin, I. (2012). Highly efficient sorghum transformation. *Plant Cell Reports*, 31, 1–9.
- 4.**Lowe, B. A., Prakash, N. S., Way, M., Mann, M. T., Spencer, T. M., & Boddupalli, R. S. (2009). Enhanced single copy integration events in corn via particle bombardment using low quantities of DNA. *Transgenic Research*, 18, 831–840.
- 5.**Ozawa, K. (2009). Establishment of a high efficiency *Agrobacterium*-mediated transformation system of rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Science*, 176, 522–527.
- 6.** C. Neal Stewart, Jr. Plant biotechnology and genetics:principles, techniques, and applications John Wiley & Sons, Inc. 2008.—416 p.
- 7.** Nigel G. Halford. Plant Biotechnology Current and Future Applications of Genetically Modified Crops, John Wiley & Sons Ltd, 2006.—317 p.
- 8.** Adrian Slater, Nigel W. Scott, Mark R. Fowler Plant Biotechnology: The Genetic Manipulation of Plants 2nd Edition USA, 2008 English

Интернет-Сайт:

1. www.ziyonet.uz
2. <http://www.ctic.purdue.edu/CTIC/Biotech>.
3. <http://www.nysipm.cornell.edu/>