

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАЎБАР КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ (МИНТАҚАВИЙ) МАРКАЗИ**

**“АМАЛИЙ МАТЕМАТИКА ВА МЕХАНИКА”
йўналиши**

**“АНАЛИТИК МЕХАНИКА ВА УСТУВОРЛИК
НАЗАРИЯСИ”
модули бўйича**

Ў Қ У В – У С Л У Б И Й М А Ж М У А

Тошкент – 2016

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАЎБАР КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ (МИНТАҚАВИЙ) МАРКАЗИ**

“АНАЛИТИК МЕХАНИКА ВА УСТУВОРЛИК НАЗАРИЯСИ”

модули бўйича

Ў Қ У В – У С Л У Б И Й М А Ж М У А

Тошкент 2016

**Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2016 йил
6 апрелидаги 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида
тайёрланди.**

Тузувчи:

**ЎзМУ доценти,
М.Н. Сидиқов**

Такризчи:

**Dilmurat Azimov. Ph.D.Sc
Assistant Professor. Doctor of
Technical Sciences. Department
of Mechanical Engineering.
University of Hawaii at Manoa.
USA.**

*Ўқув -услубий мажмуа ЎзМУнинг Университет кенгашининг 2016 йил
7-сентябрдаги 1-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.*

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДИ.....	10
III. НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ.....	13
IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	61
V. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ	63
VI.КЕЙСЛАР БАНКИ.....	64
VII. ГЛОССАРИЙ	66
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	69

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш.

Мазкур дастур ривожланган хорижий давлатларнинг олий таълим соҳасида эришган ютуқлари ҳамда орттирган тажрибалари асосида “Амалий математика ва механика” қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналиши учун тайёрланган намунавий ўқув режа ҳамда дастур мазмунидан келиб чиққан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қилади

Жамият тараққиёти нафақат мамлакат иқтисодий салоҳиятининг юксаклиги билан, балки бу салоҳият ҳар бир инсоннинг камол топиши ва уйғун ривожланишига қанчалик йўналтирилганлиги, инновацияларни тадбиқ этилганлиги билан ҳам ўлчанади. Демак, таълим тизими самарадорлигини ошириш, педагогларни замонавий билим ҳамда амалий кўникма ва малакалар билан қуроллантириш, чет эл илғор тажрибаларини ўрганиш ва таълим амалиётига тадбиқ этиш бугунги куннинг долзарб вазифасидир. “Аналитик механика ва устуворлик назарияси” модули айнан мана шу йўналишдаги масалаларни ҳал этишга қаратилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари:

“Аналитик механика ва турғунлик назарияси” модулининг мақсади: тингловчиларга классик механиканинг фундаментал асосларини етарли даражада ўқитиш ва бу назарий билимлар ёрдамида механик масалаларнинг ҳаракат дифференциал тенгламаларини тузишга ва уларни интеграллаш усуллари ёрдамида татқиқ қилишга, боғланишдаги жисмлар ҳаракатига оид масалаларни ечишда қўллашга, турғунлик назариясининг асосий методлари билан таништириш ва аниқ масалаларни ечишда бу методлардан фойдаланишни ўргатишдан иборат.

Модулнинг вазифаси мазкур дастур доирасида тингловчиларга классик механика жараёнларини аниқ тасаввур қилиш, бу жараёнларнинг математик моделини тузиш ва ечимларини топиш методларини ўрганиш, ечимларни механик таҳлил қилиш, тегишли усуллар ёрдамида ишлаб чиқаришда ишлатиладиган қурилмаларнинг ҳаракатлари назарий томондан устуворликка текширишдан иборат.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар.

“Аналитик механика ва устуворлик назарияси” модулининг ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида **тингловчи:** Модулни ўзлаштириш жараёнида механика масалаларини тўғри қўйишни, масалани ечиш усули танлашни, технологик ва амалий масалаларни ечишда олинган натижаларни таҳлил қилиш ва бу билимлар асосида

муайян механик системалар ҳаракатини ўрганишда, уларнинг математик моделларини куришда, ҳаракат дифференциал тенгламаларини ечишда ҳамда тадқиқ қилишда аналитик механиканинг асосий принципларини, теоремаларини қўллаш **кўникмаларига** эга бўлишлари керак, шунингдек, механик системанинг ҳаракат тенгламаларини тузишни, хусусий ечимларини аниқлашни, аналитик механикага тегишли усуллар ёрдамида тенгламалар системасининг тартибини пасайтириш, оғдирилган ҳаракат тенгламаларини тузишни, устиворликка Ляпунов методлари ёрдамида текширишни ва бу билимларни табиатда учрайдиган механик жараёнларни турғун ёки нотурғунликка текширишда қўллай **билишлари** лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар.

“Аналитик механика ва устиворлик назарияси” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;

- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гуруҳли фикрлаш, коллоквиум ўтказиш ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги.

“Аналитик механика ва устиворлик назарияси” модули мазмуни ўқув режадаги “Таълимда ахборот-коммуникацион технологиялар” ўқув модули билан узвий боғланган ҳолда механиканинг долзарб муаммолари бўйича педагогларнинг касбий педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни.

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар ишлаб чиқаришда, космик парвозларни амалга оширишда ишлатиладиган механизм ва машиналарни лойиҳалаш жараёнида ва уларда кечадиган механик ҳаракатларни ўрганишда, устивор дастурий ҳаракатларни амалга оширишда мазкур модулда ўрганиладиган теоремалар, принциплар, асосий усуллар муҳим ўрин тутди, чунки механизмларнинг узоқ вақт ишлаши, мустаҳкамлиги ва ҳаракатининг устиворлиги уларда кечадиган жараёнлар билан бевосита боғлиқ.

Модул бўйича соатлар тақсимоти.

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкلامаси, соат					
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкلامаси				Мустақил таълим
			жумладан				
			Жами	Назай	Амалий машғулот	Кўчма машғулот	
1.	Боғланишлар. Мумкин бўлган кўчиш принципи. Умумлашган кучлар. Раус ва Аппель тенгламалари	4	4	2	2		-
2.	Гамильтон принципи.	4	4	2		2	-
3.	Каноник алмаштиришлар. Гамильтон -Якоби дифференциал тенгламалари.	4	4	2	2		-
4.	Асосий тушунчалар ва теоремалар. Автоном системалар учун Ляпунов функциялари.	4	4	2	2		-
5.	Ляпунов функцияси ва уларни куриш усуллари.	4	2		2		2
6.	Консерватив системаларнинг устуворлиги. Циклик координаталар. Циклик интеграллар. Чизикли системаларнинг устуворлиги. Чизикли автоном системалар учун Ляпунов функцияларини куриш.	10	8	2	4	2	2
	Жами	30	26	10	12	4	4

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Боғланишлар. Мумкин бўлган кўчиш принципи. Умумлашган кучлар. Раус ва Аппель тенгламалари.

Механик система. Боғланишлар ва уларнинг таснифи. Умумлашган координаталар. Координата вариацияси. Мумкин бўлган ҳақиқий ва виртуал кўчишлар. Системанинг эркинлик даражаси. Идеал ва ноидеал боғланишлар. Умумлашган кучлар. Квазикоординаталар. Раус ва Аппель тенгламалари. Тезланишлар энергияси.

2-мавзу: Гамильтон принципи.

Гамильтон принципи. Пуанкаре-Картан интеграл инвариантлари. Пуанкаре-Картан интегралли тузилиши. Биринчи интеграллар ёрдамида тенгламалар системасининг тартибини пасайтириш. Уиттекер тенгламаси.

Универсал интеграл инвариантлар орасидаги боғланиш.

3-мавзу: Каноник алмаштиришлар. Гамильтон-Якоби дифференциал тенгламалари

Каноник алмаштиришлар. Эркин каноник алмаштиришлар. Алмаштиришнинг канониклик аломати. Гамильтон-Якоби дифференциал тенгламалари ва Якоби теоремаси. Гамильтон бўйича таъсир ва келтириб чиқарувчи функция.

4-мавзу: Асосий тушунчалар ва теоремалар. Автоном системалар учун Ляпунов функциялари

Устуворликнинг Ляпунов бўйича таърифи. Оғдирилган ҳаракат тенгламалари. Автоном системалар учун Ляпунов функциялари. Ляпунов функцияларининг хоссалари. Автоном системалар учун бевосита усулнинг асосий теоремалари: устуворлик ва асимптотик устуворлик ҳақидаги Ляпунов теоремалари, асимптотик устуворлик ҳақидаги Н.Н. Красовский теоремаси, ноустуворлик ҳақидаги Четаев ва Ляпунов теоремалари.

5-мавзу: Консерватив системаларнинг устуворлиги. Циклик интеграллар. Чизикли системаларнинг устуворлиги. Чизикли автоном системалар учун Ляпунов функцияларини қуриш

Консерватив системалар абсолют мувозанатининг устуворлиги. Лагранж, Четаев теоремалари. Консерватив системалар нисбий мувозанатининг устуворлиги. Циклик интеграллар. Раус функцияси. Гироскопик кучлар. Стационар ҳаракатлар ва уларнинг устуворлик шартлари. Раус, Ляпунов теоремалари. Гироскопик боғланмаган системалар.

Чизикли автоном системаларнинг устуворлиги. Ўзгармас коэффициентли чизикли Гамильтон системаларнинг устуворлиги. Биринчи яқинлашиш бўйича устуворлик ва тургунмаслик ҳақидаги теоремалар. Критик ҳоллар тушунчаси.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1-амалий машғулот:

Раус ва Аппель тенгламалари.

Идеал ва ноидеал боғланишли системаларга аниқ масалалар. Аниқ механик система учун Раус ва Аппель тенгламаларини тузиш усуллари, системанинг ишқаланиш қонуни. Ноидеал системаларда боғланишларни комбинациялаш.

2-амалий машғулот:

Каноник алмаштиришлар. Гамильтон -Якоби дифференциал тенгламаси.

Интеграл инвариантларга ва вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлган каноник алмаштиришларга масалалар ечиш. Алмаштиришларни канониклик

аломатига кўра келтириб чиқарувчи функцияни, алмаштиришларни валентлигини ва янги Гамильтон функциясини аниқлашга доир масалалар ечиш.

3-амалий машғулот:

Асосий тушунчалар ва теоремалар. Автоном системалар учун Ляпунов функциялари.

Кўзгалмас нуқта атрофидаги ҳаракатланаётган қаттиқ жисмни бош ўқлар атрофидаги прецессион ҳаракатини устуворлигини Ляпунов функцияси ва теоремаси ёрдамида ўрганиш. Функцияларни Ляпунов функцияси аломатига текшириш.

4-амалий машғулот:

Ляпунов функцияси ва уларни қуриш усуллари.

Ляпунов функциясини ҳозирда маълум бўлган учта усулига оид масалалар (квадратик форма кўринишида, биринчи интегралларнинг комбинацияси кўринишида ва алмаштиришлар ёрдамида масалани Ляпунов функцияси маълум бўлган системага келтириш)

5 – амалий машғулот:

Консерватив системаларнинг устуворлиги. Циклик интеграллар. Чизиқли системаларнинг устуворлиги.

Абсолют ва нисбий яққаланган мувозанат ҳолатининг устуворлигига тегишли аниқ масалалар. Лагранж теоремаси. Стационар ҳаракатнинг устуворлиги ҳақидаги Раус теоремасига масала.

Ўқитиш шакллари:

Мазкур модул маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

-маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;

-ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гуруҳли фикрлаш, кичик гуруҳлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усуллари қўллаш назарда тутилади.


БАҲОЛАШ МЕЗОНИ.

№	Ўқув-топширик турлари	Максимал балл	Баҳолаш мезони		
		2,5	"аъло" 2,2-2,5	"яхши" 1,8-2,1	"ўрта" 1,4-1,7
1.	Тест-синов топшириқларини бажариш	0,5	0,4-0,5	0,34-0,44	0,28-0,3
2.	Ўқув-лойиҳа ишларини бажариш	1	0,9-1	0,73-0,83	0,56-0,7
3.	Мустақил иш топшириқларини бажариш	1	0,9-1	0,73-0,83	0,56-0,7

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДИ.

Давра столининг тузилмаси.

Ёзма давра суҳбатида стол-стуллар айлана шаклида жойлаштирилиб, ҳар бир таълим олувчига конверт қоғози берилди. Ҳар бир таълим олувчи конверт устига маълум бир мавзу бўйича ўз саволини беради ва “Жавоб варақаси”нинг бирига ўз жавобини ёзиб, конверт ичига солиб қўяди. Шундан сўнг конвертни соат йўналиши бўйича ёнидаги таълим олувчига узатади. Конвертни олган таълим олувчи ўз жавобини “Жавоблар варақаси”нинг бирига ёзиб, конверт ичига солиб қўяди ва ёнидаги таълим олувчига узатади. Барча конвертлар айлана бўйлаб ҳаракатланади. Якуний қисмда барча конвертлар йиғиб олиниб, таҳлил қилинади. Қуйида “Давра суҳбати” методининг тузилмаси келтирилган



S	Аналитик механикага тегишли усуллардан фойдаланишнинг кучли томонлари	Механик системалар ҳаракатининг аналитик, яъни аниқ ечимларини топиш имкониятини беради.
W	Аналитик механикага тегишли усуллардан фойдаланишнинг кучсиз томонлари	Деформацияланувчи механик системаларнинг ҳаракатини ўрганишда ҳар доим ҳам қўллаб бўлмайди.
O	Аналитик механика фанининг усулларида фойдаланиш имкониятлари	Ҳар доим ҳам умумий ечимни аниқлаб бўлмасда, аналитик механиканинг усуллари ёрдамида хусусий ечимларни аниқлаш имконияти мавжуд.
T	Тўсиқлар (ташқи)	Аналитик усулларни эркинлик даражаси юқори бўлган системаларга қўлланилганда таҳлил қилишнинг мураккаблиги..

“Ассисмент” методи.

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўникмаларини текширишга йўналтирилган. Мазкур метод орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўникмалар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассисмент” лардан маъруза машғулотларида талабаларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

“Ассесмент” методига мисол



Тест

- 1. Гамильтон принципида қандай ҳаракатлар бир-бири билан солиштирилади ?
- А. ихтиёрий
- В. Хақиқий ва кинематик мумкин бўлган ҳаракатлар
- С. Бир нуқтадан чиқувчи



Қиёсий таҳлил

- Гамильтон принципини қулланиш соҳасини таҳлил қилинг?



Тушунча таҳлили

- Гамильтон бўйича таъсир қисқармасини изоҳланг...



Амалий кўникма

- Каноник алмаштириш аломатини бажариш кетма-кетлигини чизикли алмаштиришда келтиринг

III. НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-мавзу: БОҒЛАНИШЛАР. МУМКИН БЎЛГАН КЎЧИШ ПРИНЦИПИ. УМУМЛАШГАН КУЧЛАР. РАУС ВА АППЕЛЬ ТЕНГЛАМАЛАРИ.

РЕЖА:

- 1.1. Боғланишлар классификацияси. Мумкин бўлган кўчиш.
- 1.2. Идеал боғланишли системалар учун Лагранж принципи.
- 1.3. Кинематик боғланишли системаларнинг ҳаракат тенгламалари.

Таянч иборалари: боғланиш, кинематик, идеал, ноидеал боғланишлар, реаном, умумлашган координата, умумлашган куч.

1.1. Боғланишлар классификацияси. Мумкин бўлган кўчиш.

Система нуқталарининг ҳолати ва ҳаракатига қўйилган ҳар қандай чегара механикада боғланиш дейилади. Боғланишлар бирор координаталар системасига нисбатан система нуқталарининг координаталари x_i, y_i, z_i ($i = 1, 2, \dots, N$) улардан вақт буйича олинган биринчи тартибли ҳосилалари $\dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i$ ($i = 1, 2, \dots, N$) орасидаги маълум муносабатлар билан ифодаланади. Бу муносабатларда t вақт ошқор равишда қатнашиши мумкин.

Система нуқталарига қўйилган боғланишларни ифодаловчи муносабатлар тенгламалар ёки тенгсизликлардан иборат бўлиши мумкин.

Система нуқталарига қўйилган боғланишлар актив кучлар таъсиридаги система нуқталарининг ҳаракатини худди шу кучлар таъсиридаги эркин система нуқталарининг ҳаракатига нисбатан маълум маънода чеклайди.¹

¹ Wassim M. Haddad & Sergey G. Nersesov Stability and Control of Large-Scale Dynamical Systems USA, 2014, English

Бундай чеклашдан техниканинг турли соҳаларида, амалиёт учун зарур бўлган, мақсадга мувофиқ бирор йўналиш бўйича ҳаракатини таъминлашда фойдаланилади. Двигател цилиндри ичида ҳаракатланаётган поршен бунга мисол бўла олади. Бунда цилиндр боғланиш вазифасини ўтайди.

Шундай қилиб, боғланишдаги система нуқталарининг ҳаракати фақат система нуқталарига таъсир этувчи кучлар ва бошланғич шартларгагина боғлиқ бўлмай, балки қуйилган боғланишларга ҳам боғлиқ бўлади. Бу ҳолда бошланғич шартлар боғланиш тенгламаларини қаноатлантириши керак.

Система нуқталарига қуйилган боғланишлар турига қараб система нуқталари турлича ҳаракатда бўлади. Боғланишларнинг турли хилларини кўриб ўтаемиз.

Боғланишлар фақат система нуқталарининг координаталарини чекласа, бундай боғланишлар геометрик боғланишлар дейилади. Геометрик боғланишнинг тенгламаси

$$f(x_i, y_i, z_i, t) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, N),$$

кўринишда ёзилади. f - функция ва унинг ҳосилалари узлуксиз функция деб қаралади.

Агар боғланиш система нуқталарининг координаталаридан ташқари тезлигини ҳам чекласа, бундай боғланиш кинематик ёки дифференциалли боғланиш, дейилади. Кинематик боғланиш тенгламаси қуйидагича ёзилади:

$$\varphi(x_i, y_i, z_i, \dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i, t) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, N) .$$

Геометрик боғланишлар ва интегралланмаган кўринишдаги дифференциал боғланишлар Герц таърифига кўра голоном боғланишлар дейилади. Интегралланмайдиган дифференциал боғланишлар ноголоном боғланишлар дейилади. Ноголоном боғланиш тенгламаларини система нуқталари координаталарининг функциясидан иборат бўлган бирор функциянинг тўлиқ дифференциали тарзида ифодалаб бўлмайди. Агар боғланиш тенгламаси

вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлса, бундай боғланиш ностационар(реоном) боғланиш дейилади² [1](12-14 бетлар).

Мумкин бўлган кўчиш.

Аналитик механикада мумкин бўлган кўчиш тушунчаси асосий тушунчалардан бири ҳисобланади. Бу тушунчани голоном(геометрик) боғланиш қўйилган нуқта учун киритамиз. Моддий нуқтага

$$f(x, y, z, t) = 0,$$

голоном ностационар боғланиш қўйилган бўлсин. Бирор пайтда сирт устидаги нуқтанинг эгаллаган ҳолатидаи боғланишни қаноатлантирган ҳолда фикран ҳар қандай элементар (жуда кичик) кўчишларни олнш мумкннлигини тасаввур қилайлик. Бу кўчишларни нуқта раднус-векторинииг сирт устида жойлашган орттирмалари тарзида тасвирлаш мумкин. Мазкур кўчишиларни бириичи тартибли кичик миқдоргача аниқлик билан олсак, у ҳолда бу кўчишлар M нуқтада сиртга ўтказилган уринма текисликда ётади. **Қўйилган боғланишни берилган онда қаноатлантирувчи нуқтанинг ҳар қандай тасаввур қилинадиган чексиз кичик кўчиши мумкин бўлган кўчиш ёки виртуал кўчиш дейилади.** Нуқтанинг мумкин бўлган кўчиши $\delta \vec{r}(\delta x, \delta y, \delta z)$ билан белгиланади.³

Агар нуқтага стационар бўлмаган

$$f(x, y, z, t) = 0$$

боғланиш қўйилган бўлса, у ҳолда нуқтанинг мумкин бўлган кўчиши вақтнинг берилган пайтидаги аниқ қайд қилинган қиймати учун ҳисобланади, яъни бунда $\delta t = 0$ деб қаралади. Масалан, ҳаракатдаги ёки деформацияланувчи сирт устидаги нуқтанинг мумкин бўлган кўчиши, бе-

² Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. С.12-14

³ Wassim M. Haddad & Sergey G. Nersesov Stability and Control of Large-Scale Dynamical Systems USA, 2014,

рилган пайтда сирт эгаллаган ҳолатда нуқтанинг сирт бўйлаб элементар кўчишларидан иборат бўлади ва қуйидаги тенгламани қаноатлантиради:

$$\text{grad}f\delta\vec{r} = 0.$$

Агар системага қўйилган боғланишлар $\sum_{v=1}^{3N} a_{vp} \dot{x}_v + a_p = 0$ чизиқли кинематик

боғланишдан иборат бўлса, у ҳолда мумкин бўлган кўчишлар $\sum_{v=1}^{3N} a_{vp} \delta x_v = 0$

муносабатларни қаноатлантириши керак.

Боғланишни қаноатлантирган ҳолда нуқтанинг фазода dt вақт ичида элементар кўчиши *хақиқий кўчиш* дейилади. Агар нуқтага $f(x, y, z, t) = 0$ боғланиш қўйилган бўлса, у ҳолда M нуқтанинг dt вақт ичидаги хақиқий кўчиши $d\vec{r}$ шу пайтда траекторияга уринма бўйича йўналади. Нуқтанинг хақиқий кўчиши нуқтага таъсир этувчи кучларга, унга қўйилган боғланишга ва бошланғич шартларга боғлиқ бўлади. Нуқтанинг мумкин бўлган кўчиши билан хақиқий кўчиши орасидаги муносабатни аниқлаймиз. Агар нуқтага стационар боғланиш қўйилган бўлса, у ҳолда нуқтанинг ҳар бир хақиқий кўчиши бирорта мумкин бўлган кўчиши билан устма-уст тушади. Нуқтанинг ҳар бир мумкин бўлган кўчишини голоном боғланиш билан ифодаланган сиртга нисбатан нуқтанинг нисбий кўчиши деб қараш мумкин. Агар боғланиш стационар бўлса, яъни сирт геометрик шаклини ўзгартирмаса ва фазода кўчмаса, сирт устидаги нуқта кўчирма ҳаракатда қатнашмайди ва нуқтанинг барча мумкин бўлган кўчишлари абсолют кўчишлардан иборат бўлади. Бинобарин, кучлар таъсиридаги нуқтанинг исталган хақиқий кўчиши $d\vec{r}$ шу нуқтанинг бирор мумкин бўлган кўчиши $\delta\vec{r}$ билан устма-уст тушади. Стационар бўлмаган боғланишлар қўйилган нуқтанинг хақиқий кўчиши бирорта ҳам мумкин бўлган кўчиш билан устма-уст тушмаслиги мумкин. Механик система нуқталарининг мумкин бўлган кўчишлари $\delta\vec{r}_i$ тўплами системанинг мумкин бўлган кўчиши дейилади. Нуқтанинг мумкин бўлган кўчиши билан хақиқий кўчиши орасида ўрнатилган муносабатлар система нуқталарининг кўчишига ҳам тааллуқли бўлади.

Агар система M_i нуктасининг радиус-векторини \vec{r}_i ва координаталарини x_i, y_i, z_i билан белгиласак, M_i нуктанинг мумкин бўлган кўчиши

$$\delta\vec{r}_i = \delta x_i \vec{i} + \delta y_i \vec{j} + \delta z_i \vec{k}$$

вектор билан ифодаланади. Бунда $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ лар $Oxyz$ инерциал система координата ўқларининг бирлик векторларини, $\delta x_i, \delta y_i, \delta z_i$ лар эса мумкин бўлган кўчишнинг мазкур ўқлардаги проекцияларини ифодалайди ва координаталарнинг вариациялари дейилади.

M_i нуктанинг ҳақиқий кўчиши эса

$$d\vec{r}_i = dx_i \vec{i} + dy_i \vec{j} + dz_i \vec{k}$$

вектор билан ифодаланади. Бунда dx_i, dy_i, dz_i лар координаталарнинг дифференциалини ифодалайди.

Системанинг ҳолати умумлашган координаталар орқали ифодаланганда системанинг мумкин бўлган кўчишларини ҳам умумлашган координаталарнинг вариациялари орқали ифодалаш мумкин.

$$\delta\vec{r}_i = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \delta q_k$$

Юқорида кўрганимиздек, системанинг мумкин бўлган кўчишини аниқлашда боғланиш тенгламасида t ни ўзгармас деб қараш керак⁴ [1](15-18 бетлар)

Аналитик механикада системанинг ҳаракати ёки мувозанатини текширишда муҳим аҳамиятга эга бўлган яна битта тушунча **кучнинг мумкин бўлган кўчишдаги иши** тушунчаси киритилади. Кучнинг мумкин бўлган кўчишдаги элементар иши δA қуйидагича аниқланади:

$$\delta A = \vec{F} \delta \vec{r}.$$

Агар системанинг ҳар қндай мумкин бўлган кўчишида система нукталарига қуйилган боғланиш реакция кучларининг элементар бажарган ишлари

⁴ Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 15-18

йиғиндиси нолга тенг бўлса, бундай боғланишлар **идеал боғланишлар** дейилади. Идеал боғланишлар учун қуйидаги тенглик ўринли бўлади:

$$\delta A = \sum_{i=1}^N \vec{N}_i \delta \vec{r} = 0.$$

Ўз навбатида системага қўйилган боғланишлар ноидеал деб аталади, агар системанинг ҳар қандай мумкин бўлган кўчишида система нуқталарига қўйилган боғланиш реакция кучларининг элементар бажарган ишларининг йиғиндиси учун қуйидаги муносабат ўринли бўлса:

$$\delta A = \sum_{i=1}^N \vec{N}_i \delta \vec{r} = \tau \neq 0$$

Мумкин бўлган кўчиш принципи берилган кучлар таъсиридаги маълум боғланишлар қўйилган механик системанинг мувозанат шартини ифодалайди⁵ [1](30-33 бетлар).[2](16-17 бетлар)

Актив кучлар таъсиридаги идеал ва стационар боғланишлар қўйилган механик система мувозанатда бўлиши учун система нуқталарининг ҳар қандай мумкин бўлган кўчишида барча актив кучлани элементар ишларининг йиғиндиси нолга тенг (бўшатмайдиган) ва нолдан кичик ёки нолга тенг (бўшатадиган боғланишлар учун) бўлиши зарур ва етарлидир, яъни

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \delta \vec{r} \leq 0.$$

Шуни таъкидлаш керакки, бу Лагранж принципи ёрдамида ихтиёрий принцип шартларини қаноатлантириувчи механик системанинг мувозанат ҳолатини ўрганиш мумкин.

1.2. Циклик координаталар. Циклик интеграллар ёрдамида ҳаракат тенгламаларининг тартибини пасайтириш.

Таъриф. q_1, q_2, \dots, q_l ($l < n$) координаталар циклик координаталар деб аталади, агар бу координаталар L Лагранж функциясига ошкор равишда қатнашмаса. Таърифга кўра $L = L(q_{l+1}, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n, t)$ ёки $\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0$ ва Лагранж

⁵ Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 30-33
Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013. С.16-17

тенгламаларидан $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = c_k, (k = 1, 2, \dots, l)$ циклик интегралларни оламиз. Бунда

c_1, c_2, \dots, c_l интеграллаш доимийлари. Раус циклик интеграллардан

фойдаланиб, система ҳаракат тенгламаларининг тартибини пасайтирган.

Бунинг учун $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = c_k, (k = 1, 2, \dots, l)$ циклик интеграллар ёрдамида циклик

тезликларни позицион координаталар ва уларнинг тезликларга

$\dot{q}_k = \dot{q}_k(q_{l+1}, q_{l+2}, \dots, q_n, \dot{q}_{l+1}, \dot{q}_{l+2}, \dots, \dot{q}_n, c_1, c_2, \dots, c_l, t)$ нисбатан ечиб оламиз ва қолган

Лагранж тенгламаларига циклик тезликларни ўрнига қўйиб позицион

координаталарга нисбатан тенгламалар системасини ҳосил қиламиз. Мана шу

усул Раус томонидан амалга оширилган ва тенгламалар системасининг

тартиби пасайтирилган. Раус томонидан худди Лагранж функциясини ролини

бажарадиган $R = L - \sum_{k=1}^l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k$ функция киритилган ва циклик тезликлар

интеграллар ёрдамида позицион координаталар ва тезликлар орқали

алмаштирилган. Бунга кўра Раус функцияси

$R = R(q_{l+1}, q_{l+2}, \dots, q_n, \dot{q}_{l+1}, \dot{q}_{l+2}, \dots, \dot{q}_n, c_1, c_2, \dots, c_l, t)$ позицион координаталар, тезликлар

ва интеграллаш доимийларининг функциясидан иборат бўлади. Раус

функциясининг иккала томонини вариациялаб

$$\begin{aligned} \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial R}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \sum_{i=1}^l \frac{\partial R}{\partial c_k} \delta c_k &= \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \\ + \sum_{i=1}^l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i - \sum_{i=1}^l \delta \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i - \sum_{i=1}^l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \end{aligned}$$

ва бу тенгламанинг иккала томонидаги бир хил вариациялар олдидаги

коэффициентларни тенглаб

$$\frac{\partial R}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (i = l+1, \dots, n), \quad \dot{q}_k = -\frac{\partial R}{\partial c_k}, \quad (k = 1, 2, \dots, l).$$

Бундан Раус функциясидан олинган хусусий ҳосилалар Лагранж

функциясидан олинган хусусий ҳосилаларга тенг бўлиши келиб чиқар экан.

Олинган натижани ўрнига қўйиб,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial R}{\partial q_i} = 0 \quad i = l+1, l+2, \dots, n,$$

позицион координаталарга нисбатан ҳаракат тенгламаларини ҳосил қиламиз.

Шундай қилиб, циклик интеграллар ёрдамида тенгламалар системасининг тартибини циклик координаталар сонига камайтирса бўлар экан.

Раус тенгламалари.

Қуйида кинематик боғланишли системанинг ҳаракат тенгламаларини Лагранж кўпайтувчилари ёрдамида тузишни кўриб чиқамиз. Фараз қиламиз, N та моддий нуқтадан ташкил топган системага S геометрик идеал

$$f_\alpha(x, t) = 0 \quad (\alpha = \overline{1, S}),$$

ва r чизикли кинематик

$$\sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \dot{x}_k + a_\rho = 0$$

ёки

$$\sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} dx_k + a_\rho dt = 0 \quad (\rho = \overline{1, r}),$$

кўринишдаги кинематик боғланишлар қўйилган бўлсин. Бунда $a_{\rho k}, a_\rho$ - x, t ўзгарувчиларнинг функцияси. Агар механик система учун ўринли бўлган Даламбер–Лагранж принципида фақатгина геометрик боғланишларни ҳисобга оладиган бўлсак қуйидаги муносабатга эга бўламиз:

$$\sum_{i=1}^n \left\{ Q_i - \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} \right] \right\} \delta q_i = 0. \quad (1)$$

Бу тенгламадаги δq_i умумлашган координаталар вариацияларининг ҳаммаси ҳам эркин бўлмай, улар кинематик боғланишлар тенгламалари билан боғланган. Биринчи навбатда умумлашган координаталар

$$x_k = x_k(q, t) \quad (k = \overline{1, 3N})$$

киритиш билан геометрик боғланишларни ҳисобга оламиз. Бунга кўра:

$$dx_k = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x_k}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial x_k}{\partial t} dt \quad (n = 3N - S)$$

ва кинематик боғланишлар тенгламаларига кўйиб умумлашган координаталарга нисбатан кинематик боғланишларни оламиз.

$$\sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \sum_{i=1}^n \frac{\partial x_k}{\partial q_i} dq_i + \sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \frac{\partial x_k}{\partial t} dt + a_{\rho} dt = 0 \quad (\rho = \overline{1, r})$$

$$\sum_{i=1}^n \left[\sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \frac{\partial x_k}{\partial q_i} \right] dq_i + \left(\sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \frac{\partial x_k}{\partial t} + a_{\rho} \right) dt = 0$$

ёки
$$\sum_{i=1}^n A_{\rho i} dq_i + A_{\rho} dt = 0 \quad (\rho = \overline{1, r}) ,$$

бунда
$$A_{\rho i} = \sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \frac{\partial x_k}{\partial q_i} , \quad A_{\rho} = \sum_{k=1}^{3N} a_{\rho k} \frac{\partial x_k}{\partial t} + a_{\rho} .$$

Кинематик боғланишларга кўра умумлашган координаталарнинг вариациялари

учун
$$\sum_{i=1}^n A_{\rho i} \delta q_i = 0 \quad (\rho = \overline{1, r})$$

муносабатлар ўринли. Бу системани ҳар бир тенгламасини λ_{ρ} кўпайтувчиларга кўпайтириб кўшиб чиқамиз.

$$\sum_{\rho=1}^r \lambda_{\rho} \sum_{i=1}^n A_{\rho i} \delta q_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{\rho=1}^r \lambda_{\rho} A_{\rho i} \right) \delta q_i = 0. \quad (2)$$

(1) ва (2) тенгламаларни кўшиб

$$\sum_{i=1}^n \left\{ Q_i - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) + \frac{\partial T}{\partial q_i} + \sum_{\rho=1}^r \lambda_{\rho} A_{\rho i} \right\} \delta q_i = 0 ,$$

муносабатни ҳосил қиламиз. Бу тенгламадаги λ_{ρ} Лагранж кўпайтувчиларини шундай танлаб оламизки, ўзаро боғлиқ бўлган r та вариациялар олдидаги коэффициентлар ҳам нолга айлансин. Бундан

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{\rho=1}^r \lambda_{\rho} A_{\rho i} \quad (i = \overline{1, n}) \quad (3)$$

Бу тенгламалардаги номаълумлар сони $q_1, q_2, \dots, q_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ $n+r$ та бўлиб тенгламалар сони эса n та. Бу тенгламалар системасига кинематик боғланишлар тенгламаларини кўшиб $n+r$ та номаълумли $n+r$ та тенгламалар

системасини ҳосил қиламиз.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i + \sum_{\rho=1}^r \lambda_{\rho} A_{\rho i} \quad (i = \overline{1, n})$$

$$\sum_{i=1}^n A_{\rho i} dq_i + A_{\rho} dt = 0 \quad (\rho = \overline{1, r})$$

Олинган тенгламалар системаси **Раус тенламалари** деб аталади ва системага киритилган умумлашган координаталар q_i формал равишда умумлашган дейилади, чунки бу координаталар кинематик боғланишлар орқали ўзаро боғланган.[2](347 бет)

1.3. Кинематик боғланишли системаларнинг ҳаракат тенгламалари. Аппель тенгламалари.

Энди тенгламалар сони системанинг эркинлик даражасига тенг бўлган ҳаракат тенгламаларини келтириб чиқараш устида тўхталамиз. Фараз қиламиз, N та моддий нуқтадан ташкил топган системанинг ҳолати q_1, q_2, \dots, q_n умумлашган координаталар билан аниқлансин.

У ҳолда Декарт координаталари

$$x_v = x_v(q_1, q_2, \dots, q_n, t) \quad (v = \overline{1, 3N}) \quad (4)$$

$$dx_v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x_v}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial x_v}{\partial t} dt \quad (5)$$

$$\delta x_v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial x_v}{\partial q_i} \delta q_i \quad (v = \overline{1, 3N}) \quad (6)$$

умумлашган координаталар ва вақтнинг функцияси бўлади.

Бундан ташқари, системага

$$\sum_{i=1}^n a_{\rho k} \dot{q}_i + a_{\rho} = 0 \quad (\rho = \overline{1, r}), \quad (7)$$

ёки дифференциал кўринишдаги

$$\sum_{i=1}^n a_{\rho k} dq_i + a_{\rho} dt = 0 \quad (\rho = \overline{1, r}) \quad (8)$$

кинематик боғланишлар қўйилган бўлсин.

Бу боғланишлар умумлашган координаталарнинг вариацияларига қуйидагича

чегара қўяди:

$$\sum_{i=1}^n a_{\rho i} \delta q_i = 0 \quad (\rho = \overline{1, r})$$

(9)

Шундай қилиб, умумлашган координаталарнинг n та $\delta q_1, \dots, \delta q_n$ вариациялари r та (9) боғланишлар билан боғланган. (7) ва (8) муносабатлардан фойдаланиб (5) ва (6) тенгламалардаги ўзаро боғлиқ бўлган ҳақиқий кўчишларни, вариацияларни

$$dx_k = \sum_{j=1}^{n-r} B_{kj} dq_j + B_k dt \quad (k = \overline{1, 3N}), \quad (10)$$

$$\delta x_k = \sum_{j=1}^{n-r} B_{kj} \delta q_j,$$

чиқариб ташлаймиз. Бунда $B_{kj}, B_k - q_1, \dots, q_n, t$ ларга боғлиқ бўлган янги функциялар.

Бу ҳолда ўзаро боғлиқ бўлмаган вариациялар сони $(n-r)$ га тенг бўлади.

Бунга кўра Даламбер-Лагранж $\sum_{k=1}^{3N} (X_k - m_k \ddot{x}_k) \delta x_k = 0$ принципини қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$\sum_{j=1}^{n-r} \left[\sum_{k=1}^{3N} (X_k - m_k \ddot{x}_k) B_{kj} \right] \delta q_j = 0. \quad (11)$$

Актив кучларнинг элементар бажарган ишлари эса

$$\sum_{k=1}^{3N} X_k \delta x_k = \sum_{j=1}^{n-r} \sum_{k=1}^{3N} X_k B_{kj} \delta q_j = \sum_{j=1}^{n-r} Q'_j \delta q_j \quad (12)$$

кўринишда аниқланади. Бунда $Q'_j = \sum_{k=1}^{3N} X_k B_{kj}$ ўзаро боғлиқ бўлмаган вариацияларга тегишли умумлашган кучлар.

Принципга тегишли иккинчи ҳад устида тўхталамиз. (10) га кўра

$$\dot{x}_k = \sum_{j=1}^{n-r} B_{kj} \dot{q}_j + B_k \quad (k = \overline{1, \dots, 3N}).$$

Бу муносабатнинг иккала томонидан вақт бўйича ҳосила оламиз.

$$\ddot{x}_k = \sum_{j=1}^{n-r} B_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^{n-r} \sum_{i=1}^n \frac{\partial B_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_j \dot{q}_i + \sum_{j=1}^{n-r} \frac{\partial B_{kj}}{\partial t} \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n \frac{\partial B_k}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial B_k}{\partial t} \quad (k = \overline{1, 3N})$$

Бундан

$$B_{kj} = \frac{\partial \ddot{x}_k}{\partial \ddot{q}_j}$$

(13)

муносабат келиб чиқади.

Энди қуйидаги

$$S = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3N} m_k \dot{x}_k^2 \quad (14)$$

функцияни киритамиз. Бу S - функция Аппель томонидан киритилган бўлиб, тезланишлар энергияси деб аталади (кинетик $T = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3N} m_k \dot{x}_k^2$ энергияга ўхшаш)

ва

умумлашган тезланиш бўйича олинган ҳосила учун

$$\frac{\partial S}{\partial \ddot{q}_j} = \sum_{k=1}^{3N} m_k \ddot{x}_k \frac{\partial \ddot{x}_k}{\partial \ddot{q}_j} = \sum_{k=1}^{3N} m_k \ddot{x}_k B_{kj} \quad (15)$$

муносабат ўринли.

(13) и (15) га кўра Даламбер-Лагранж принципи қуйидаги кўринишга келади:

$$\sum_{j=1}^{n-r} \left(Q'_j - \frac{\partial S}{\partial \ddot{q}_j} \right) \delta q_j = 0. \quad (16)$$

Бундан δq_j вариацияларнинг ҳаммаси ўзаро боғлиқ бўлмагани учун

$$\frac{\partial S}{\partial \ddot{q}_j} = Q'_j \quad (j = \overline{1, n-r}) \quad (17)$$

тенгламалар системаси келиб чиқади. Бу тенгламалар системаси Аппель томонидан келтириб чиқарилган бўлиб, Аппель номи билан аталади. Бу тенгламаларнинг сони системани эркинлик даражасига тенг.

Ўзаро боғлиқ бўлмаган вариацияларга тегишли умумлашган кучларни топиш учун, актив кучларнинг мумкин бўлган кўчишлардаги ишларини ҳисоблаймиз

$$\delta A = \sum_{i=1}^n Q_i \delta q_i = \sum_{i=1}^{n-r} Q'_i \delta q_i$$

ва кинематик боғланишлар ёрдамида боғлиқ бўлган вариацияларни чиқариб ташлаймиз.

Шуни

таъкидлаш

керакки,

тезланишлар

энергияси $S = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3N} m_k \ddot{x}_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left(\frac{d^2 \vec{r}_k}{dt^2} \right)^2$ учун кинетик энергия учун ўринли

бўлган Кенига теоремасига ўхшаш теорема ўринли:

$$S = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left(\frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} + \frac{d^2 \vec{r}'_k}{dt^2} \right)^2 = \frac{1}{2} M \left(\frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \left(\frac{d^2 \vec{r}'_k}{dt^2} \right)^2 + \frac{d^2 \vec{r}_c}{dt^2} \sum_{k=1}^N m_k \frac{d^2 \vec{r}'_k}{dt^2}$$

ва $\sum_{k=1}^N m_k \frac{d^2 \vec{r}'_k}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} (\sum m_k \vec{r}'_k) = \frac{d^2}{dt^2} (M \vec{r}'_c) = 0$ эканлигини ҳисобга олсак,

$$S = \frac{1}{2} M \bar{W}_c^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N m_k \bar{W}'_k{}^2$$

Бунда C - система масса маркази; $M = \sum m_k$ - системанинг массаси;

Шундай қилиб, системанинг тезланишлар энергияси масса марказининг тезланиш энергиясидан (бу нуқтага системанинг массаси жамланган) ва масса маркази атрофидаги нисбий ҳаракат тезланишлари энергияларининг йиғиндисидан иборат бўлар экан⁶[1](67-73 бетлар).

Назорат саволлари:

1. Ноидеал боғланишлар деб қандай боғланишларга айтилади.
2. Лагранж принципи қандай системалар учун ўринли.
3. Мумкин бўлган кўчиш билан хақиқий кўчиш орасидаги фарқ нимада
4. Кинематик боғланишли системалар учун Лагранж тенгламалари ўринли бўладими.
5. Раус тенгламаларидаги координаталарни умумлашган координаталар сифатида қараш мумкинми.
6. Аппел тенгламаларининг сони системанинг эркинлик даражасидан қанчага фарқ қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 262. — ISBN 5-9221-0067-X.
2. Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013.
3. Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006
4. Уиттекер Е. Аналитическая динамика. М.: ОНТИ, 2001.

⁶ Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 67-73

РЕЖА:

- 2.1. Гамильтон бўйича таъсир.
- 2.2. Механиканинг асосий интеграл инварианти.
- 2.3. Универсал интеграл инвариантлар орасидаги боғланиш.

Таянч сўзлар: *вариация, умумлашган импульс, ҳақиқий ҳаракат, мумкин бўлган ҳаракат, инвариант.*

2.1. Гамильтон бўйича таъсир.

Классик механикада каноник алмаштиришлар Гамильтон тенгламаларига тегишли бўлиб, бу тенгламаларнинг интеграл инвариантларига асосланади. Шунинг учун бу инвариантларни келиб чиқишига тўхталиб ўтамиз.

Лагранж функцияси $L(t, q_i, \dot{q}_i)$ ва эркинлик даражаси n га тенг бўлган ихтиёрий геометрик боғланишли механик системани кўриб чиқамиз.

Маълумки, қуйидаги интеграл

$$S = \int_{t_0}^{t_1} L(t, q_i, \dot{q}_i) dt$$

(t_0, t_1) вақт оралиғидаги **Гамильтон таъсири** деб аталади.

Интеграл остидаги L Лагранж функцияси системанинг умумлашган координата ва тезликларнинг функцияси бўлгани учун, интегрални ҳисоблашда (t_0, t_1) вақт оралиғида $q_i(t)$ умумлашган координаталар маълум бўлиши керак. Бошқача қилиб таърифлаганда, Гамильтон таъсири система ҳаракатига боғлиқ бўлган функционал бўлади.

Система ҳаракатини талқин қиладиган бўлсак, ҳаракатни $(n+1)$ ўлчовли кенгайтирилган фазода нукта траекторияси деб қараш мумкин. Кенгайтирилган фазода иккита «фиксирланган» $M(t_0, q_i^0)$ ва $M_1(t_1, q_i^1)$ нукталардан ўтувчи, системани бошланғич (q_i^0) ҳолатдан $(t_0$ вақтга мос келувчи) (q_i^1) $(t_1$ вақтга мос келувчи) кейинги ҳолатига ўтказувчи мумкин

бўлган ҳаракатларни кўриб чиқамиз. Фараз қиламиз, мумкин бўлган ҳаракатлар орасида ҳақиқий ҳаракат мавжуд деб ва бу ҳаракат учун $L(t, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n)$ Лагранж функцияси мос келади, умумлашган $q_i(t)$ координаталар эса


$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0. \quad (i = 1, \dots, n)$$

Лагранжнинг 2-тур дифференциал тенгламаларини қаноатлантиради.

Қолган, M_0 ва M_1 нукталардан ўтувчи бошқа траекториялар тўпламини мумкин бўлган (атроф йўллар) ҳаракатлар деб атаймиз.

Гамильтон принципи:

Гамильтон таъсири ҳақиқий ҳаракат учун мумкин бўлган ҳаракатлардан фарқли, экстремал (стационар) қийматга эга бўлади (Гамильтон таъсирининг вариацияси $\delta W = 0$ бўлади).



1-Расм

Гамильтон принципнинг яна бир кўринишига тўхталиб ўтамиз. $(n+1)$ ўлчамли кенгайтирилган (t, q_1, \dots, q_n) координата фазоси ўрнига $(2n+1)$ ўлчамли кенгайтирилган $t, q_i, p_i (i = 1, \dots, n)$ (p_i умумлашган импульслар) фазони кўриб чиқамиз. Бу фазода фиксирланган $B_0(q_i^0, p_i^0, t_0)$ ва $B_1(q_i^1, p_i^1, t_1)$ нукталар орқали

ўтувчи ҳақиқий ҳаракатга мос келувчи траекторияни, шуниндек бу нукталардан ўтувчи барча бошқа мумкин бўлган ҳаракатларни («атроф» йўлларни) қараб чиқамиз(1-расм). Ҳақиқий ҳаракатга мос келувчи

$H(q_i(t), p_i(t), t)$ ва $q_i(t), p_i(t)$ ўзгарувчилар Гамильтон тенгмаларини

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad (i = 1, \dots, n) \text{ қаноатлантиради.}$$

Гамильтон функцияси $H(q_i(t), p_i(t), t)$ билан Лагранж функцияси $L(t, q_i, \dot{q}_i)$ орасидаги боғланишни

$$L^* = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H(t, q_i, p_i)$$

ҳисобга олсак, у ҳолда Гамильтон принципи қуйидаги

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} L^* dt = \delta \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) dt = 0$$

кўринишда ёзилади (принципнинг биринчи кўринишидан шартли ўларок) ва атроф йўллар сифатида таққослашга B_0 ва B_1 нуқталардан ўтувчи $(2n+1)$ -ўлчамли кенгайтирилган ҳаракат фазосининг ихтиёрий эгри чизиқлари олинади. Лекин кенгайтирилган $(2n+1)$ ўлчовли фазонинг p_1, \dots, p_n ўзгарувчилари (умумлашган импульслар)

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (i = 1, \dots, n)$$

тенгламани қаноатлантиришини ҳисобга олсак, у ҳолда Гамильтон принципнинг иккинчи кўриниши биринчи кўринишга ўтади.

2.2. Механиканинг асосий интеграл инварианти (Пуанкаре-Картан интеграл инварианти).

Гамильтон таъсирининг вариациясини, вақтнинг шунингдек координаталарнинг бошланғич ва охири қийматлари ўзгарувчан бўлган ҳолда, яъни α параметрнинг

$$\begin{aligned} t_0 &= t_0(\alpha), & q_i^0 &= q_i^0(\alpha), \\ t_1 &= t_1(\alpha), & q_i^1 &= q_i^1(\alpha) \end{aligned} \quad (i = 1, \dots, n) \quad (1)$$

функцияси бўлган ҳол учун кўриб чиқамиз.

Бу ҳолда $W = \int_{t_0}^{t_1} L dt$ интегрални параметр бўйича дифференциаллаб

қуйидаги ифодани ҳосил қиламиз:

$$\delta W = \delta \int_{t_0(\alpha)}^{t_1(\alpha)} L dt = L_1 \delta t_1 - L_0 \delta t_0 + \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt = L_1 \delta t_1 + \sum_{i=1}^n p_i^1 [\delta q_i]_{t=t_1} - L_0 \delta t_0 - \sum_{i=1}^n p_i^0 [\delta q_i]_{t=t_0} + \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i dt; \quad (2)$$

$$[\delta q_i]_{t=t_\lambda} = \left[\frac{\partial}{\partial \alpha} q_i(t, \alpha) \right]_{t=t_\lambda} \delta \alpha \quad (i = 1, \dots, n; \lambda = 0, 1). \quad (3)$$

Лекин $q_i^1 = q_i^1(t_1, \alpha)$ умумлашган координаталарнинг чегарадаги тўлик вариациялари учун

$$\delta q_i^1 = \dot{q}_i^1 \delta t_1 + \left[\frac{\partial q_i(t, \alpha)}{\partial \alpha} \right]_{t=t_1} \delta \alpha,$$

формулага эгамиз.

Ёки

$$\delta q_i^1 = [\delta q_i]_{t=t_1} + \dot{q}_i^1 \delta t_1 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Бу ердан

$$[\delta q_i]_{t=t_1} = \delta q_i^1 - \dot{q}_i^1 \delta t_1 \quad (i = 1, \dots, n). \quad (4)$$

Айнан шундай ифода умумлашган координатанинг бошланғич қийматлари учун ҳам ўринли:

$$[\delta q_i]_{t=t_0} = \delta q_i^0 - \dot{q}_i^0 \delta t_0 \quad (i = 1, \dots, n) \quad (5)$$

(4) ва (5) тенгламалардан фойдаланиб δw учун (2) ифодани қуйидаги


$$\delta W = \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]_0^1 + \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i dt. \quad (6)$$

кўринишини (одатдагидай умумлашган \dot{q}_i тезликларни умумлашган импульслар p_i орқали ифодалаб ва $\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L' = H$ тенгликни ҳисобга олиб) ҳосил қиламиз.

Бу тенгламада

$$\left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]_0^1 = \sum_{i=1}^n p_i^1 \delta q_i^1 - H_1 \delta t_1 - \sum_{i=1}^n p_i^0 \delta q_i^0 + H_0 \delta t_0.$$

Хусусий ҳолда, ҳар қандай α учун мос келувчи йўл ҳақиқий йўл бўлганда, яъни $q_i = q_i(t, \alpha)$ ($i = 1, \dots, n$) ҳақиқий ҳаракатлар тўпламидан иборат бўлса, (6) тенгликни ўнг томонидаги интеграл ҳар қандай α учун нолга тенг бўлади ва Гамильтон таъсири вариацияси учун ифода



2-Расм

$$\delta W = \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]_0^1 \quad (7)$$

оддий кўринишни қабул қилади⁷. [2](34-39:354-358), [1](103-108:113-117), [3](312-314)

Кенгайтирилган $(n+1)$ ўлчовли фазо ўрнига $(2n+1)$ ўлчовли фазо олинса, у ҳолда бу фазода нуқтанинг координаталари q_i, p_i, t катталиклардан иборат бўлади. Бу

фазода

$$q_i = q_i^0(t, \alpha), \quad p_i = p_i^0(t, \alpha), \quad t = t_0(\alpha) \quad (8)$$

$$(i = 1, \dots, n; \quad 0 \leq \alpha \leq L)$$

ихтиёрий ёпик C_0 эгри чизиқни оламиз ва α параметрни шундай танлаб оламизки. $\alpha = 0, \alpha = L$ қийматлар C_0 ёпик эгри чизиқнинг айнан битта нуқтасига мос келсин. C_0 ёпик эгри чизиқнинг ҳар бир нуқтасидан тегишли ҳақиқий ҳаракат траекторияларини ўтказамиз ва ҳақиқий ҳаракат траекториялари найчасини ҳосил қиламиз (2-расм).

$$q_i = q_i(t, \alpha), \quad p_i = p_i(t, \alpha) \quad (i = 1, \dots, n, \quad 0 \leq \alpha \leq L) \quad (9)$$

Бу ифодада $q_i(t, 0) \equiv q_i(t, L), \quad p_i(t, 0) \equiv p_i(t, L) \quad (i = 1, \dots, n).$

Бу найчада ихтиёрий равишда найчани қамраб олувчи ва ҳар бир ясовчи

⁷ Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013. С 34-39
Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 262. — ISBN 5-9221-0067-X. С. 103-117.
Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006. С. 312-314

билан фақат биттагина умумий нуктага эга бўлган C_1 эгри чизикни танлаб оламиз. C_1 эгри чизикнинг тенгламасини қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$q_i = q_i^1(\alpha), p_i = p_i^1(\alpha), t = t_1(\alpha) \quad (10)$$

Гамильтон таъсирини $W = \int_{t_0(\alpha)}^{t_1(\alpha)} L dt$ хақиқий ҳаракатлар найчаси бўйлаб C_0

эгри чизикдан C_1 эгри чизикқача қараб чиқамиз.

У ҳолда ҳар қандай α учун (7) ифодага кўра

$$\delta W = W'(\alpha) \delta \alpha = \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]_0^1.$$

Бу тенгликни $0 < \alpha < l$ ораликда интеграллаб қуйидаги

$$\begin{aligned} 0 = W(l) - W(0) &= \int_0^l \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]_0^1 = \int_0^l \left[\sum_{i=1}^n p_i^1 \delta q_i^1 - H_1 \delta t_1 \right] - \\ &- \int_0^l \left[\sum_{i=1}^n p_i^0 \delta q_i^0 - H_0 \delta t_0 \right] = \oint_{c_1} \sum_{i=1}^n (p_i \delta q_i - H \delta t) - \oint_{c_0} \sum_{i=1}^n (p_i \delta q_i - H \delta t) \end{aligned}$$

ифодани ҳосил қиламиз.

$$\text{Яъни} \quad \oint_{c_0} \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right] = \oint_{c_1} \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]. \quad (11)$$

Шундай қилиб, ихтиёрий ёпиқ контур бўйича

$$I = \int_c \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \quad (12)$$

интеграл бу контурни тўғри йўллар найчаси бўйлаб ихтиёрий силжитилганда (деформация билан) ўз қийматини ўзгартирмайди, яъни интеграл **инвариант** бўлади. Биз система Гамильтон системасидан иборат бўлса, у ҳолда (12) кўринишдаги интеграл инвариант бўлишини кўрсатдик.

Энди система ҳаракати қуйидаги биринчи тартибли дифференциал

$$\frac{dq_i}{dt} = Q_i(t, q_j, p_j), \quad \frac{dp_i}{dt} = P_i(t, q_j, p_j), \quad (i=1, \dots, n) \quad (13)$$

тенгламалар системаси билан аниқланиши муълум бўлсин ва $t = 0$ да q_i^0, p_i^0 ($i = 1, \dots, n$) Коши (бошланғич) шартлари қўйилган бўлсин.

Бундан ташқари, (12) Пуанкаре-Картан интеграллари (13) тенгламалар системаси билан аниқланувчи хақиқий ҳаракатларга нисбатан интеграл инвариант бўлсин, яъни бу хақиқий ҳаракатларнинг ҳар қандай найчаси учун ёпиқ контурни қамраб олган эгри чизиқ бўйича ҳисобланган Пуанкаре-Картан интеграллари ўз қийматини ўзгартирмайди. У ҳолда биз Гамильтон функцияси H ва Q_i, P_i функциялар ўртасида қуйидагича

$$Q_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad P_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (14)$$

боғланиш мавжуд.

2.3. Универсал интеграл инвариантлар орасидаги боғланиш.

Энди системанинг фиксирланган вақтдаги ҳолатларидан ташкил топган C контур бўйлаб

$$I = \oint \left[\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right]$$

интегрални кўриб чиқамиз. Бундай контур тўғри йўллар найчасини $t = const$ гипертекислик билан кесганда ҳосил бўлади ва Пуанкаре-Картан интеграл инварианти $\delta t = 0$ эканлигини ҳисобга олсак қуйидаги кўринишни олади:

$$I_1 = \oint \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i.$$

Бу интегрални биринчи булиб Пуанкаре киритган. Кейинроқ, бу интегрални Картан $H \delta t$ қўшилувчи киритиб, вақт ўзгарувчан бўлган ҳолатлардан таркиб топган контурларга ҳам қўлади. Пуанкаре интеграл инварианти, агар C контур бир хил вақтли ҳолатлардан иборат C_1 контурга ўтишида тўғри йўллар найчаси бўйлаб кўчса, у ўз қийматини ўзгартирмайди.

Пуанкаре интегралининг ифодасига Гамильтон функцияси H қатнашмайди, демак I_1 Пуанкаре интеграллари ҳар қандай Гамильтон системаси учун *инвариантдир*. Шунинг учун бу интеграл *универсал интеграл*

инвариант деб аталади.

I Пуанкаре-Картан ва I_1 Пуанкаре интеграллари **биринчи тартибли интеграл инвариантлар** ҳам деб аталади.

Биринчи тартибли I_1 интеграл инвариант Стокс формуласи

$$\oint_D \sum_{i=1}^n A_i \delta x_i = \iint_s \sum_{i < k}^1, \dots, n \left(\frac{\partial A_k}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial x_k} \right) \delta x_i \delta x_k$$

ёрдамида иккинчи даражали абсолют интеграл инвариант кўринишида берилиши мумкинлигини таъкидлаб ўтамиз.

1947 йилда хитойлик олим Ли Хуа-чжун универсал интеграл инвариантнинг ягоналигини исботлади. У ҳар қандай бошқа универсал интеграл инвариант санаб ўтилган интегралларнинг бирортасидан (доимий) ўзгармас кўпайтувчи билан фарқ қилишини кўрсатди.

Ли Хуа- чжун теоремаси.

Агар

$$I' = \oint \sum_{i=1}^n [A_i(t, q_k, p_k) \delta q_i + B_i(t, q_k, p_k) \delta p_i]$$

универсал интеграл инвариант бўлса, у ҳолда

$$I' = c I_1$$

бўлади. c -ўзгармас сон., I_1 -эса Пуанкаре интеграли.

Назорат саволлари:

1. Гамильтон принципидаги хақиқий йўл билан мумкин бўлган йўлнинг фарқи нимада?
2. Гамильтон принципнинг биринчи ва иккинчи кўринишлари орасидаги фарқи нимадан иборат?
3. Интеграл инвариант Лагранж системалари учун ўринлими?
4. Нима учун Пуанкаре интеграл инварианти универсал деб аталади?
5. Биринчи тартибли универсал интеграл инвариантлар орасида қандай боғланиш мавжуд?
6. Консерватив системалар учун Пуанкаре-Картан интеграли ҳар доим ҳам инвариант бўладими?

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 262. — ISBN 5-9221-0067-X.

2.Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013

3.Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006

4.Уиттекер Е. Аналитическая динамика. М.: ОНТИ, 2001.

РЕЖА:

- 3.1. Гамильтон системаларида ўзгарувчиларни алмаштириши.
- 3.2. Алмаштиришларни канониклик аломати.
- 3.3. Гамильтон-Якоби тенгламаси.

Таянч иборалар: каноник, келтириб чиқарувчи функция, валентлик, тўлиқ интеграл, унивалент.

3.1 Гамильтон системаларида ўзгарувчиларни алмаштириш.

Каноник алмаштиришлар Гамильтон системаларига тегишли бўлиб, бу алмаштиришлардан асосий мақсад, берилган ихтиёрий Гамильтон системасини бошқа структура жихатидан соддароқ Гамильтон функциясига эга бўлган система билан алмаштиришдир. Умумий ҳолда вақтга боғлиқ бўлган қуйидаги

$$\begin{aligned} q'_i &= q'_i(t, q_k, p_k), \quad p'_i = p'_i(t, q_k, p_k) \quad (i, k = 1, 2, \dots, n) \\ \frac{\partial(q'_1, p'_1, \dots, q'_n, p'_n)}{\partial(q_1, p_1, \dots, q_n, p_n)} &\neq 0, \end{aligned} \quad (1)$$

алмаштиришлар каноник дейилади, агар бу алмаштиришлар ихтиёрий Гамильтон

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i = 1, \dots, n) \quad (2)$$

системасини яна Гамильтон системасига (умумий ҳолда бошқа H' Гамильтон функцияси билан) ўтказса.

Яъни қуйидаги кўринишни эгалласа:

$$\frac{dq'_i}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial p'_i}, \quad \frac{dp'_i}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial q'_i} \quad (i = 1, \dots, n). \quad (3)$$

Каноник алмаштириш шартларини келтириб чиқариш учун кенгайтирилган $2n+1$ ўлчовли (q_i, p_i, t) ва (q'_i, p'_i, t) координат системаларида каноник алмаштиришлар натижасида, бири иккинчисига ўтувчи Гамильтон системаларининг ҳақиқий ҳаракатлар найлари бўйлаб, ихтиёрий ёпиқ C, C'

чизиклар бўйича олинган

$$I = \int_c \sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t, I' = \int_{c'} \sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i - H' \delta t$$

интегралларни кўриб чиқамиз.

Биринчи интеграл Гамильтон функцияси $H(q_i, p_i, t)$ бўлган Гамильтон системаси учун инвариант бўлса, иккинчи интеграл каноник алмаштиришлардан ҳосил бўлган $H'(q'_i, p'_i, t)$ Гамильтон системаси учун инвариант бўлади. Агар иккинчи интеграл остидаги (q'_i, p'_i) ўзгарувчиларни (1) тенгламага асосан (q_i, p_i) лар билан алмаштирак C ёпиқ контур C' ёпиқ контурга ўтади ва иккинчи интеграл бошланғич Гамильтон системаси учун янги инвариантга айланади. Лекин Ли Хуа-чжун теоремасига кўра бу икки интеграл орасида қуйидаги

$$\int_{c'} (\sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i - H' \delta t) = c \int_c (\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t) \quad (4)$$

боғланиш ўринли бўлади (вақт каноник алмаштиришларда ўзгармасдан қолади)

ёки

$$\int_c ((\sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i - H' \delta t) - c(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t)) = 0 \quad (5)$$

тенглама бажарилади.

Ҳақиқий ҳаракатлар трубкасида олинган ихтиёрий ёпиқ соҳа бўйича интеграл нолга тенг бўлиши учун интеграл остидаги ифода (q_i, p_i, t) ўзгарувчиларга боғлиқ бўлган қандайдир $F(q_i, p_i, t)$ функциянинг тўлиқ дифференциали бўлиши керак.

У ҳолда

$$\sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i - H' \delta t = c(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t) - \delta F. \quad (6)$$

ва тенгликдаги ўзгармас $c \neq 0$ чунки, тенгликнинг чап томонидаги ифода тўлиқ дифференциал эмас, шунинг учун δF га тенг бўлмайди.

$F(q_i, p_i, t)$ функцияни келтириб чиқарувчи функция, c ўзгармасни каноник алмаштиришлар валентлиги деб аталади. $c=1$ бўлган ҳолда, алмаштиришлар *унивалент каноник ўзгартиришлар* дейилади. Юқоридаги аналитик амалларни ҳисобга олиб, қуйидаги теоремани келтиришимиз мумкин:

Гамильтон системасидаги (1) алмаштиришлар каноник бўлиши учун, (6) тенгламани қаноатлантирувчи келтириб чиқарувчи F функция ва $c \neq 0$ ўзгармаснинг мавжуд бўлиши зарур ва етарли.

3.2 Алмаштиришларни канониклик аломати (критерийси).

Юқорида келтирилган каноник алмаштириш шартида қатнашувчи ўзаро боғлиқ бўлмаган ва q_i, p_i ўзгарувчиларнинг функцияси бўлган

$$q'_i = \varphi_i(p_i, q_i, t), \quad p'_i = \phi_i(q_i, p_i, t) \quad (7)$$

алмаштиришлар каноник бўлиши учун қандай шартларни қаноатлантириши кераклигини кўриб чиқамиз.

Фараз қиламиз (6) кўринишдаги алмаштиришлар каноник алмаштиришлардан иборат бўлсин. У ҳолда бу алмаштиришлар учун қуйидаги

$$\sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i - H' \delta t = c \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right) - \delta F \quad (8)$$

айният ўринли бўлиши керак.

Энди вақтнинг ихтиёрий фиксирланган $t = t'$ қийматини оламиз. У ҳолда юқоридаги (8) айнайт

$$\sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i = c \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i \right) - \delta F \quad (9)$$

кўринишга эга бўлади.

Бу тенглама валентлиги c бўлган ва фиксирланган вақтдаги

$$q'_i = \varphi_i(q_i, p_i, t'), \quad p'_i = \phi_i(q_i, p_i, t') \quad (i = 1, \dots, n)$$

каноник алмаштиришларни аниқлайди.

Энди тескариси, яъни (9) тенглама билан аниқланувчи барча

алмаштиришлар вақтнинг ихтиёрий фиксирланган қийматида бир хил валентлик алмаштиришлар бўлсин.

Бу ҳолда алмаштиришлар натижасида ҳосил бўлган Гамильтон функциясини қуйидагича

$$H' = cH + \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_{i=1}^n p_i' \frac{\partial q_i}{\partial t} \quad (10)$$

аниқлаб ва бу тенгламани вақтнинг вариациясига кўпайтириб (9) ва (10) тенгламаларни икки томонини кўшсак (8) ифодага эга бўламиз.

Шундай қилиб, вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлган

$$q_i' = \varphi_i(q_i, p_i, t), p_i' = \phi(q_i, p_i, t), (i=1, \dots, n)$$

алмаштиришлар каноник бўлиши учун, ихтиёрий фиксирланган вақтни қийматида

$$q_i' = \varphi_i(q_i, p_i, t'), p_i' = \phi(q_i, p_i, t'), (i=1, \dots, n)$$

алмаштиришлар бир хил c валентлик каноник алмаштиришлар бўлиши зарур ва етарлидир.

Бизга қуйидаги алмаштиришлар берилган бўлсин:

$$q_i' = \varphi_i(q_i, p_i), p_i' = \phi(q_i, p_i), \frac{\partial(q_1', \dots, p_n')}{\partial(q_1, \dots, p_n)} \neq 0, (i=1, \dots, n). \quad (11)$$

Бу ҳолда алмаштиришларни канониклигини аниқловчи айният қуйидагича аниқланади:

$$\sum_{i=1}^n p_i' \delta q_i' = c \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i \right) - \delta F(q_i, p_i). \quad (12)$$

Агар бу тенгламадаги $p_i', \delta q_i'$ ларни (p_i, q_i) ўзгарувчилар орқали ифодаласак (7) ёрдамида

$$\sum_{i=1}^n (\Phi_i \delta q_i + \Psi_i \delta p_i) = -\delta K(q_i, p_i) \quad (13)$$

тенгликни ҳосил қиламиз.

Бу тенгликдаги (Ψ_i, Φ_i) функциялар учун

$$\Phi_i = \sum_{i=1}^n p_i' \frac{\partial q_i'}{\partial q_i} - c p_i, \Psi_i = \sum_{i=1}^n p_i' \frac{\partial q_i'}{\partial p_i} \quad (i=1, \dots, n)$$

ифодаларга эга бўламиз.

Алмаштиришлар канониклиги (12) тенгламанинг чап қисмида турган ифоданинг тўлиқ дифференциаллик шартидан аниқланади:

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial q_k} = \frac{\partial \Phi_k}{\partial q_i}, \frac{\partial \Psi_i}{\partial p_k} = \frac{\partial \Psi_k}{\partial p_i}, \frac{\partial \Phi_i}{\partial p_k} = \frac{\partial \Psi_k}{\partial q_i}, (i, k = 1, \dots, n)$$

Эркин каноник алмаштиришлар

Агар каноник алмаштиришлар учун қуйидаги қўшимча $\frac{\partial(q'_1, \dots, q'_n)}{\partial(p_1, \dots, p_i)} \neq 0$

шарт бажарилса, у ҳолда бу алмаштиришлар эркин каноник алмаштиришлар дейилади. Бу ҳолда янги ўзгарувчилар сифатида (q_i, q'_i) ларни олиш мумкин.

Ҳақиқатдан ҳам, қўшимча қуйилган шарт каноник алмаштиришлардаги биринчи n та тенгламадаги умумлашган импульслар p_i ларни қолган (q'_i, q_i, t) ўзгарувчилар орқали ифодалаш имкониятини беради. Бу ҳолда келтириб чиқарувчи функцияни қуйидаги $F(t, q_i, p_i) = S(t, q_i, q'_i)$, кўринишда олиш мумкин, яъни янги ўзгарувчилар функцияси деб қараш мумкин ва эркин каноник алмаштиришлар шarti

$$\sum_{i=1}^n p'_i \delta q'_i - H' \delta t = c \left(\sum_{i=1}^n p_i \delta q_i - H \delta t \right) - \delta S(t, q_i, q'_i) \quad (14)$$

кўринишга келади.

Вариациялар олдидаги коэффициентларни тенглаб

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = c p_i, \quad \frac{\partial S}{\partial q'_i} = -p'_i, \quad H' = cH + \frac{\partial S}{\partial t} \quad (15)$$

ифодаларни ҳосил қиламиз.

Бу тенгламалар системаси эркин каноник **алмаштиришлар**ни аниқлайди. $C=1$ бўлган ҳолда алмаштиришлар эркин **унивалент каноник алмаштиришлар** дейилади. (14) тенгламалар системаси учун қуйидаги

хусусий ҳол ўринли. Агарда $H' = cH$ га тенг бўлса, у ҳолда $\frac{\partial S}{\partial t} = 0$, яъни

келтириб чиқарувчи функция S вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлмайди.

Эркин каноник алмаштиришлар шартидан, алмаштиришлар вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлмаган ҳолда Гамильтон функциясининг кўриниши кўп хам ўзгармаслиги келиб чиқади. Шунинг учун Гамильтон функциясини оддийроқ кўринишга келтириш учун алмаштиришларни вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлган ҳолда олинади⁸. [2](368-374),[1](140-152),[3](340-352)

3.3. Гамильтон-Якоби тенгламаси.

Эркин каноник алмаштиришлар натижаси сифатида Гамильтон–Якоби тенгламаси келиб чиқади. Бунинг учун шундай эркин каноник алмаштиришларни қидирамизки, бу алмаштиришлар натижасида берилган Гамильтон тенгламалари

$$\frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i=1, \dots, n) \quad (15)$$

Гамильтон функцияси $H' = 0$ булган Гамильтон ситемасига ўтсин, яъни

$$\frac{dq'_i}{dt} = \frac{\partial H'}{\partial p'_i}, \frac{dp'_i}{dt} = -\frac{\partial H'}{\partial q'_i} \quad (i=1, \dots, n). \quad (16)$$

У ҳолда $H' = 0$ эканлигини ҳисобга олсак бу тенгламаларни интеграллаб қуйидаги

$$q'_i = \alpha_i, p'_i = \beta_i \quad (i=1, \dots, n)$$

ечимларни ҳосил қиламиз ва бу тенгламалар системасини q_i, p_i ўзгарувчиларга нисбатан ечиб бошланғич система ҳаракатини аниқлаймиз.

Бундай алмаштиришларни топиш учун эркин каноник ўзгартиришлар шартларига мурожат қиламиз. Агар $H' = 0$ эканлигини қисобга олсак, келтириб чиқарувчи функция учун

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H(t, q_i, p_i) = 0$$

⁸ Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013. С 368-374
Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 262. — ISBN 5-9221-0067-X. С. 140-152.
Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006. С. 340-352

тенгламани ҳосил қиламиз.

Лекин $\frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i$ бўлгани учун, келтириб чиқарувчи функция

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H(t, q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}) = 0$$

тенгламани қаноатлантиради.

Бу хусусий ҳосилалар тенглама **Гамильтон-Якоби тенгламаси** деб аталади. Бу тенгламадан ташқари, келтириб чиқарувчи функция учун қуйидаги $\det(\frac{\partial^2 S}{\partial q_i \partial \alpha_i}) \neq 0$ шарт бажарилиши керак.

Келтириб чиқарувчи функция топилиши билан

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha'_i} = -\beta'_i, \quad \frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i$$

тенгламалардан қидирилаётган эркин каноник алмаштиришларни топамиз.

Таъриф. Қуйидаги $\det(\frac{\partial^2 S}{\partial q_i \partial \alpha_i}) \neq 0$ шартни қаноатлантирувчи,

Гамильтон-Якоби тенгламасининг ечими бўлган ва ихтиёрий n та ўзаро боғлиқ бўлмаган $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ўзгармасларни ўз ичига олган $S(t, q_i, \alpha_i)$ функция, Гамильтон-Якоби тенгламасининг тўлиқ интегралли дейилади.

Гамильтон-Якоби теоремаси. Агар $S(t, q_i, \alpha_i)$ функция Гамильтон-Якоби тенгламасининг тўлиқ интегралли бўлса, у ҳолда Гамильтон функцияси $H(t, q_i, p_i)$ бўлган системанинг ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha'_i} = -\beta'_i, \quad \frac{\partial S}{\partial q_i} = p_i.$$

Шундай қилиб, Гамильтон-Якоби тенгламасининг тўлиқ интегралли маълум бўлса, у ҳолда Гамильтон тенгламаларини, яъни оддий дифференциал тенгламалар системасини интеграллашга ҳожат қолмайди.

Агар система умумлашган консерватив системадан иборат бўлса, яъни $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$ бажарилса, у ҳолда Гамильтон-Якоби тенгламаси

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H(q_i, \frac{\partial S}{\partial q_i}) = 0 \quad (17)$$

кўринишда бўлади ва тўлиқ интеграллини

$$S = -ht + W(q_1, \dots, q_n, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, h)$$

иккита йиғинди сифатида қараш мумкин.

Келтириб чиқарувчи функциянинг бу ифодасини (17) тенгламага қўйиб, W функцияни аниқлаш учун

$$H\left(\frac{\partial W}{\partial q_1}, \frac{\partial W}{\partial q_2}, \dots, \frac{\partial W}{\partial q_n}, q_1, q_2, \dots, q_{n-1}\right) = h \quad (18)$$

тенгламани оламиз.

Гамильтон-Якоби теоремасига кўра h ва ўзаро боғлиқ бўлмаган $n-1$ та $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ доимийлар катнашадиган қуйидаги $W(q_1, q_2, \dots, q_n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, h)$ тўлиқ интеграллини топиш етарлидир.

Система ҳаракат қонуни эса

$$\frac{\partial W}{\partial \alpha_1} = \beta_1, \frac{\partial W}{\partial \alpha_2} = \beta_2, \dots, \frac{\partial W}{\partial \alpha_{n-1}} = \beta_{n-1}, \frac{\partial W}{\partial h} = t + \gamma, \quad (19)$$

$$P_1 = \frac{\partial W}{\partial q_1}, P_2 = \frac{\partial W}{\partial q_2}, \dots, P_n = \frac{\partial W}{\partial q_n} \quad (20)$$

тенгламалардан аниқланади. Ҳозиргина биз қараб чиққан ҳол, хусусан кучлар куч функциясига эга бўлганда ва боғланишлар вақтга ошкор боғлиқ бўлмаган ҳолга мос келади.

Гамильтон-Якоби тенгламасидаги Гамильтон функцияси вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлмаган ҳолда тўлиқ интегрални топишни соддалаштириш учун биз фойдаланган усул шунингдек, системада бир нечта ўзгарувчи циклик ўзгарувчи (координата) бўлган ҳол учун ҳам ўринлидир⁹. [2](430-434), [1](153-160), [3](413-417)

⁹ Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013. С 430-434
Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 262. — ISBN 5-9221-0067-X. С. 153-160.
Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006. С. 413-417

Назорат саволлари:

1. Ҳар қандай вақтга нисбатан чизиқли алмаштиришлар каноник бўладими?
2. Каноник алмаштиришларнинг моҳияти нимадан иборат?
3. Валентлиги нолга тенг бўлган алмаштиришлар каноник бўладими?
4. Келтириб чиқарувчи функция ҳар доим ҳам мавжудми?
5. Гамильтон-Якоби тенгламасининг умумий ечими доимо унинг умумий интеграл билан усма-уст тушадими?
6. Ҳар қандай Гамильтон системасида умумлашган координаталарни циклик координаталар қилиб танлаб олиш мумкинми?

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. - С. 262. - ISBN 5-9221-0067-X.
- 2.Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013
- 3.Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006
- 4.Уиттекер Е. Аналитическая динамика. М.: ОНТИ, 2001.

РЕЖА:

- 4.1.Механик системаларда турғунлик тушунчаси.
- 4.2.Ляпунов бўйича турғунлик ва асимптотик турғунлик.
- 4.3.Ляпунов функцияси ва хоссалари.
- 4.4.Ляпунов функциясини тузиш усуллари.

Таянч сўзлар: устуворлик, асимптотик турғунлик, Ляпунов функцияси, ишораси аниқланган ва ишораси ўзгармас функциялар.

4.1 Механик системаларда турғунлик тушунчаси.

Устуворлик тушунчаси механиканинг кўп йўналишларида ишлатилиб, ҳар доим бу тушунча қайси маънода кўрилатгани эслатилиб ўтилади. Масалан, назарий механикада А.М. Ляпунов бўйича устуворлик, яъни бошланғич шартлардан оғиш ҳисобига хусусий ечимни оғиши, материаллар қаршилигида жисм формасини сақлаши, пластинка ва қобиклар назариясида тебранма ҳаракат частотаси билан боғлиқ. А.М. Ляпунов бўйича турғунлик механик система хусусий ечимларига тегишли бўлиб, қуйидагича кириталади.

Фараз қиламиз, механик системанинг ҳаракат тенгламалари қуйидаги

$$\dot{y}_i = Y_i(t, y_1, \dots, y_n) \quad i = 1, \dots, n \quad (1)$$

оддий дифференциал тенгламалар системасидан иборат бўлиб, $y_i = f_i(t), i = 1, \dots, n$ $t = t_0, y_i = f_i(t_0), i = 1, \dots, n$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи, (1) ҳаракат тенгламаларининг хусусий ечимидан иборат бўлсин.

Энди бошланғич шартларга

$$t = t_0, y_i = f_i(t_0) + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n, \quad (2)$$

оғишлар берамиз. Бунда (2) бошланғич шартларга мос келувчи системанинг ҳаракати оғдирилган ҳаракат ва ε_i миқдорлар эса бошланғич оғишлар деб аталади. Оғдирилган ҳаракатга мос келувчи параметрларни $y_i(t)$ билан

белгиласак, у ҳолда оғдирилмаган ҳаракатга мос келувчи $f_i(t)$ хусусий ечимларни ҳисобга олган ҳолда, маъносига кўра $x_i = y_i(t) - f_i(t), i = 1, \dots, n$ ўзгарувчиларни оғишлар ёки вариациялар деб атаймиз. Кейинги аналитик амалларни бажариш учун, оғишларга мос келувчи n ўлчовли фазода ҳаракатланувчи $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$ нуқтанинг траекториясидан фойдаланамиз. Кўриш қийин эмаски, оғдирилмаган ҳаракатга $x_i = 0$ координата боши мос келади. Кейинги ҳисоблашларда оғдирилмаган ҳаракатга нисбатан оғишларни баҳолашда қуйидаги $\sum_{i=1}^n x_i^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$ микдордан фойдаланамиз. Киритилган белгилашларга кўра, $t = t_0, x_{0i} = \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$ бошланғич оғишлардан иборат бўлади.

4.2 Ляпунов бўйича турғунлик ва асимптотик турғунлик.

А.М.Ляпунов бўйича турғунлик таърифи. 1. Агар ҳар қандай кичик мусбат $\varepsilon > 0$ сон учун, шундай $\delta > 0$ мусбат сон топиш мумкин бўлсаки, ҳар қандай $\sum_{i=1}^n x_{0i}^2 \leq \delta$ тенгсизликни қаноатлантирувчи бошланғич оғишлар учун, вақтни ихтиёрий $t > t_0$ қийматларида $\sum_{i=1}^n x_i^2 < \varepsilon$ шарт ўринли бўлса, оғдирилмаган ҳаракат турғун(устивор) деб аталади, акс ҳолда нотурғун дейилади. Ҳаракат геометриясига мурожаат қиладиган бўлсак, $\sum_{i=1}^n x_{0i}^2 \leq \delta$ сфера ичидан ҳаракатни бошлайдиган нуқта, ҳеч қачон $\sum_{i=1}^n x_i^2 < \varepsilon$ сферадан чиқиб кета олмайди. Бошқача қилиб айтганда, оғдирилган ҳаракат оғдирилмаган ҳаракат атрофида ҳаракатланиб, ундан жуда кичик микдорга фарқ қилади.

2. Агар оғдирилмаган ҳаракат турғун бўлиб, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ шарт бажарилса, у ҳолда оғдирилмаган ҳаракат асимптотик турғун дейилади.

3. Агар оғдирилмаган ҳаракат ўзгарувчиларни маълум қисмига нисбатан

турғун ва қолганларига нисбатан нотурғун бўлса, оғдирилмаган ҳаракат маълум ўзгарувчиларга нисбатан турғун дейилади. Шунини таъкидлаш керакки, Ляпунов бўйича турғунлик ўзгарувчиларни танлаб олишга боғлиқ.

Оғдирилган ҳаракат тенгламалари.

Оғдирилган ҳаракат тенгламаларини келтириб чиқариш учун, оғишларга мос келувчи $y_i = x_i(t) - f_i(t)$, $i = 1, \dots, n$ ўзгарувчиларни система ҳаракат тенгламаларига

$$\dot{y}_i + \dot{x}_i = Y_i(t, y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) \quad i = 1, \dots, n,$$

қўямиз ва x_i ўзгарувчиларни кичик деб ҳисоблаб, Тейлор қаторига ёямиз. Бунга кўра

$$\dot{y}_i + \dot{x}_i = Y_i(t, f_1, \dots, f_n) + \left(\frac{\partial Y_i}{\partial x_1}\right)_0 x_1 + \dots + \left(\frac{\partial Y_i}{\partial x_n}\right)_0 x_n + X_i^*, \quad i = 1, \dots, n.$$

Бунда $X_i^* - x_i$ ўзгарувчиларга нисбатан юқори тартибли ҳадлар. Агар $f_i(t)$ лар $\dot{y}_i = Y_i(t, y_1, \dots, y_n)$ $i = 1, \dots, n$ тенгламалар системасининг ечимидан иборат эканлигини ҳисобга олсак, **оғдирилган ҳаракат тенгламалари** қуйидаги

$$\dot{x}_i = a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n + X_i^*, \quad i = 1, \dots, n \quad (3)$$

кўринишни эгаллайди. Тенгламалар системасидан юқори тартибли ҳадларни ташлаб юборсак

$$\dot{x}_i = a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n, \quad i = 1, \dots, n$$

биринчи яқинлашишдаги оғдирилган ҳаракат тенгламалари келиб чиқади. Агар a_{ij} коэффициентлар ўзгармаслардан иборат бўлса, тенгламалар системаси автоном, акс ҳолда ноавтоном система деб аталади.

Ляпунов томонидан хусусий ҳаракатни устуворликка текширишни иккита усули таклиф қилган. Биринчи усул оғдирилган ҳаракат тенгламаларининг ечимларини аниқлаш орқали, иккинчи усул (тўғри усул) эса махсус хоссаларга эга бўлган функцияларни тузишга асосланади. Турғунликка текширишда иккинчи усул анчагина рационал ҳисобланиб, оғдирилган ҳаракат тенгламаларининг ечимларини топиш талаб қилинмайди ва бир қатор теоремаларга асосланади. Шунини таъкидлаш керакки, жуда кўп

ҳолларда оғдирилган ҳаракат тенгламаларининг аналитик ечимларини топишнинг иложи йўқ ва шунинг учун иккинчи усулдан фойдаланиш самарали ҳисобланади.

4.3. Ляпунов функцияси ва хоссалари.

Иккинчи усулни ўрганиш учун $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \mu$ (4) соҳада маълум ҳоссаларга эга бўлган бир қийматли, узлуксиз $V(x) = V(x_1, \dots, x_n)$, $V(0) = 0$ функцияни кўриб чиқамиз. Агар $V(x) = V(x_1, \dots, x_n)$ функциянинг қиймати $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \mu$ соҳада нолдан ташқари фақатгина бир хил ишорали (мусбат ёки манфий) бўлса, функция ишораси ўзгармас функция деб аталади. Агар ишораси ўзгармас $V(x) = V(x_1, \dots, x_n)$ функция фақатгина координата бошида $x_i = 0$ да нолга тенг бўлса, бундай функция ишораси аниқланган (мусбат ёки манфий) функция деб аталади. Юқорида келтирилган хоссаларга эга бўлган ва ҳаракат турғунлигини аниқлашда ишлатиладиган функциялар, Ляпунов функциялари деб аталади. Энди бу функцияларнинг хоссаларини ўрганишга ўтамиз.

1. Ляпунов функциялари ҳамма x_i ўзгарувчиларга боғлиқ бўлиши керак.
2. $V(x) = c$ сирт $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \mu$ соҳада ёпиқ сиртдан иборат.
3. Агар $|c| > |c_1|$ бўлса, $V(x) = c_1$ сирт $V(x) = c$ сиртнинг ичида жойлашади.

Энди Ляпунов функциясидан оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра вақт бўйича олинган ҳосиланинг механик маъносига тўхталамиз. Агар система автоном системадан иборат бўлса, $\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{dV}{dx_n} \dot{x}_n$ ва оғдирилган ҳаракат тенгламаларини ҳисобга оладиган бўлсак, $\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx_1} X_1 + \dots + \frac{dV}{dx_n} X_n = \text{grad} V * \vec{v}$. Бундан, агар ҳаракат давомида нуқта мусбат аниқланган функцияга мос келувчи $V(x) = c$ сиртни ташқарисидан

ичига қараб ҳаракатланса $\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{dV}{dx_n} \dot{x}_n < 0$ ва акси, ичидан

ташқарисига қараб ҳаракатланса $\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{dV}{dx_n} \dot{x}_n = \vec{v} * \text{grad}V > 0$

бўлади. Бу ҳоллардан ташқари, яна $\dot{V} = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx_1} \dot{x}_1 + \dots + \frac{dV}{dx_n} \dot{x}_n = \vec{v} * \text{grad}V = 0$

бўлиши мумкин. Бу ҳолда нуқта сирт устида ҳаракатланади¹⁰. [3] (159-162 бетлар)

Ҳаракатни турғунлиги ҳақидаги Ляпунов теоремалари.

Теорема 1. Агар оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра, шундай ишораси аниқланган $V(x)$ функция топиш мумкин бўлсаки, бу функциядан оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра вақт бўйича олинган ҳосила $V(x)$ функцияга нисбатан тесқари ишорали ишораси ўзгармас функциядан иборат бўлса, оғдирилмаган ҳаракат турғун дейилади.

Теорема 2. Агар оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра, шундай ишораси аниқланган $V(x)$ функция топиш мумкин бўлсаки, бу функциядан оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра вақт бўйича олинган ҳосила $V(x)$ функцияга нисбатан тесқари ишорали ишораси аниқланган функциядан иборат бўлса, оғдирилмаган ҳаракат асимптотик турғун дейилади¹¹. [1] (197-200 бетлар)

Асимптотик турғунлик ҳақидаги Н.Н. Красовский теоремаси.

Юқорида келтирилган асимптотик турғунлик ҳақидаги Ляпунов теоремаси $V(x)$ функцияга етарлича оғир шарт кўяди. Бу шартни енгиллаштиришда $\dot{V}(x)$ функция ишораси ўзгармас бўлиши ҳам мумкин экан. Агар $\dot{V}(x) = 0$ га тенг бўладиган соҳани K билан белгилаймиз. Бунда K нуқталар тўплами, чизикдан ёки сиртдан иборат бўлиши мумкин.

Теорема. Агар оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра, $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \mu$ соҳада

¹⁰ Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010. С. 159-162.

¹¹ Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. – С. 262. – ISBN 5-9221-0067-X. С. 197-200.

шундай ишораси аниқланган $V(x)$ функция топиш мумкин бўлсаки, бу функциядан оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра вақт бўйича олинган ҳосила учун қуйидаги

$$\begin{aligned}\dot{V} &< 0, x \notin K, \\ \dot{V} &= 0, x \in K\end{aligned}$$

шарт бажарилса, (бунда K соҳада оғдирилган ҳаракатга тегишли тўлиқ траектория жойлашмаган) оғдирилмаган ҳаракат асимптотик турғун дейилади.

Ҳаракатни нотурғунлиги ҳақидаги Четаев теоремаси.

Теорема 1. Агар оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра, шундай $V(x)$ функция топиш мумкин бўлсаки, бу функция учун $x_i = 0$ нукта атрофида шундай соҳа мовжуд бўлиб, бу соҳада $V(x) > 0$ ва бу функциядан оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра олинган вақт бўйича ҳосила эса $\dot{V} > 0$ бўлса, оғдирилмаган ҳаракат нотурғун дейилади.

Бу теорема Ляпунов томонидан исботланган қуйидаги теоремага нисбатан умумийроқ ҳисобланади.

Теорема 2. Агар оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра, шундай $V(x)$ функция топиш мумкин бўлсаки, бу функция учун $x_i = 0$ нукта атрофидаги соҳада $V(x) > 0$ ва бу функциядан оғдирилган ҳаракат тенгламаларига кўра олинган вақт бўйича ҳосила эса ишораси аниқланган бўлиб, $\dot{V} > 0$ шарт бажарилса, оғдирилмаган ҳаракат нотурғун дейилади¹². [1] (189-206 бетлар)

4.4 Ляпунов функциясини тузиш усуллари.

1. Ўзгарувчиларни алмаштириш усули. Агар оғдирилган ҳаракат тенгламалари учун Ляпунов функциясини тузиш қийин бўлса, чизикли алмаштиришлар ёрдамида Ляпунов функцияси маълум бўлган тенгламалар системасига ўтилади. Алмаштиришлар чизикли бўлгани учун,

¹² Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. – С. 262. – ISBN 5-9221-0067-X. .С. 198-206

алмаштиришлар ёрдамида олинган оғдирилган ҳаракат тенгламаларининг устуворлиги ёки ноустуворлигидан бошланғич системанинг устуворлиги ёки ноустуворлиги келиб чиқади.

2. Номаълум коэффициентлар усули. Кўпгина ҳолларда Ляпунов функцияси квадратик форма $V = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ кўринишида қидирилади, чунки квадратик форма учун ишораси аниқланганлигини белгиловчи Сильвестр аломат мовжуд. Биринчи навбатда квадратик форманинг номаълум коэффициентлари Сильвестр аломатини қаноатлантирсин. Бунга кўра квадратик форма ишораси аниқланган бўлади. Форманинг коэффициентлари сони $\frac{n(n+1)}{2}$ бўлиб, улар Сильвестр аломатига кўра n та шартни қаноатлантириши лозим. Бундан эркин коэффициентлар сони $\frac{n(n-1)}{2}$ га тенг эканлиги келиб чиқади. Қолган эркин коэффициентларни Ляпунов теоремаларини қаноатлантирадиган қилиб танлаб олинса, оғдирилмаган ҳаракат устуворлигига тегишли еталилик шартлари келиб чиқади. Аммо бу усул ҳар доим ҳам иш бермайди, аммо айрим ҳолларда яхши натижалар олиш мумкин.

3. Кўпгина ҳолларда Ляпунов функциясини биринчи интеграллар комбинацияси ёрдамида тузилади. Фараз қиламиз, оғдирилган ҳаракат тенгламалари учун

$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = h$ биринчи интеграл бўлиб, $F(x_1, x_2, \dots, x_n) - F(0)$ айирма аргументларга нисбатан мусбат аниқланган бўлсин. Кўриш қийин эмаски, Ляпунов функцияси сифатида $V = F(x_1, x_2, \dots, x_n) - F(0)$ олинса, бу функция турғунлик ҳақидаги теоремани ҳамма шартларини қаноатлантиради. Айрим ҳолларда оғдирилган ҳаракат тенгламалари бир нечта

$$F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = h_1,$$

$$F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = h_2,$$

$$F_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = h_m,$$

биринчи интегралларга эга бўлади. Бу ҳолда Н.Г. Четаев томонидан Ляпунов функциясини қуйидаги

$$V = \lambda_1(F_1 - F_1(0)) + \dots + \lambda_m(F_m - F_m(0)) + \mu_1(F_1^2 - F_1^2(0)) + \dots + \mu_l(F_l^2 - F_l^2(0)),$$

кўринишда танлаб олиш таклиф қилинган. Бунда номаълум λ_k, μ_k коэффициентларни V функцияни ишораси аниқланганлик шартларидан танлаб олинади.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳозиргача Ляпунов функциясини тузишнинг умумий усули ва унинг мавжудлиги муаммолари очиқ қолмоқда. Охириги даврда чоп қилинган илмий мақолаларга мурожат қиладиган бўлсак, устуворлик муаммосини юқори тартибли оғдирилган ҳаракат тенгламаларида ҳал қилишда янги бир нечта Ляпунов функциясини тузиш, Ляпунов вектор функцияси ва чегаравий тенгламалар усуллари пайдо бўлди¹³. [4] (29-37 бетлар)

Назорат саволлари:

1. Ляпунов бўйича турғунлик вақтга нисбатан қандай ораликда кўрилади?
2. Ляпунов бўйича турғунликда системага таъсир қилаётган кучлар ўзгарадилми?
3. Ляпунов функциясини доимо қуриш мумкин-ми?
4. Асимптотик турғунлик ҳақидаги Ляпунов ва Красовский теоремалари орасидаги фарқ нимада?
5. Тоқ даражали кўпхад ишораси аниқланган функция бўла оладими?
6. Нима учун Ляпунов функциясини биринчи интегралларнинг комбинацияси сифатида танлаб олинади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. – С. 262. – ISBN 5-9221-0067-X.
2. Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013
3. Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010
4. Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006
5. Уиттекер Е. Аналитическая динамика. М.: ОНТИ, 2001.

¹³ Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010. С.29-37

**5-мавзу. КОНСЕРВАТИВ СИСТЕМАЛАРНИНГ УСТУВОРЛИГИ. ЦИКЛИК
КООРДИНАТАЛАР. ЦИКЛИК ИНТЕГРАЛЛАР. ЧИЗИҚЛИ СИСТЕМАЛАРНИНГ
УСТУВОРЛИГИ. ЧИЗИҚЛИ АВТОНОМ СИСТЕМАЛАР УЧУН ЛЯПУНОВ
ФУНКЦИЯЛАРИНИ ҚУРИШ.**

РЕЖА:

- 5.1. Консерватив системаларнинг мувозанат ҳолатининг устуворлиги ҳақидаги Лагранж теоремаси.*
- 5.2. Циклик координаталар ва циклик интеграллар.*
- 5.3. Чизиқли системаларнинг устуворлиги.*

Таянч сўзлар: *устуворлик, яккаланган мувозанат ҳолати, циклик координата, Раус функцияси, келтирилган потенциал.*

**5.1. Консерватив системаларнинг мувозанат ҳолатининг
устуворлиги ҳақидаги Лагранж теоремаси.**

Назарий механика фанида механик системанинг мувозанат ҳолати атрофидаги кичик ҳаракатларини ўрганишда характеристик тенгламанинг ечимларини топишни кўриб чиққан эдик. Бунда ечимларнинг кўринишига қараб мувозанат ҳолати атрофидаги ҳаракат ҳар хил бўлар эди. Яна бир туғиладиган савол, бу мувозанат ҳолатининг устуворлиги муаммоси ҳисобланади. Фараз қиламиз, система умумлашган координаталарнинг маълум қийматларида берилган кучлар таъсирида мувозанатда бўлсин. Агар системани бошланғич шартлар ёрдамида мувозанат ҳолатидан оғдирадиган бўлсак, унинг ҳаракати мувозанат ҳолати атрофида қандай бўлади? Бунда иккита ҳол бўлиши мумкин. Биринчидан, система оғдиришлар ҳисобига система ҳар доим мувозанат ҳолати атрофида кичик ҳаракат қилади ва иккинчи ҳол, система координаталари вақт ўтиши билан мувозанат ҳолатидан узоқлашади, яъни мувозанат ҳолати ноустивор бўлади. Энди мувозанат ҳолатининг устуворлиги ёки ноустуворлигига тегишли таърифларга тўхталамиз. Фараз қиламиз, системанинг мувозанат ҳолатига умумлашган координаталарнинг $q_r = 0 (r = 1, 2, \dots, n)$ қийматлари мос келсин ва $t = t_0$ онда система q_{r0}, \dot{q}_{r0} бошланғич оғишлар олсин. Системанинг мувозанат

$D(|q_r| < \varepsilon)$ соҳада мусбат функциядан иборат бўлгани учун, $\Pi(q_1, q_2, \dots, q_n) \geq P$ тенгсизлик ўринли. Энди системани мувозанатига нисбатан $D(|q_r| < \varepsilon)$ соҳага тегишли q_{r0} ва бошланғич $v_{10}, v_{20}, \dots, v_{n0}$ тезлик бериб ҳаракатга келтирамиз. Бунда система консерватив ва стационар геометрик боғланишли бўлгани учун, энергия интегралли

$$\sum \frac{m_i \bar{v}_i^2}{2} + \Pi = \sum \frac{m_i \bar{v}_{i0}^2}{2} + \Pi_0,$$

ёки $T + \Pi = T_0 + \Pi_0$. Бундан $T = (T_0 + \Pi_0) - \Pi$ ва кинетик энергия доимо нолдан катта бўлгани учун, $\Pi < (T_0 + \Pi_0)$. $D(|q_r| < \varepsilon)$ соҳада потенциал энергия мусбат бўлгани учун $(T_0 + \Pi_0)$ миқдор доимо нолдан катта ва уни етарлича кичик қилиб танлаб олиш мумкин. Бошқача қилиб айтганда, шундай $\delta < \varepsilon > 0$ топиш мумкинки,

$|q_{r0}| < \delta, |\dot{q}_{r0}| < \delta$ тенгсизликни қаноатлантирувчи бошланғич шартлар учун $(T_0 + \Pi_0) < P$ ўринли. Бунга кўра $\Pi < P$, яъни оғдирилган ҳаракатда ҳеч қайси координата ўзининг чегараси ε га тенг бўла олмайди. Шундай қилиб, теорема исботланди¹⁴. [1](193-195), [4](77-86)

Лагран-Дирихли теоремасига тескари теорема қуйидагича таърифланади: Агар системанинг мувозанат ҳолатида потенциал энергия максимумга эга бўлиб, унинг максимуми потенциал энергияни қаторга ёйиш натижасидаги нолга тенг бўлмаган энг кичик тартибли ҳади орқали аниқланган бўлса, у ҳолда системанинг мувозанат ҳолати ноустувор бўлади. Шунини таъкидлаш керакки, системанинг мувозанат ҳолати яққаланган бўлиши зарур.

5.2. Циклик координаталар ва циклик интеграллар.

Механик системаларда шундай координаталар учрайдики, бу координаталар Лагранж функциясига ошкор равишда қатнашмайди. Қуйида бундай системаларнинг ҳаракат тенгламаларини тартибини пасайтириш

¹⁴Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. – С. 262. – ISBN 5-9221-0067-X. С. 193-195
Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010. С.77-86

усули устида тўхталиб ўтамиз.

Таъриф. q_1, q_2, \dots, q_l ($l < n$) координаталар циклик координаталар деб аталади, агар бу координаталар L Лагранж функциясига ошкор равишда қатнашмаса. Таърифга кўра $L = L(q_{l+1}, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n, t)$ ёки $\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0$ ва Лагранж

тенгламаларидан $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = c_k, (k = 1, 2, \dots, l)$ циклик интеграллар деб аталадиган интегралларни оламиз. Бунда c_1, c_2, \dots, c_l интеграллаш доимийлари.

Раус циклик интеграллардан фойдаланиб, система ҳаракат тенгламаларининг тартибини пасайтириш усулини ишлаб чиққан.. Бунинг учун $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = c_k, (k = 1, 2, \dots, l)$ циклик интеграллар ёрдамида циклик тезликларни

позицион координаталар ва уларнинг тезликларга

$\dot{q}_k = \dot{q}_k(q_{l+1}, q_{l+2}, \dots, q_n, \dot{q}_{l+1}, \dot{q}_{l+2}, \dots, \dot{q}_n, c_1, c_2, \dots, c_l, t)$ нисбатан ечиб оламиз ва қолган

Лагранж тенгламаларига циклик тезликларни ўрнига қўйиб позицион

координаталарга нисбатин тенгламалар системасини ҳосил қиламиз. Мана шу

иш Раус томонидан амалга оширилган ва тенгламалар системасининг

тартиби пасайтирилган. Раус томонидан худди Лагранж функциясини ролини

бажарадиган $R = L - \sum_{k=1}^l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \dot{q}_k$ функция киритилган ва циклик тезликлар

интеграллар ёрдамида позицион координаталар ва тезликлар орқали

алмаштирилган. Бунга кўра Раус функцияси

$R = R(q_{l+1}, q_{l+2}, \dots, q_n, \dot{q}_{l+1}, \dot{q}_{l+2}, \dots, \dot{q}_n, c_1, c_2, \dots, c_l, t)$ позицион координаталар, тезликлар

ва интеграллаш доимийларининг функциясидан иборат бўлади. Раус

функциясини иккала томонини вариациялаб

$$\begin{aligned} \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial R}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \sum_{i=1}^l \frac{\partial R}{\partial c_k} \delta c_k &= \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \sum_{i=l+1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \\ + \sum_{i=1}^l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i - \sum_{i=1}^l \delta \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \dot{q}_i - \sum_{i=1}^l \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \end{aligned}$$

ва бу тенгламанинг иккала томонидаги бир хил вариациялар олдидаги

коэффициентларнинг тенглигидан, $\frac{\partial R}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} (i = l+1, \dots, n),$

$\dot{q}_k = -\frac{\partial R}{\partial c_k}, (k = 1, 2, \dots, l)$ муносабатлар келиб чиқади. Бунга кўра, Раус

функциясида олинган хусусий ҳосилалар Лагранж функциясида олинган хусусий ҳосилаларга тенг бўлар экан. Олинган натижани ўрнига қўйиб,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial R}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial R}{\partial q_i} = 0 \quad i = l+1, l+2, \dots, n,$$

$$\dot{q}_k = -\frac{\partial R}{\partial c_k}, (k = 1, 2, \dots, l)$$

позицион координаталарга нисбатан ҳаракат тенгламаларини ҳосил қиламиз. Шундай қилиб, циклик интеграллар ёрдамида тенгламалар системасининг тартибини циклик координаталар сонига камайтирса бўлар экан. Агар системага қўйилган боғланишлар стационар ва актив кучлар потенциалга эга бўлса, системада худди энергия интегралли каби $R_2 + \Pi - R_0 = h$

биринчи интеграл мавжуд. Бунда R_2 худди кинетик энергия каби циклик бўлмаган (позицион) координаталарга нисбатан мусбат аниқланган квадратик форма. $W = \Pi - R_0$ ҳад келтирилган потенциал деб аталади.

Стационар ҳаракат таърифига кўра, бунда позицион координаталар $q_i = q_i^0$ ўзгармас ва циклик координаталарнинг тезликлари эса юқорида келтирилган $\dot{q}_k = \dot{q}_k(q_{l+1}^0, q_{l+2}^0, \dots, q_n^0, 0, 0, \dots, 0, c_1, c_2, \dots, c_l)$ тенгламаларни қаноатлантиради. Механик маъносига кўра, стационар ҳаракат кўпгина ҳолларда системанинг нисбий мувозанат ҳолатига мос келади ва унинг турғунлиги масаласи Раус теоремаси орқали аниқланади.

Раус теоремаси. Агар системанинг стационар ҳаракатида $W = \Pi - R_0$ келтирилган потенциал минимумга эга бўлса, оғдирилмаган стационар ҳаракат позицион координаталарга ва циклик интегралларни қаноатлантирувчи циклик тезликларга нисбатан устувор бўлади. Теореманинг исботи Ляпуновни устуворлик ҳақидаги теоремасидан тўғридан-тўғри келиб чиқади, яъни Ляпунов функцияси сифатида $V = R_2 + W$ олинади.

5.4. Чизикли системаларнинг устуворлиги.

Қуйида хусусий ҳоллардан бири бўлган, оғдирилган ҳаракат тенгламалари чизикли тенгламалар системасидан иборат бўлган ҳолни кўриб чиқамиз. Бунда ҳисоблашларни соддалаштириш учун алгебрада кўриладиган матрицалар назариясидан фойдаланамиз. Фараз қиламиз, оғдирилган ҳаракат тенгламалари чизикли автоном $\dot{x}_i = a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n$, $i = 1, \dots, n$,

ёки вектор кўринишда

$$\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$$

системадан иборат бўлсин. Бунда $A = \|a_{ij}\|$ квадрат матрица. Чизикли $\bar{z} = \Lambda\bar{x}$ хос бўлмаган алмаштириш ёрдамида янги z_1, \dots, z_n ўзгарувчиларга ўтамиз. $\Lambda = \|\alpha_{ij}\|$ матрица хосмас матрицадан иборат бўлгани учун, унинг тескари матрицаси мовжуд бўлиб тескари $\bar{x} = \Lambda^{-1}\bar{z}$ чизикли алмаштириш ўринли. Алмаштиришларни ўрнига қўйиб

$$\dot{\bar{z}} = B\bar{z},$$

вектор тенгламага эга бўламиз. Бунда $B = \Lambda A \Lambda^{-1}$. Шундай қилиб, чизикли алмаштириш натижасида \bar{x} ўзгарувчига нисбатан $\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$ вектор тенгламадан, \bar{z} ўзгарувчига нисбатан $\dot{\bar{z}} = B\bar{z}$ вектор тенгламага келамиз. Алмаштиришлар чизикли бўлгани учун хусусий ечимни \bar{z} ўзгарувчиларга нисбатан устуворлик ёки ноустуворлигидан, \bar{x} ўзгарувчиларга нисбатан устуворлик ёки ноустуворлик келиб чиқади.

Кейинга аналитик амалларни бажариш учун, чизикли алгебрага тегишли теоремаларга тўхталамиз.

Теорема 1. Агар Λ матрица хосмас матрицадан иборат бўлса, у ҳолда $A - \lambda E$ ва $\Lambda A \Lambda^{-1} - \lambda E$ матрицаларнинг элементар бўлувчилари бир хил бўлади ва тескариси, агар $A - \lambda E$ ва $B - \lambda E$ матрицаларнинг элементар бўлувчилари бир хил бўлса, шундай Λ матрица топиладики $B = \Lambda A \Lambda^{-1}$ муносабат ўринли.

Теорема 2. Агар T ва P матрицалар квадрат симметрик матрицалар

бўлиб, бунда T мусбат аниқланган бўлса, у ҳолда

1. $\det(T\lambda + I) = 0$ характеристик тенгламанинг ечимлари ҳақиқий бўлади.

2. Доимо шундай хосмас Λ матрица топиш мумкинки, $\Lambda'T\Lambda = E$, $\Lambda'P\Lambda = C_0$. Бунда E -бирлик матрица, Λ' -транспанирланган матрица ва C_0 -диагонал матрица бўлиб, унинг элементлари характеристик тенгламанинг ечимларидан иборат.

Юқорида келтирилган теоремаларга кўра, $\dot{\bar{z}} = B\bar{z}$ тенгламадаги B матрицанинг коэффициентларини, бошланғич A матрицанинг

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 0 & B_m \end{pmatrix} \quad (*)$$

Жордан формасини оламиз. Бунда $B_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda_k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda_k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \lambda_k \end{pmatrix}$, ва

ўзгартирилган тенгламалар системасига тегишли \bar{z} вектор каноник вектор деб, унинг элементлари эса каноник ўзгарувчилар деб аталади. Шунини таъкидлаш керакки, каноник ўзгарувчиларга ўтиш учун фақатгина $A - \lambda E$ матрицанинг элементар бўлувчиларини билиш етарли бўлади. Олинган натижага кўра, каноник ўзгарувчилардаги тенгламалар m та алоҳида тенгламалар тўпамидан иборат бўлади ва улардан бири куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= \lambda_1 z_1, \\ \dot{z}_2 &= z_1 + \lambda_1 z_2, \\ &\dots\dots\dots \\ \dot{z}_{e_1} &= z_{e_1-1} + \lambda_1 z_{e_1}. \end{aligned}$$

Бу тенгламалар системаси оддий интегралланади.

$$\begin{aligned}
z_1 &= z_{01}e^{\lambda_1 t}, \\
z_2 &= (z_{02} + z_{01}t)e^{\lambda_1 t}, \\
&\dots \quad \dots\dots\dots \\
z_{e_1} &= (z_{0e_1} + z_{0e_2}t + \dots + z_{01} \frac{t^{e_1-1}}{(e_1-1)!})e^{\lambda_1 t}
\end{aligned}$$

Энди оғдирилган ҳаракат устуворлиги масаласига қайтамыз. Олинган ечимларга кўра куйидаги **теоремалар** ўринли:

1. Агар харакатеристик тенглама ечимларининг хақиқий қисмлари манфий бўлса, оғдирилмаган ҳаракат асимптотик устувор бўлади.

2. Агар харакатеристик тенглама ечимларининг ичида биттагина бўлса ҳам хақиқий қисми мусбат бўлган ечими мавжуд бўлса, оғдирилмаган ҳаракат ноустувор бўлади.

3. Агар харакатеристик тенглама ечимларининг ичида хақиқий қисмлари нолга тенг бўлган ечимлари бўлиб, қолганлари эса манфий хақиқий қисмларга эга бўлса, у ҳолда:

а) Оғдирилмаган ҳаракат устувор бўлади, агар хақиқий қисмлари нолга тенг бўлган ечимларга оддий элементар бўлувчилар мос келса:

б) Оғдирилмаган ҳаракат ноустувор бўлади, агар хақиқий қисмлари нолга тенг бўлган ечимлар, оддий элементар бўлувчилар учун каррали бўлса¹⁵: [4](124-142).

Назорат саволлари:

1. Яккаланмаган мувозанат ҳолатини устуворлигини текширишда Лагранж теоремасини қўллаш мумкинми?
2. Нормал формага келтирилмаган юқори тартибли чизикли оғдирилган ҳаракат тенгламасининг хусусий ечимини устуворликка текшириш учун бу системани нормал кўринишга келтириш шартми?
3. Автоном системалар учун келтирилган теоремалар чизикли даврий коэффицентли системалар учун ўринлими?
4. Гироскопик куч деб нимага айтилади?

¹⁵ Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010. С.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. – С. 262. – ISBN 5-9221-0067-X.
2. Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013
3. Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006
4. Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010
5. Уиттекер Е. Аналитическая динамика. М.: ОНТИ, 2001.

IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-амалий машғулот:

Раус ва Аппель тенгламалари.

Амалий машғулотдан асосий мақсад, тингловчиларни ишқаланишга эга бўлган аниқ системаларнинг ҳаракат тенгламаларини тузишда келиб чиқадиган асосий муаммоларни бу системаларга тегишли аниқ масалаларда кўрсатиб бериш. Кўриладиган масаланинг ҳаракат тенгламалари Раус ва Аппель тенгламалари кўринишида тузилади ва тенгламаларда қатнашадиган номаълум ишқаланиш кучлари умумий теоремалар ёрдамида топилади, яъни ишқаланишга эга бўлган системаларда ишқаланиш қонунини билиш ёки ишқаланиш кучларини система нуқталарининг мумкин бўлган кўчишларидаги элементар бажарган ишлари маълум бўлиши лозим.

2-амалий машғулот:

Каноник алмаштиришлар. Гамильтон -Якоби дифференциал тенгламаси.

Интеграл инвариантларга ва вақтга ошкор равишда боғлиқ бўлган каноник алмаштиришларга масалалар ечилади. Асосий мақсад тингловчиларни вақтга боғлиқ бўлган алмаштириш ёрдамида Гамильтон функцияси соддароқ бўлган система билан алмаштириш натижасида системанинг ҳаракатини ўрганишдан иборат. Бунда алмаштиришларни канониклик аломатига кўра келтириб чиқарувчи функцияни, алмаштиришларни валентлигини ва янги Гамильтон функцияси аниқланади.

3-амалий машғулот:

Асосий тушунчалар ва теоремалар. Автоном системалар учун Ляпунов функциялари.

Амалий машғулотда кўзғалмас нуқта атрофидаги ҳаракатланаётган қаттиқ жисмни бош ўқлар атрофидаги прецессион ҳаракатини устуворлигини Ляпунов функцияси ва теоремаси ёрдамида ўрганилади. Бунда тингловчилар хусусий ечимни устуворликка текширишда Ляпунов теоремасига асосланган махсус функцияни биринчи интеграллар ёрдамида тузиш методикасини ўрганадилар. Ляпунов функциясига қўйиладиган шартлар ш Сельвестр аломатига кўра текширилади.

4-амалий машғулот:

Ляпунов функцияси ва уларни қуриш усуллари.

Амалда аниқ масалаларнинг хусусий ечимларини устуворликка текширишда Ляпунов функциясини ҳозирда маълум бўлган учта усулига таянилади (квадратик форма кўринишида, биринчи интегралларнинг

комбинацияси кўринишида ва алмаштиришлар ёрдамида масалани Ляпунов функцияси маълум бўлган системага келтириш). Сферик маятник масаласида бу функцияни куриш методикаси кўрилади. Бу эса маърузада ўрганилган назарияни амалдаги қўлланилиши бўлиб, тингловчиларда мавзунини чуқурроқ ўрганишига ёрдам беради.

5 – амалий машғулот:

Консерватив системаларнинг устуворлиги. Циклик интеграллар.

Чизикли системаларнинг устуворлиги.

Абсолют ва нисбий яккаланган мувозанат ҳолатининг устуворлигига тегишли аниқ масалалар тингловчиларни Лагранж теоремасини аниқ системаларга қўллаш кўникмасини ҳосил қилади ва кейинги босқичда .стационар ҳаракатнинг устуворлиги ҳақидаги Раус теоремасини қўлашда ёрдам беради.

V. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни.

Тингловчи мустақил ишни муайян модулни хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- ўқув, илмий адабиётлардан ва меъёрий хужжатлардан фойдаланиш асосида модул мавзуларини ўрганиш;

- тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

- махсус адабиётлар бўйича модул бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

- тингловчининг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган модул бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш.

Мустақил таълим мавзулари.

1. Аппель тенгламалари квазиординаталардаги кўриниши
2. Гамильтон-Якоби тенламаси. Ўзгарувчилар ажраладиган ҳоллар
Лиувилл, Моисеев ва Штеккел ҳоллари
3. Ноавтоном системалар учун Ляпунов функцияси.
4. Ноавтоном системалар учун Ляпунов теоремалари
5. Ноконсерватив системаларнинг мувозанат ҳолатини устуворлиги
6. Гироскопик боғланмаган системалар
7. Гамильтон системаларининг устуворлиги

VI.КЕЙСЛАР БАНКИ

Кичик кейс 1. “Турғунлик назариясига тегишли муаммоли масала”.

Муаммонинг қўйилиши: Механик системанинг мувозанат ҳолатидан оғдирилган ҳаракат тенгламаси $\ddot{x} + p(t)x = 0$ кўринишга эга. Бунда $t \rightarrow \infty, p(t) \rightarrow 0$ ва функция силлиқ функциядан иборат. Оғдирилмаган ҳаракатни турғунликка текширинг?

Тингловчилардан олинган жавоблар қуйидагича:

1. Мувозанат ҳолатини устиворлигини $p(t)$ функциянинг вақт оралиғидаги ўрта қийматини олган ҳолда ўзгармас коэффициентли $\ddot{x} + (2 + \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} p(t)dt)x = 0$ дифференциал тенгламанинг ечимлари ёрдамида

устуворликка текшириш мумкин.

2. Мувозанат ҳолатини устиворлигини $p(t)$ функциянинг ихтиёрий фиксирланган қийматини олиб, оғлирилмаган ҳаракат турғунлиги тўғрисида фикр юритиш мумкин.

Нима учун бундай жавоблар келиб чиқди ва унинг сабаби. Вазиятдан чиқиш йўлини кўрсатинг.

Кичик-кейс 2. “Гамильтон принцига тегишли мулоҳаза”.

Муаммонинг қўйилиши: Ихтиёрий механик системанинг ҳақиқий ҳаракати фиксирланмаган вақт оралиғида кинематик мумкин бўлган ҳаракатлардан шу билан фарқ қиладики, фақатгина ҳақиқий ҳаракат учун Гамильтон таъсири стационар қийматга эга. Таърифнинг муаммоли жойлари нимада?

Тингловчилардан олинган жавоблар қуйидагича:

1. Гамильтон принци фақатгина Лагранж системалари учунгина ўринли.

2. Ихтиёрий механик системалар учун Гамильтон принци ўринли эмас

Нима учун бундай жавоблар келиб чиқди ва унинг сабаби.

Вазиятдан чиқиш йўлини кўрсатинг.

Кичик -кейс 3. “ Кинематик боғланишли системаларга тегишли муаммо”.

Механик системаларга тегишли сирпанмасдан ҳаракат ишқаланиш кучлари ҳисобига бажарилади. Бунда боғланиш реакция кучларининг бажарган иши ҳар доим нолдан нолга тенг бўлади. Тасдиқнинг хатоси борми деган савол туғилди.

Тингловчилар томонидан келтирилган жавоблар қуйидагилардан иборат бўлди:

1. Сирпанишдаги ишқаланиш мавжуд бўлган ҳолларда бажарилган иш нолдан фарқли бўлади.

2. Бажарилган иш нолга тенг бўлиши учун ишқаланиш кучи нолга тенг бўлиши лозим.

**Нима учун бундай жавоблар пайдо бўлди. Бунинг асосий сабаби
нимада.**

VII. ГЛОССАРИЙ

Иборалар	Ўзбек тилидаги маъноси	Инглиз тилидаги маъноси
<i>Моддий нуқта</i>	ўлчамлари ва шаклининг аҳамияти бўлмаган, массаси бир нуқтада жойлашган деб тасаввур қилинадиган жисм	The importance of the shape and size of objects to be considered as a point mass
<i>Абсолют қаттиқ жисм</i>	ихтиёрий иккита нуқтаси орасидаги масофа доимо ўзгармасдан қоладиган система	The system will be the distance between any two points always
<i>Боғланиш</i>	жисмнинг ҳаракати ёки ҳолатини чекловчи сабаб;	restrict body movement or the status of the
<i>Боғланиш реакция кучи</i>	боғланишнинг жисмга кўрсатадиган таъсирини белгиловчи куч	object determining the influence of the power of connection
<i>Ишқаланиш кучи</i>	боғланишдаги жисмларнинг бири иккинчисига нисбатан силжиганда уларнинг бир-бирига тегиб турган сиртларида ҳосил бўладиган қаршилик кучи	links them to move objects from one contact with a surface resistance
<i>Мумкин бўлган кўчиш</i>	фиксирланган вақтда боғланишларни сақлаб қолган ҳолда нуқтага бериш мумкин бўлган элементар кўчишлар тўплами	Fixed point of time, while keeping the connection to a set of elementary migration
<i>Циклик координата</i>	Лагранж функциясида ошкор равишда қатнашмайдиган координата.	Disclosure of the function Lagranj participation are coordinate
<i>Тезланиш энергияси</i>	система нуқталари тезланиш-лари	the system points the squared acceleration are in their half of the lump sum.

	квадратини уларнинг массасига кўпайтмасининг ярми.	
<i>Интеграл инвариант</i>	Гамильтон системасига кўра вақт бўйича олинган ҳосила нолга тенг бўлган интеграл.	Hamilton system from the time of the derivative is zero integrated
<i>Универсал инвариант интеграл</i>	Гамильтон функцияси қатнашмайдиган ҳақиқий йўллардан иборат бўлган ёпиқ контур бўйича олинган интеграл.	Hamilton function is taken off the road, which is not taking part in a contour integral
<i>Консерватив система</i>	энергия интегралли ўринли бўлган система.	capacity of integrated energy system
<i>Каноник алмаштиришлар</i>	ихтиёрий Гамильтон системасини бошқа Гамильтон функцияси билан шу системага ўтказадиган алмаштиришлар.	voluntary system and other functions carried out by the same system with the replacement of Hamilton Hamilton
<i>Валентлик</i>	универсал интеграл инвариантларни бир- биридан фарқини ифодаловчи коэффициент.	universal integrated invari- anted by a coefficient representing the difference between each.
<i>Келтириб чиқарувчи функция</i>	канониклик аломатини қаноатлантирувчи функция.	satisfactory to sign kanoniklik function
<i>Эркин каноник алмаштиришлар</i>	валентлиги бирга тенг бўлган ва маълум шартларни қаноат- лантирувчи алмаштиришлар.	Valentine is satisfied with the specific requirements and which introduce replacement.
<i>Ляпунов функцияси</i>	маълум шартларни қаноатлантирувчи функция.	the chord function
<i>Оздирилган ҳаракат</i>	бошланғич шартларни ўзгариши ҳисобига келиб чиқадиган ҳаракат.	arising due to changes in the initial conditions
<i>Биринчи интеграл</i>	ҳаракат тенгламаларига	According to the equation of

	кўра вақт бўйича ҳосиласи нолга тенг бўладиган функция.	time trying to be a derivative of the zero function.
<i>Квадратик форма</i>	маълум шартларни қаноатлантирувчи иккинчи тартибли алгебраик кўпхад.	certain conditions satisfactory to the second
<i>Лагранж функцияси</i>	механик система кинетик ва потенциал энергияларининг фарқи	mechanical system of kinetic and potential energy difference
<i>Циклик координата-лар</i>	Лагранж функциясига ошқор қатнашмайдиган координаталар	Lagranj not taking part in revealing the function of the coordinates
<i>Циклик интеграл</i>	циклик координатага мос биринчи интеграл	cyclic coordinate the first integral
<i>Хосмас матрица</i>	аниқловчиси нолдан фарқли бўлган квадратик матрица.	descriptor zero squared matrix

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Адабиётлар:

1. Гантмахер Ф. Р. Лекции по аналитической механике. 3-е изд. М.: Физматлит, 2002. — С. 262. — ISBN 5-9221-0067-X.
2. Herbert Goldstein. Classical Mechanics. Pearson New International Edition. USA, 2013
3. Antonio Fasano, Stefano Marmi. Analytical Mechanics. Oxford University Press. 2006
4. Уиттекер Е. Аналитическая динамика. М.: ОНТИ, 2001.
5. Merkin, David R. Introduction to the Theory of Stability. Springer. 2010
6. Wassim M. Haddad & Sergey G. Nersesov Stability and Control of Large-Scale Dynamical Systems USA, 2014, English

Интернет ресурслар:

1. <http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/theoretical.htm>
2. <http://www.ruscommech.ru>
3. <http://www.knigapoisk.ru/book>
4. www.natlib.uz
5. www.twirpx.com