

ЎЗБЕКИСТОНРЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙВАЎРТАМАХСУСТАЪЛИМВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҶАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ

“ДАВОЛАШ ИШИ”

**“ДАВОЛАШДАЮҚОРИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ
ҚҰЛЛАШ”**
модули бўйича

ЎҚУВ-УСЛУБИЙ

МАЖМУА

Тошкент 2018

*Мазкур ўқув-услубий мажмұа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг _____ иил
_____ сонли бүйруги билан тасдиқланған ўқув режса ва дастур асосида
тайёрланди.*

Тузувчи: В.В.Вахидов номидаги Республика
ихтисослашган жаррохлик марказида
бўлим бошлиғи, т.ф.д., профессор Садиков Р.А.

Тақризчи: ТТА хирургия касаликлари кафедраси профессори
А.Е.Аталиев

*Ўқув-услубий мажмұа Тошкент тиббиёт академияси Кенгашининг _____ иил
_____ -сонли қарори билан нашрға тавсия қилинган.*

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР.....	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	12
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР.....	17
IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР.....	80
V. КЕЙСЛАР БАНКИ	144
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ	162
VII ГЛОССАРИЙ	163
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	164

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Даволашда юқори технологияларни қўллаш фанининг тараққиёт йўналишлари: онкологик хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, микрохирургия, ангиохирургия, пластик хирургия ва бошқалар. Хирургия фанларининг долзарб масалалари. Хирургик фанларда касалликларнинг социал-демографик муаммолари ва ечимлари, клиникаси, ташхис қўйилиш, замонавий даволаш ва профилактика йўллари. Хирургия фанларининг инновациялари: операция жараёнларини роботлаштириш, трансплантация, малоинвозив методларни даволашда қўллаш ва бошқалар. Хирургия фанларида инновацияларни қўллаш истиқболлари, хирургик касалликлари фани ва бошқа ёндош фанларнинг ютуқлари, шифокорларни замонавий талабларга жавоб бера оладиган амалий хирургик касалликлари фанининг вазифалари ва хирургик касалликлари фанининг дунё миқёсида хар томонлама ривожланган моҳиятини тингловчилар онгига максимал даражада етказиш қўзда тутилган.

Дастур мазмуни олийтаълимнинг норматив-хуқуқий асослари ва қонунчилик нормалари, илғор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, амалий хорижий тил, тизимли таҳлил ва қарор қабул қилиш асослари, маҳсус фанлар негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, педагогнинг касбий компетентлиги, глобал Интернет тармоғини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўнкима ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Дастур доирасида берилаётган мавзулар таълим соҳаси бўйича педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мазмуни, сифати ва уларнинг тайёргарлигига қўйиладиган умумий малака талаблари ва ўқув режалари асосида шакллантирилган бўлиб, бу орқали олий таълим муассасалари педагог кадрларининг соҳага оид замонавий таълим ва инновация технологиялари, илғор хорижий тажрибалардан самарали фойдаланиш, ахборот-коммуникация технологияларини ўқув жараёнига кенг тадбиқ этиш, четтилларини интенсив ўзлаштириш даражасини ошириш ҳисобига уларнинг касб маҳоратини, илмий фаолиятини мунтазам юксалтириш, олий таълим муассасаларида ўқув-тарбия жараёнларини ташкил этиш ва бошқаришни тизимли таҳлилқилиш, шунингдек, педагогик вазиятларда оптималь қарорлар қабул қилиш билан боғлиқ компетенцияларга эга бўлишлари таъминланади.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Даволашда юқори технологияларни қўллаш фани бўйича илғор хорижий тажрибалар” модулнинг мақсади- тингловчиларни замонавий таълим ва инновацион технологиялар бўйича юқори технологияларҳақида билимлар, малакалар ва кўникма системасини шакллантириш ва замонавий ўқитиш технологиясини ўқув жараёнида қўллашни ўргатиш.

Модулнинг вазифалари:

- даволаш иши йўналиши фанларининг тараққиёт йўналишларида касалликларни эрта ташхислашда замонавий технологиялардан фойдаланиш ва амалиётда қўллаш туғрисида маълумотларни ўзлаштириш;
- замонавий инвазив ва ноинвазив текшириш усулларини қўллаш учун кўрсатмалар билан танишиш ва уларни ўз амалиётида ишлатиш. Нур билан ташхислаш деб номланган замонавий технологияларнинг тиббий имкониятларини ўрганиш;
- ҳозирги вақтда дунё тиббиётида амалиётга киритилаётган ташхислаш янгиликлари, уларнинг афзаллик томонлари, ташхислаш иши йўналишида янгича ёндошишлар, ташхислаш иши йўналиши тармоғида замонавий инновацион ўзгаришлар билан танишиш ва амалиётда қўллашни ўргатиш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Даволашда юқори технологияларни қўллаш фани бўйича илғор хорижий тажрибалар” модулини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- модуль, ўқитиш модулли, кредит, рейтинг тушунчаси;
- технологиялаштириш қоидалари, тамойиллар;
- назорат жараёнини ташкил этиш;
- интерфаол технологиялар ва улардан самарали фойдаланиш ҳақидабилимларга эга бўлиши;
- педагогик фаолият жараёнини модуллаштириш;
- назорат жараёнини тез ва самарали ўtkаза олиш;
- назоратнинг турли шаклларидан самарали фойдаланиш;
- интерфаол методларни мақсадли равишда тўғри танлаш ва фойдаланиш; **кўникмаларини эгаллаши;**

- ўқув курсини модулини тўзиш;
- ахборотни структуралаштириш;
- талабаларнинг мустақил амалий фаолиятни ташкил этиш;
- кириш ва чиқиш назоратини ташкил этиш эришилган натижаларини таҳлил этиш;
- интерфаол методлардан фойдаланиш; **малакаларини эгаллаши;**
- ўз соҳасига оид ахборотни мантиқий блокларга ажратиш ва аниқ, лўнда, тушунарли равишда баён этиш;
- модулли ёндашув асосида ўқув жараёнини ташкил этиш;
- технологик ёндашув асосида таълим ва тарбия жараёнини бошқариш;
- коммуникативликни ва мустақил фаолиятни ташкил этиш юзасидан компетенцияларни эгаллаши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Даволашда юқори технологияларни қўллаш фанини ўқитишидаги маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан;

- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

Фан мазмуни ўқув режадаги олтинчи блок ва мутахассислик фанларининг барча соҳалари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг умумий тайёргарлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

“Даволашда юқори технологияларни қўллаш” модули буйича тиббиёт олий ўқув юртлари профессор-ўқитувчилари хирургия фанлари (хирургия, травматология ва нейрохирургия, акушерлик ва гинекология, онкология, урология, анестезиология ва реанимация, оториноларингология ва кўз касалликлари, ОЖТА) бўйича кайта тайёрлаш ва малака ошириш курс тингловчиларнинг замонавий муаммолари хақида билимларини такомиллаштириш, хирургия таълим йўналишига назарий ва касбий тайёргарликни таъминлаш ва янгилаш, касбий компетентликни ривожлантириш асосида таълим-тарбия жараёнларини самарали ташкил этиш ва бошқариш бўйича билим, кўникма ва малакаларни такомиллаштиришга қаратилган ва педагогларнинг касбий тайёргарлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Модул бўйича соатлар тақсимоти:

№	Модул мавзулари	Хаммаси	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Мустакилил таълим	
			Аудитория ўқув юкламаси			Жумладан жумладан			
			Жами	Маъруза	амалий машғулот				
1.	Хирургияда имплантатларни қўллаш имкониятлари	8	6	2	2	2	2	2	
2.	Хирургик касалликларида фотодинамик даволаш усуллари	4	2	2	2				
3.	Эндоваскуляр даволаш усуллари	6	6	2	2	2	2		
4.	Юқориқувватли лазерларни хирургияда қўллаш ва афзалиги	8	6	2	2	2	2	2	
5.	Туғма юрак нуқсонларини даволаш усуллари	2	2	2	2				
	Жами:	30	26	10	10	6	4		

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1 – мавзу:Хиургияда имплантатларни қўллаш имкониятлари.

Замонавий хиургия имплантатлар қўллаш ва уларнинг имкониятларини. Имплантатлар турлари. Имплантатларнинг одам организми билан бирикиши ва бу жараённинг текширилиши. Имплантлар хиургиядаги ўрни ва вазифалари.

2 – мавзу:Хиургик касалликларида фотодинамик даволаш усуллари.

Кам инвазив усулларни қўллаш ва даволашни самарадорлиги. Махсус рентген ускуналар ёрдамида юқори технологиялик узатгич – катетерлар орқали қон томир ва юрак касалликларини даволашга имкониятлари.

3 – мавзу:Эндоваскуляр даволаш усуллари.

Эндоваскуляр даволаш усуллари. Кўрсатмалар. Самарадорлиги. Эндоваскуляр муолажасини ўтказиш услуби. Ангиографик ускуналар. Махсус катетерлар. Имплантатлар.

4 – мавзу:Юқориқувватли лазерларни хиургияда қўллаш ва афзаллиги.

Хиургияда замонавий нур диагностик усуллари бўйичабилим ва қўнималарни чукурлаштириш. Юқори қувватли лазер аппаратлари. Асоратлар. Даволаш методикалари. Кўллаш услублари.

5- мавзу:Туғма юрак нуқонларини даволаш усуллари.

Туғма юрак нуқсонларини ташхис қўйиш ва даволашда хиургиядаги ўрни хақида тингловчиларнинг билим, қўникма ва малакаларини шакллантириш ва чукурлаштириш.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1 - амалий машғулот:Хирургияда имплантатларни қўллашимкониятлари.

Замонавий хирургия имплантатлар қўллаш ва уларнинг имкониятларини юксалтириш билан ифодаланади. Имплантатлар тушунчасига функционал мақсадни бажарувчи материални одам организмига жойлаш билан ифодаланади. Имплантатлар турлари жуда кенг ва улар ёрдамииз хирургик операцияни бажариш деярли мумкин эмас. Бизнинг мамлакатимизда имплантатларни қўллаш ва яратиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Имплантатларнинг одам организми билан бирикиши ва бу жараённинг текширилиши ўзига хос муаммоларни яратади.

2 - амалий машғулот:Эндловаскуляр диагностика ва даволаш усуллари.

Хирургияда замонавий нур диагностик усуллари бўйичабилим ва кўникмаларни чуқурлаштириш. Рентгенэндоваскуляр хирургик муолажалар.

3 - амалий машғулот:Юқориқувватли лазерларни хирургияда қўллаш ва афзалиги.

Хирургияда лазер ёрдамида амалга ошириладиган операция усуллари бўйичабилим ва кўникмаларни чуқурлаштириш.

4 -амалий машғулот:Хирургик касалликларида фотодинамик даволаш усуллари.

Кам инвазив усулларни қўллаш ва даволашни самарадорлигини ошириш замонавий хирургияни ифодалувчи омиллардан бирдир. Махсус рентген ускуналар ёрдамида юқори технологиялик узатгич – катетерлар оркали қон томир ва юрак касалликларини даволашга имконият яратилди. Бу технологиялар ёрдамида бир катор оғир хасталикларни даволашга имконият яратилди. Шулар каторига юрак ишемик касаллиги, юрак нуқсонлари, ваизоренал гипертония, портал гипертензия ва бошқалар киради. Бу усул чукур наркозсиз, деярли амбулатор шароитида бажарилиши мумкин, ва ишга яроқлик шифохонадан чиққандан сўнг тикланиши мумкин.

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш турлари	Максимал балл	Баллар
1	Кейс топшириқлари	2.5	1,2
	Мустакил иш топшириклари		0,5
	Амалий топшириқлар		0,8

II. МОДУЛНИ ҮҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.

“SWOT-таҳлил” методи.

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақоролаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласди.



Намуна: Даволашда юқори технологияларни қўллашўқитишида илғор хорижий тажрибалар учун SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Даволашда юқори технологияларни қўллашўқитишда илғор хорижий тажрибаларни кучли томонлари	фойдаланувчилар сонининг кўплиги...
W	Даволашда юқори технологияларни қўллашўқитишида илғор хорижий тажрибаларни кучсиз томонлари	Робототехника орқали ишлаши...
O	Даволашда юқори технологияларни қўллашўқитишида илғор хорижий тажрибалари тизимидан фойдаланишнинг имкониятлари (ички)	Хирургия ва бошка даволаш усуллари билан фойдаланиш

Т	Тўсиқлар (ташқи)	Маълумотлар хавфсизлигининг тўлақонли таъминланмаганлиги...
---	------------------	---

Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурӯҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурӯҳга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган кисмлари туширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гурӯҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён килади;



навбатдаги босқичда барча гурӯҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавз

Намуна:

Даволашда юқори технологияларни қўллашўқитишда илғор хорижий тажрибалари тизимлар					
Жаррохлик		Терапия		Робототехника	
афзалиги	камчилиги	афзалиги	камчилиги	афзалиги	камчилиги
Камнвазив	Нархи юқори	Самарадор лиги	Керакли ускуналар етишмовчил иги	Одмалрга хос хато бўлмаслиг и	Нархи юқори
Хулоса: хорижий технологиялар кам инвазив ва самарадорлиги билан фаркланади.					

Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қўйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гурұхда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гурұхда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гурұхда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Намуна :Кейс.Хорижий тажрибалар буйича услубларни кўрсатинг. Ишда ишлатилиши ва афзаллиги. Янги техногояялар даволаш ишида вазифалари.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик гурұхда).
- Даволаш ишига тушириш учун бажариладагина ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш).

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзууни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯхий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна.

Фикр:“Хорижий тажриба объектга йўналтирилган дастурлашнинг асосий тамойилларидан биридир”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1- мавзу:Хирургияда имплантатларни қўллашимкониятлари.

Режа:

- 1 Замонавий хирургия имплантатлар қўллаш ва уларнинг имкониятларини.
- 2 Имплантатлар турлари.
- 3 Имплантатларнинг одам организми биланг бирикиши ва бу жараённинг текширилиши.

Таянч иборалар:Юрак, юрак нуқсони, ортирилган юрак нуқсони, туғма юрак нуқсони, қоринчалар аро тешик, бўлмачалар аро тешик, Баталл нуқсони, Фало тетрадаси, диагностика, замонвий даволаш усуллари.

1.1 Замонавий хирургия имплантатлар қўллаш ва уларнинг имкониятларини.

Замонавий биоматериаллар ва имплантатларни ишлаб чиқаришни ривожлантириш тиббиётнинг асосий мақсадларидан бири хисобланади. Бугунги кунда умумий ва юрак-қон томир хирургияси, қон -томирлар протези, сунъий юрак клапанлари, сунъий қон айлантириш тизимлари, ортопедия ва стоматологияда ишлатиладиган имплантатлар, дори шаклларининг янги авлодлари, хамда сорбентлар тайёрлаш учун мос келувчи биологик материаллар яратишга талаб юқори.¹

Бу тадқиқотлар юқори молекуляр бирикмалар кимёси, биотехнология, биофизика, молекуляр ва хужайра биологияси хамда тиббиёт билан узвий боғлиқ холда амалга оширилади. Янги материаллар, ихтишослаштирилган биотиббий буюмларни тайёрлаш, уларни қон ва тўқималар билан ўзаро таъсир механизмини ўрганиш, биоматериал ва тиббий буюмларни физик-кимёвий ва тиббий – биологик, экспериментал – клиник натижаларни, янги материаллар ва буюмларни хусусиятларини баҳолаш учун ўтказиладиган фундаментал текширувлар долзарб хисобланади.

1. Collinson S. R./ The catalytic oxidation of biomass to new materials focusing on starch, cellulose and lignin.// Coordination Chemistry Reviews. - 2015. - Vol. - 254 (15–16). - P. 110.

Тиббиётда қўлланиладиган биоматериаллар

Ҳозирги вақтга келиб янги биоматериаллар асосидаги имплантатлар ва экстракорпорал қурилмалар тузилиши соҳасида салмоқли натижаларга эришилди. Бу миллионлаб одамларни ҳаётини сақлаб қолиш имконини беради. Ривожланган мамлакатларда миллиондан ортиқ bemorлар диализ ўтказиш ҳисобига умр кечирмоқда, 6 минга яқин операциялар сунъий қон айлантириш мосламаси билан ўтказилади, 250 миллион дан ортиқ турли хил имплантатлар юрак-қон томир хирургияси учун ишлатилади. Шу билан бирга хар йили камида 400 000 яқин юрак қопқоқ (клапан) имплантациялари (ЮҚИ), 1 500 сунъий юрак қоринча (СЮҚ), 600 000 кичик диаметрли қон томирларни протезлаш, 3 миллиондан ортиқ томирларни стентлаш амалиёти амалга оширилади.

"Тиббий буюмлар" тушунчаси остида ўз вазифасини йўқотган аъзоларнинг функциясини тиклаш ёки патологиясини даволаш учун ёрдам берадиган мосламалар, ёрдамчи қурилмалар, имплантатлар, реагентлар тушунилади.^{1,2}

Имплантат (графт) инсон организмида аниқ вазифани бажариш учун хирургик йўл билан жойлаштирилган (имплантация қилинган) тиббиёт обьекти тушунилади.

Сунъий органлар - вақтинча ёки бутунлай ўз вазифасини йўқотган аъзо ўрнига ишлатиладиган тиббий мослама.

Биопротезлар - инсон ёки хайвон тўқималаридан иборат протезлар.

Гибрид ёки биологик сунъий орган - биоматериаллар ва хужайралар бирикмасидан иборат сунъий аъзо.

Объектлар – трансплантатлар, тирик тўқима, хужайра ёки аъзо бўлиб улардан бошқа организмга кўчириб ўтказиша фойдаланиш мумкин.

Аутотрансплантация - бу биологик материални бир инсон ўзида кўчириб ўтказилиши.

Алотрансплантация (ёки гомотрансплантация) – бу хужайралар, орган ёки тўқималарни бир инсон (донор) дан бошқа шахс (реципиент) га кўчириб ўтказилиши.

Ксенотрансплантация – биологик материалларни хайвонлар (бошқа биологик тур) дан одамга кўчурилиб ўтказилиши. Аутоген трансплантатлар

-
1. Collinson S. R./ The catalytic oxidation of biomass to new materials focusing on starch, cellulose and lignin.// Coordination Chemistry Reviews. - 2015. - Vol. - 254 (15–16). - P. 110.
 2. Садыков Р.А./ Возможности применения производных целлюлозы в хирургии.// Журнал Проблемы биологии и медицины. - 2015г. - № 3(84). - стр.173-175.

(аутотрансплантат) дан фойдаланиш тибиётда "олтин стандарт" хисобланади. Бирок, трансплантация учун инсон "ўзининг" материаллари миқдори чекланган. Алотрансплантат (ёки гомотрансплантат) лар миқдори, уларни қўллаш чекланганлиги, юқори қиймати ва беморларнинг бутун ҳаёти давомида иммунсуппресшив воситаларини қабул қилиш зарурати туфайли чекланган. Ксенотрансплантатлар эса (бошқа турлардан олинган биологик материал) иммун қабул қилмаслик олдини олиш учун генетик ёки кимёвий модификациясини талаб қиласди.

Шу сабабли, аъзоларни кўчириб ўтказиш, уларга муҳтож бўлган беморларнинг барчасига хам ёрдам бермайди.

Трансплантатларга қараганда имплантатлар, протез ёки сунъий органлар тана қисмларини тиклаш ёки алмаштиришда кўпроқ қўлланилади. Имплантатларни қўллашда бир қатор чекловлар бор: ўз-ўзини тиклаш ва ички мухитга мослашув қобилияти йўқлиги. Доимо рецепентнинг хаёти давомида имплантатларни ишдан чиқиши ёки уларни алмаштириш хавфи мавжуд. Шунинг учун, янги инқилобий технологияларни тибиётга тадбиқ этмасдан туриб даволаш самарадорлигини ошириш ва хаёт сифатини ошириш муаммосини хал қилиш мумкин эмас.

Янги биологик материаллар ишлаб чиқиш ва ихтишослаштирилган биотиббиётшунослик маҳсулотларини яратиш хозирги вақтда етакчи тадқиқот майдонига айланган.

Айниқса хозирги вақтга келиб биологик мос хусусиятли сўрилувчан материалларга талаб жуда юқори. Айни пайтда умумий ва юрак-қон томир хирургияси учун биологик материаллар (қон томир протези, сунъий юрак клапанлари, сунъий қон айланиш ва ёрдамчи тизимлари) га, сорбентлар, шунингдек кейинги авлод дориларни ишлаб чиқаришга талаб янада ошди.¹

Юрак-қон томир хирургияси ва трансплантацияси ривожланиши сабабли қон билан узоқ муддатли алоқада бўладиган материаллар долзарб хисобланади. Биологик материалларнинг асосий жихати қон билан уйғунлиги хисобланади. Қон билан доимий алоқада бўладиган материаллар ва тиббий буюмлар учун ўзига хос талаблар қўйилади: Қон билан уйғун тиббий буюмлар токсикологик, аллергик, яллиғлантирувчи оқибатларга олиб келмаслиги керак; фермент тизимларини фаоллаштириши; аъзо ва тўқималарга, оқсил ва қон хужайраларига салбий таъсир кўрсатмаслиги; антиген ва канцероген таъсир кўрсатмаслиги; мокроорганизмлар

1. Alvarez J. R./ Oxidized cellulose as the cause of an acute ischemic event after coronary revascularization.// Journal of Interactive Cardio Vascular and Thoracic Surgery. - 2014. - Vol. 11. - P. 488–489.

ривожланишини ва электролитлар баланси бузилишини келтириб чиқармаслиги зарур. Конда тромб ва тромбоэмболик холатлар пайдо бўлиши бу тиббий материаллар ва буюмларнинг қон билан ўзаро уйғунмаслиги кўрсаткичи ҳисобланади.

Асосий ва муҳим муаммо биологик структуралар хусусиятларини бажара оладиган биопарчаланувчи материаллар яратиш. Хозирги вақтда бундай материаллар тадқиқоти муҳим ва долзарб ҳисобланади.

Шикастланган тўқимани тикланиши, хужайраларини ўсиши ва пролиферацияси учун матрикслар зарур (scaffolds - матрикс, ташувчи, қолип). Бу йўналиш "биоўхшатиш" деб номланади, бу билан боғлиқ материаллар self-monitoring - "ўз-ўзини тартибга солувчи", smart - «ақлли» ёки интеллигент - "intelligent" дейилади. Ушбу материаллар қўланилиш соҳаси жуда кенг.

Тирик организм ички мухити билан алоқада бўладиган, тиббий буюмлар ва мосламалар тайёрлаш учун мўлжалланган материаллар "биоматериаллар" деб номланади, улар орасида:

- тирик организм билан биологик жихатдан мос бўлиши (бу материаллар танада узоқ вақт давомида қолганда хам унда салбий реакция чақирмайди (силикон, тефлон, поликарбонатлар, полигликолид ва полилактатлар, полиетилен, титан ва бошқалар);
- антитромбоген хусусиятларга эга бўлиши
- адсорбентлар (хозирда амалий сунъий органлар аппарати (буйрак, ўпка, юрак) да ишлатиладиган материаллар);
- кислород ташувчи моддалар;
- диффуз – диализ плёнкали материаллар;
- толали материал;
- микроинкапсуляция учун материаллар;
- мослашувчан шаклда-эластик ва ишқаланишга чидамли материаллар;
- тўқималарни бирлаштириш учун биоелимлар.

1.2 Имплантатлар турлари.

Биотиббиёт учун замонавий материаллар

Тиббиётда ишлатиладиган материалларнинг рўйхати орасида келиб чиқиши табиий ва синтетик бўлган материаллар, шу жумладан, - турли хил металлар, кераминлар, синтетик ва табиий полимерлар, турли композитлар ва бошқалар киради.

Металлар

Металл буюмлар, одатда металл элементлар (темир, титан, олтин, алюминий) бирикмаси, ички электр мосламалар ва сунъий органлар, ортопедия, ортодонтияда юқори механик мустахкамликка эга бўлгани учун ишлатилади. Металл материаллар ёки тиббиёт учун қотишмаларни танлови қуидаги хусусиятларига асосланган холда амалга оширилади: 1) биологик мослиқ, 2) физик ва механик хусусиятлари 3) материални эскириши. Энг кенг тарқалгани бу зангламас пўлатлар орасида, титан ва унинг қотишмалари, кобалт қотишмаларидир. Нисбатан яқинда никел ва титандан (нитинол) янги материал ишлаб чиқарилган бўлиб, у ўз шакл хотирасини сақлаб қолиш хусусиятига эга ва бугунги кунда ундан турли мосламалар ва имплантатлар ишлаб чиқишида кенг фойдаланилмоқда. Юқори механик мустахкамликка эга материаллар ортопедия учун афзал хисобланади. Ортопедик хирургик амалиётида катта суяк нуксонларида юқори куч юзага келиши мумкин, шунинг учун имплантация қилинган материал шу кучларга бардош бериши лозим бўлади. Коррозияга учраш бу қўп металларни тиббиёт учун салбий томони хисобланади. Биологик суюқликлар таъсирида танага ўрнатилган металл маҳсулотлар коррозияга учраши натижсида танада захарли маҳсулотлар бирикмаси ажралиб чиқиши мумкин.

Шундан келиб чиқиб тиббиётда қўлланиладиган металлар учун қўйиладиган талаблар, қуидагилардан бўлиб улар: биомослиқ; тегишли физик ва механик хусусиятларга эгалиги; узоқ вақт хизмат қилиши, коррозияга учрамаслиги керак.^{1,2}

Керамика

Керамиканинг асосий хусусиятларидан бу – биомослиқ, юқори мустахкамлик, иссиқлик ва электрни изоляция қилиш хусусиятига эгалиги, коррозияга чидамлилиги хисобланади. Керамик маҳсулотларнинг умумий хусусиятларидан бири, юқори харорат (500°C) га чидамлилигидир. Камчиликлари орасида унинг мўртлиги ва синувчанлиги хисбланиб, бу керамик маҳсулотларнинг ишлатилишини чегаралайди. Тиббиётда ишлатиладиган керамик маҳсулотлар биокерамика деб номланади. Организмда биокерамикани “холати” га қараб биоинерт, биоактив ва *in vivo* эрувчи (сўрилувчи) турларга бўлинади.

Композит материаллар

Композитлар - полимер, металл, углерод, керамика ёки бошқа субстрат

1. Bouras A. F., Truant S., Pruvot F. R./ Management of blunt hepatic trauma// Journal of Visceral Surg. - 2015. - Vol. 10 (004). - P. 351-8.

2. Camy S., Condoret J. S., Montanari S., Rattaz A., Vignon M./ Oxidation of cellulose in pressurized carbon dioxide // The Journal of Supercritical Fluids. - 2015. - Vol. 51. - P. 188–196.

(матрица) дан ташкил топган, кўп компонентли материаллардир. Куч бўшликлар орқали ўтмайди шу сабабли, ғовакли керамик, металл ёки пластик материаллар, хатточи материал мустахкам ғоваксимон материалдан ташкил топган тақдирда хам, композит бўла олмайди.

Матрица вазифасини бажрувчи полимер материали композитлар, энг кенг ва хилма-хил тарқалган турлардан бири хисобланади. Уларни тиббиётнинг турли соҳаларида қўлланилиши сезиларли даражада ижобий иқтисодий таъсир кўрсатди.

Бугунги кунда боғловчи асос сифатида, биопарчаланувчи полимерлардан иборат композитли материаллардан фойдаланиш катта умид бағишлади. Биопарчаланувчи композитлар яратиш соҳасига бўлган қизиқиши жуда юқори. Бу тур материалларни маълум ва фарқли устунли томонларини айтиш лозим: 1) полимер парчаланиши жраёнида куч таъсиrlаридан камроқ химоя қилинади, 2) металл пластиналардан фарқли ўлароқ имплантат парчалангандага янги тўқима билан ўрин алмашинади, шунинг учун иккинчи маротаба хирургик амалиётга эҳтиёж қолмайди. Шу сабабли хозирда биопарчаланувчи композит материаллардан фойдаланиш ва уларни ишлаб чиқариш кенг тус олмоқда.

Тирик организм билан мос келадиган полимерлар

Илм-фан ва технологиялар ривожланиши натижасида синтетик ва юқори молекуляр табиий полимер бирикмаларни тиббиётга янада кенг татбиқ қилишга олиб келди.^{1,2}

"Полимер" атамаси - «поли» кўп ва «мер» - бирлик, сўзларидан ташкил топган. Шундай қилиб, полимер – бу жуда кўп бирликлардан иборат бўлган молекуладир.

Харорат таъсирига кўра, полимер икки турга бўлинади: Термоқотувчи ва термопластик. Термопластик полимерлардан турли конфигурацияли имплантатлар олишда фойдаланиш мумкун. Термопластлар чизиқли полимер занжиридан иборат бўлиб, улар молекулалар аро боғларга эга эмас. Термопласт полимерлар ўзининг якуний шаклини қабул қилиб полимеризацияланади ва иситиш натижсида шаклини ўзгартиrmайди. Одатда бундай полимерлардаги молекулалар аро полимер занжир боғлари ковалент боғдан иборат.

1. Collinson S. R./ The catalytic oxidation of biomass to new materials focusing on starch, cellulose and lignin.// Coordination Chemistry Reviews. - 2015. - Vol. - 254 (15–16). - P. 110.

2. Coseri S./ Oxidized cellulose—Survey of the most recent achievements.// Journal of Carbohydrate Polymers. - 2013. - Vol. 93. - P. 207-215.

Олиниш услубига қараб полимерларни: аддитив полимерлар (қадамма-қадам полимеризация йўли билан олинган полимерлар), ва қонденсацион полимерлар сифатида таснифланади. Аддитиве полимерлар (полиетилен, полиметил метакрилат) тўйинмаган мономерларнинг икки углерод – углерод боғларини сақловчи эркин радикалли қўшилиш реакциясидан синтезланади. Конденсацион полимерлар икки полимерни ўзаро реакцияси йўли билан хосил қилинади, оқибатида кичик малекуляр оғирликка эга бўлган модда хосил бўлади. Баъзи қонденсацион полимерлар организмда гидролизланиши мумкин. Полимерларнинг энг муҳим хусусиятлари бу молекуляр оғирлигининг катталиги ва полимеризация даражасидир.

Бир турдаги мономерлардан ташкил топган полимерлар гомополимерлар дейилади. Икки турдаги мономердан иборат полимерлар сополимерлардир. Тузилиши жихатидан полимерлар аморф ва эластомерларга бўлинади.

Полимерлар қонфигурацияси уларнинг кимёвий тузилишини белгилайди. Полимерлар механик хусусиятларига кўра бир-биридан сезиларли даражада фарқ қиласди; улар орасида – эгилувчан қаттиқ, резинасимон пластик эластомерлар, ёпишқоқ суюқликлар фарқланади. Металлар ва керамикадан фарқли ўлароқ, полимерларнинг механик хусусияти вақт давомида ўзгаради. Бундай хатти харакат -"эгилувчан ёпишқоқ" деб номланади.

Тиббиётда фойдали полимерлар орасида - синтетик ва табиий материаллар, биоинэрт (биологик суюқликларда парчаланмайдиган) ва парчаланадиган (биосўрилувчи) полимерлар; юқори кристал термопластлар ва пластик эластомерлар мавжуд. Тиббиёт учун мўлжалланган полимерлар "тиббий жихатдан" юқори тозаликка эга бўлиши керак.

Биотиббиётда ишлатиладиган ва истиқболларга эга бўлган бошқа синтетик полимерлар хам мавжуд. Хозирги вақтда ушбу маҳсулотларлар қатори кенгайиб бормоқда, ва эндопротезлар ишлаб чиқариш учун узоқ вақт хизмат қиласдиган биотиббий ва технологик хусусиятлари такомиллаштирилган полимерларнинг янги авлоди пайдо бўлишига умид қилиш мумкин.

1.3 Имплантатларнинг одам организми билан бирикиши ва бу жараённинг текширилиши.

Хозирги кунда реконструктив хирургия, биоматериалларни кенг кўлловчи соҳа бўлиб, турли тўқима ва аъзолар нуқсонларини реконструкция

қилиб, bemorlar haёт sifati daражасини трансплантат ва биологик суний аъзолар қўлламасдан яхшилаш имконини беради.

Юрак-қон томир (қон айланиш) тизими, тананинг барча мухим вазифаларини таъминлайди. Юрак коронар томирлари касалликлари юрак-қон томир тизимида энг кенг тарқалган патология хисобланади. Юрак – қон томир тизими касалликлари етакчи ўринда бўлгани учун, тиббиётда қўлланиладиган материалларнинг йирик гуруҳини юрак – қон томир хирургияси учун ишлатиладиган материаллар ташкил қиласди. Уларнинг қўлланилиш соҳаси кенг бўлиб – булар ишлаб чиқаришда қон сақловчи идишлар, игна ва шприц, томир катетерлари, сунъий юрак клапанлари, сунъий қон айланишини таъминловчи тизимлар хисобланади. Қон билан алоқада бўладиган материаллардан тайёрланадиган протезларга юқори талаб қўйилади. Протезларни қон билан уйғунликда ишлатиладиган материаллар табиати ва ишлаб чиқариш технологиялари шунингдек, бир қатор омилларга боғлиқ. Шунинг учун, хеч тасодиф эмаски, тиббиётда реконструктив хирургиянинг энг ривожланган соҳаси бу кардиохирургия хисобланади.

Синтетик биотурғун полимерлар:

Экстракорпорал қурилмалар учун акрилат материаллар.

Юрак клапанлари ва сунъий юрак элементлари учун эпоксид бирикмалар.

Қон томирларининг протезлари, катетер қопламалари учун фторуглеродлар.

Чоклар учун полиамиллар.

Экстракопрпорал қурилмалар учунконструкцион поликарбонатлар.

Юрак клапанлари, сунъий юрак элементлари учун полиамид.

Юрак клапанлари ва сунъий юрак элементлари учун полисульфонлар.

Катетер, сунъий юрак учун полиуретан.^{1,2}

Биопарчаланувчи полимерлар:

Дорилар учун полиангидрид.

Дорилар учун поликапролактан.

Чоклар учун гликолид ва лактидларнинг сополимерлари.

Дорилар учун полигидроксилкантлар.

Табий полимерлардан материаллар:

Боғланган албумин қопламалар томир протези учун, контрастли восита ултратовуш ташхиси учун ацетат ва целюлоза гидрат диализ учун мембраналар яратишида.

1. Dias, G. J., Peplow, P. V. & Teixeira F./ Osseous regeneration in the presence of oxidized cellulose and collagen.// Journal of Materials Science: Materials in Medicine. - 2014. - Vol. 14. - P. 739–745.

2. Dimitrijevich S. D., Tatarko M, Gracy R. W, Linsky C. B, Olsen C./ Biodegradation of regenerated cellulose.// Carbohydr Res. - 2011. - Vol. 195(2). -P. 247-56.

Назорат саволлари:

1. Имплантат тугрисида тушунча.
2. Аъзони урнини копловчи ускунанинг номи нима?
3. Биопротез бу нима?
4. Одамдан одамга аъзони ўтказиш қандай аталади?
5. Аутотрансплантация бу нима?
6. Керамикани асосий хусусиятлари?
7. Тиббиет учун кулланадиган металларнинг хусусиятдари қандай?
8. Тиббиётда қўлланадиган биокермика турлари?
9. Биологик тўқима бу нима?
10. Полимер бу нима?
11. Полимерларнинг хусусиятлари нимадан иборат?
12. Кон томир эндопротезларига қандай талаб қўйилади?
13. Биоинерт полимер бу нимани англатади?
14. Юрак клапанларига бўлган талаблар?
15. Хайвондан одамга кўчирилган тўқимақандай аталади?
16. Қандай адсорбентлархозирги махалда қўлланилади?
17. Қандай табиий полимерлар тиббиётда қўлланилади?
18. Хорижий қон томир протезларини турларини айтиб беринг?
19. Қандай иплар хирургия учун ишлатилади?
20. Сўрилиб кетувчи ипларнинг номини айтинг?
21. Сўрилмайдиган ипларнинг номини айтинг?
22. Гемостатик имплантатларнинг номини айтинг?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Collinson S. R./ The catalytic oxidation of biomass to new materials focusing on starch, cellulose and lignin.// Coordination Chemistry Reviews. - 2015. - Vol. - 254 (15–16). - P. 110.
2. Carbon R. T, et al./ Fast-track Surgery of Recurrent Pneumothorax in Patients with cystic fibrosis-superiority of minimally invasive tissue management.// 7th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis. Medimond International Proceedings, Munich. - 2010. - 15–28.
3. Coseri S./ Oxidized cellulose—Survey of the most recent achievements.// Journal of Carbohydrate Polymers. - 2013. - Vol. 93. - P. 207-215.
4. Crawford R. L./ Lignin biodegradation and transformation.// New York: John Wiley and Sons.- 2013.- ISBN 0-471-05743-6.

5. Dias, G. J., Peplow, P. V. & Teixeira F./ Osseous regeneration in the presence of oxidized cellulose and collagen.// Journal of Materials Science: Materials in Medicine. - 2014. - Vol. 14. - P. 739–745.
6. Dimitrijevich S. D., Tatarko M, Gracy R. W, Linsky C. B, Olsen C./ Biodegradation of oxidized regenerated cellulose.// Carbohydr Res. - 2011. - Vol. 195(2). -P. 247-56.
7. Dornelas J./ Vaginoplasty with oxidized cellulose: anatomical, functional and histological evaluation.// Journal of Obstetric& Gynecology and Reproductive biology. - 2012. -Volume 163(2). - P. 204–209.

2 –мавзу: Хирургик касалларидан фотодинамик даволаш усуллари.

Режа:

1. Хирургик касалларидан фотодинамик даволаш усуллари.
2. Махсус рентген ускуналар ёрдамида юқори технологиялик узатгич – катетерлар оркали қон томир ва юрак касалларини даволашга имкониятлари.

Таянч иборалар: артерия касалларни, атеросклероз, хирургия муамолари, вена касалларни, аневризма, долзалб масалалар.

2.1 Хирургик касалларидан фотодинамик даволаш усуллари.

Фотосенсибилизатор

Яхши маълумки, деярли барча кимёвий моддалар оптик диапазонда ютилиш ва нурланиш хоссасига эга. Клиник амалиётда қўлланилувчи аксарият препаратлар ультрабинафша диапазонда нурни ютади хамда ушбу диапазондаги нурланиш тирик тўқимага юқори даражада захарли таъсир кўрсатади, бу эса унинг ФДТ учун яроқлилик даражасини пасайтиради. Тиббиётда фойдаланилувчи ФС одатда қизил спектрдаги нурни ютади, шунингдек бу нурланиш организм учун кам зарарли бўлиши билан бирга биологик тўқималарга чуқурроқ кириб боради. Ушбу хусусиятларига қарамай фотосенсибилизаторнинг ёруғлик ва қоронғулик захрини аниқлаш катта ахамиятга эга.

Қоронғулик захри- бу ёруғлик нурланиши (қўзгалиш) мавжуд бўлмаган, маълум миқдорда фойдаланиувчи фотосенсибилизаторнинг организмга таъсирини баҳолайдиган кўрсаткич.

Ёруғлик захри – бу ФС нинг патологик хужайрани шикастланишига олиб келувчи синглет кислород ёки фаол кислород радикалларини ажратиш қобилияти.^{1,2,3}

Замонавий ФС минимал қоронғулик ва кучли ёруғлик захрига эга. Янги ФС учун ушбу кўрсаткичлар тажрибаларда ўрганилмоқда.

ФДТ ўтказиш учун шунингдек, ФСнинг организмдан чиқарилиш вақтини хисобга олиш керак, чунки ФС тўқималарда мавжуд бўлган вақтда ёруғликка бўлган юқори сезувчанлик сақланиб туради.

ФДТ ўтказишида ФСни ютиш спектрини, шунингдек биологик тўқималарнинг хусусиятларини аниқлаш зарур.

ФС нинг ютиш спектрини аниқлаш

Фотосенсибилизаторларнинг спектрал тавсифини спектрофотометрда ўрганиш мумкин (масалан : «Beckman» корхонасининг Acta-C-III (США)).^{1,2,3}

Аниқлаш услуби:

1. Спектрофотометр дастасини бураган холда, керакли тўлқин узунликдаги диапазонга созланади.
2. Фойдаланилаётган эритманинг хар бири учун талаб этилган тўлқин узунлик аниқлангач, спектрофотометрнинг дастаси қисқа тўлқиндан узунига қадар буралиб, кўрсаткич аста- секин ошириб борилади.
- 3.Кювет ушловчига фотосенсибилизатор эритмаси билан тўлдирилган кювета ўрнатилади.
4. Кейин эса ускунананг қўлланмасига биноан кўрсатмалар аниқланади.

-
1. Sigusch, B. W., et al., “Efficacy of photodynamic therapy on inflammatory signs and two selected periodontopathogenic species in a beagle dog model,” J Periodontol, Vol. 76, 2015, pp. 1100–1105.
 2. Singh, G., et al., “Mitochondrial photosensitization by Photofrin II,” Photochem.Photobiol., Vol. 46, 2015, pp. 645–649.
 3. Skovsen, E., et al., “Lifetime and Diffusion of Singlet Oxygen in a Cell,” J. Phys. Chem. B, Vol. 109, 2014, pp. 8570–8573.

5. I_0 – эритмага тушадиган ёруғлик миқдори катталиги хисобланади.
6. Ламберт-Бер (бўялган эритмаларда нурнинг ютилиш қонуни) қонунига мувофиқ I_1 –эритмадан ўтувчи ёруғлик миқдори (яъни ёруғликни қабул қилиувчи мосламада тутиб қолинувчи миқдори) қуидаги формула орқали топилади:

$$I_1 / I_0 = 10^{-ck}$$

c – эритма миқдори ; I –эритма қатламининг қалинлиги ; k – ютилевчи модда тавсифи ёки экстинкция коэффициенти (оптик зичлик коэффициенти).

Кейин эса хар бир эритма учун олинган маълумотларга мувофиқ, ютилевчи эритманинг оптик зичлиги ва нурланишнинг тўлқин узунлигига асосланган холда график тўзилади.

Оптикнурланиш манбаси

Юқорида кўрсатилганидек, нурланиш манбай клиник вазифаси ва таъсир объективининг жойлашуви, унинг геометрик шаклига қараб, паст энергияли лазерлар, кучли ёруғлик диодлари, нокогерент нурланиш манбалари ва бошқалар бўлиши мумкин. Фотодинамик терапия қурилмаларига умумий талаблар қуидагича :

Нурланиш тўлқин узунлиги –нурланишнинг авжига чиқиши ва ўзгариш чегараларини белгилаб берувчи, маҳсус асбоб билан аниқланувчи асосий кўрсаткич.Лазерлар учун ушбу кўрсаткич доимий хисобланади, ёруғлик диодлари учун эса $\pm 5\text{--}15\text{nm}$ атрофида ўзгариб туриши мумкин. ФДТ самараси нурланиш тўлқин узунлиги ва ФС ютиш спектри мос келган холдагина бошланиши мумкин.

Нурланиш кучланиши – маҳсус асбоб билан аниқланувчи нурланишнинг ўртача кучланиши бўлиб, қурилманинг паспорт маълумотларига киради.

-
1. Sohl, S., Kauer, F., Paasch, U., and Simon, J. C. “Photodynamic treatment of cutaneous leishmaniasis.” J Dtsch Dermatol Ges, Vol 5, 2013, 128–130.
 2. Soukos, N. S., et al., “Targeted antimicrobial photochemotherapy,” Antimicrob Agents Chemother, Vol. 42, 2013, pp. 2595–2601.

Одатда, қурилманинг кучланиши кўрсатилади, ёруғлик диодларидан фойдаланилганда эса ундан чиқиш кучланиши кўрсатилади. Ҳисоблаш бирлиги Вт ёки мВт.

Кучланиш зичлиги - бу ясама кўрсаткич бўлиб, нурланиш кучланишини нурланувчи майдон бирлигига бўлиш йўли билан аниқланади. Бу бирлик $\text{Вт}/\text{см}^2$ ёки $\text{мВт}/\text{см}^2$ да акс эттирилади. Шуни ҳисобга олиш керакки, ФДТ кучланиш зичлигининг муайян қийматларида гина, одатда $100 \text{ мВт}/\text{см}^2$ дан юқори бўлгандагина фаолият кўрсатиши мумкин.^{1,2}.

Нурланиш энергияси –кўпроқ самара олиш учун юзани ёруғлик нурланиши билан етарлича тўйинганлигини баҳоловчи катталик. Ушбу кўрсаткич қурилманинг кучланиши, таъсир этиш майдони хамда нурланиш давомийлигидан келиб чиқсан ҳолда ҳисоблаб топилади ва $\text{Дж}/\text{см}^2$ бирликда акс эттирилади.

Дозиметрия тушунчаси ва уни аниқлаш

Фотодинамик терапия даставвал юза заарланишларни даволаш учун тавсия этилган эди, бироқ усул чуқурроқ тўзилмаларни хам даволашда кўллана бошланди. ФДТ ёруғлик нурланиш манбалари ва уни тўқимага етказиб бериш усулларини мукаммаллаштириш йўллари орқали ривожланди.

ФДТ дозиметриясининг мохияти таъсир кўрсаткичлари ва механизмларига асосланган асосий моделларни ўз ичига олади. Даволаш режалари ва дозиметрия мохияти даволаш вазифалари хамда патологик ўчоқнинг локализациясидан келиб чиқиб белгиланади.

Ёруғлик дозиметрияси замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда радиологик принципларга қўра режалаштирилади.

Онко-радиологияда доза тўқиманинг биологик жавобини аниқлаган ҳолда, энергетик тавсифлар тахлиллари, шунингдек, кислороднинг ажralишининг кучайтирувчи ёки сусайтирувчи омилларни ўрганиш орқали шакллантирилган физик ва радиологик кўрсаткичларга биноан аниқланади. ФДТ асоси фотокимёвий реакция ҳисобланади: фотон, фотосенсибилизатор ва кислород. Кейинчалик эса у биологик жавоб билан кечувчи цитотоксик таъсир билан намоён бўлади.

-
1. Star, W., M. "Diffusion Theory of Light Transport." Optical-thermal response of laser-irradiated tissue, A. J. Welsh and M. J. C. van Gemeert, eds., Plenum, New York, pp.131-205.
 2. Star, W. M.: "The Relationship between Integrating Sphere and Diffusion-Theory Calculations of Fluence Rate at the Wall of a Spherical Cavity." *Phys. Med. Biol.*, Vol 40, No 1, 2014, pp. 1-8.

ФДТнинг биологик дозаси чин цитотоксик таъсир ёки синглет кислороднинг ажралиши билан аниқланиши керак, лекин клиникада ушбу кўрсатқичларнинг хақиқий миқдорий ўлчовини аниқлашнинг имкони йўқ. Реакция мониторингини даволаш вақтида ёки таъсир кўрсатилгандан сўнг пайдо бўлувчи цитотоксик самарага қараб аниқлаш афзалроқдир. Фотодинамик реакция қисқа вақт оралиғида кечади ва биологик самара (тўқималар шишининг эрта белгилари ёки томирдаги ўзгаришлардан ташқари) дархол намоён бўлмайди. Биологик жавоб ўрнига фотосенсибилизатор флуоресценциясига асосланган моделлардан фойдаланиш мумкин. Тўқима жавобининг кўпгина моделлари ёруғлик нурланишининг физик кўрсаткичлари: эффектив дозада критик энергияга асосланган. Шу каби моделларда кислородга бўлган талабни назорат қилиш имконияти мавжуд, аммо ушбу жараён анча мураккаб бўлиб, бунинг учун маҳсус гипербарик кислородли камералардан фойдаланилади.

Чуқурроқдаги тўқималарни даволаш нурланиш манбаи ва препарат миқдорига боғлиқ бўлади. Шу билан бирга кислород даволашнинг бошида юқори фаолликда бўлади, унинг талаб тезлиги эса ёруғлик оқими ёки фотонлар билан аниқланади (масалан, агар кислороднинг камайиши тезда содир бўлса, ФДТ реакцияси секинлашади). Бундан ташқари, агар биологик дозада ФДТ кислород талаби билан боғлиқ бўлса, фотон энергияси ва ёруғлик нурланиши интенсивлигига таъсир кўрсатиши мумкин бўлади.

Цитотоксик субстрат хосил бўлишига олиб келувчи фотокимёвий реакция квант самара хисобланади ва шу тарзда у кучланишга эмас, балки фотонлар зичлигига боғлиқ бўлади. Кучланишни ўлчаш фотонларни хисоблашга нисбатан кўпроқ кўлланилади, шунга кўра энергия зичлиги ва кучланиш атамаларидан фойдаланилади. Амалиётда бу тўқимага хусусан, терига максимал тарзда рухсат этилган таъсирни баҳолаш учун фойдаланиувчи бирликларга мос келади.

Тўқималарнинг оптик хоссалари ва ёруғликнинг тарқалиши

Барча мўлжалланган таъсир хажми бўйича ёруғлик интенсивлигини аниқлаш беморнинг мақбул даволанишини таъминловчи энг оддий усулдир. Даволашнинг идеал натижасига эришишдаги чекланмалар тўқиманинг ёруғлик нурланишини ютувчи бир хил бўлмаган мухит эканлиги билан тушунтирилади. Нурланишнинг тўлқин узунлиги ортиб боргани сари нурланишнинг ютилиши кам ифодаланиб қолади. Шу тарзда, тўқималарнинг оптик хоссалари ёруғлик дозиметриясининг клиник қийматида биринчи даражали ахамият касб этади.

Ёруғлик ёки фотоннинг тўқималарга кириб бориши Максвелл тенгламасига бўйсунади. Шунга қарамай, тўқима бу диэлектрикдир, ўтказувчанликнинг микрон масштабида ўзгариши хам математик хисоб китобнинг ахамиятини камайтиради. Янада кўпроқ умумий ёндошув диффузия тенгламаларини ечиш ва акс холда аниқ клиник вазиятлар: юзаки таъсир, сферик бўшлиқ ёки қаттиқ тўқимага мослашган транспорт теориясидан фойдаланишни ўз ичига олади.

Турли эритмалар диффўзиясининг физик тенгламаси тўқима чегараларининг аккомадацияси ва олиб ўтиш таълимотидаги энергия сақланиши чегарасида рефракцион индекс фарқига асосланган. Ютилишни содда кучсизлантирилган усул билан хам хисоблаш мумкин, лекин кириб бориш ва ютилишнинг алоҳида баҳоланиши мутлоқ кучланишга боғлиқ бўлмаган холда ҳисоблашни осонлаштиради (масалан, вақтли ёки частотали модуляция). Шу билан бирга, қон айланишнинг ўзига хослиги аниқ ўлчовлар олишни жиддий равища қийинлаштиради.

Аксарият усуллар тўқима юзасининг оптик хоссаларини ўрганиш учун ишлаб чиқилган. Ушбу холатда ютилишдан ташқари нурланишнинг диффуз аксининг кириб бориши хам баҳоланади ва у анализик хисобларга асосланади.

Тўқималарнинг интерстициал нурланишида фақатгина ёруғлик оқимининг кучланиш зичлигини хисоблаш етарли эмас. Бу эса қўшимча равища рақамли ёки анализик назоратни талаб этади. Интерстициал нурланиш учун тўқималарнинг оптик хоссаларини аниқловчи бир қанча усуллар таклиф этилган.

Zhumанбалар ва зондлар катетр билан бирга жойлаштириладиган техникани таклиф қилди. Ундан барча органларнинг оптик хусусиятларини хисоблаш учун фойдаланилиш мумкин, лекин усул анча узоқ вақт талаб этади. Бу муоммо Pomeleau-Dalcourt ва унинг хаммуаллифлари таклиф этган толали мультисенсор датчиклардан фойдаланган холда хал этилиши мумкин.

Weersink ва хаммуаллифлари бир нечта нуқталарда ўлчай оладиган ва тўқимага имплантация қилинган нурланишга боғлиқ бўлмаган бир қанча манбалардан иборат техникани таклиф қилди.

Chin ва унинг муаллифдошлари тўқиманинг бир хилда эмаслигини аниқлашга имкон берувчи сезгир датчиклардан фойдаланишган. Частоталар тавсифига асосланган хисобловчи техника жуда аниқ бўлиб чиқди, бироқ у тўқиманинг оптик хоссаларининг бир хиллигига мўлжаллангандир.^{1,2}

Дозиметрия тушунчаси ва уни аниқлаш.


ФДТ дозасини аниқлашда дастлабки қадам объект характерини аниқлаш хисобланади. Радиацион терапиянинг қоидаларига амал қилган холда, катта хажмли хосила (КХХ) бу кўзга кўринарли бўлиб, клиник текширувларда аниқланади. Катта хажмли хосила ўсманинг фақат бир қисми бўлиши мумкин, чунки ўсманинг микроскопик чегаралари асосий хосила ичида жойлашади. Ушбу жихатларнинг катта хажмли хосилага қўшилиши даволашнинг клиник хажмини (ДКХ) белгилашга имкон беради. Ўсма хажмлари ва унинг тарқалишини эътиборга олиб, клиник тажрибага асосланиб(субъектив) ДКХ аниқланади. Ёруғлик нурланишида дозиметрия хатоси бемор холати ва нурлантиргич хамда такрорий таъсир частотаси ва орган харакатчанлиги орасидаги ўзгаришларга боғлиқ бўлади.

Тўқималар нурланишининг дозасини хисоблаш учун КХХ га таъсир кўрсатувчи ёруғлик изодозаларининг минимал контурини хисоблаш керак. Объектнинг геометриясини комплекс баҳолаш етарлича қийинчилик туғдиради. КХХ қабул қилган ёруғлик дозасини кумулятив доза хажми гистограммаси (ДХГ) ёрдамида кўриш мумкин бўлади ва у 3d визуализацион вазифали комплексни 1D схемага айлантириб беради. ДХГнинг вертикал ўқида фоизларда ифодаланган тўқиманинг умумий хажми, горизонтал ўқида эса юқорида маҳсус келтирилган дозалар ифодаланган бўлади. Агар тўқимада препарат микдори доимий бўлса, у холда кумулятив доза ёруғлик дозаси атамаси орқали таърифланади. ДХГдан келиб чиқсан холда белгиланган доза икки хил усулда хисобланиши мумкин: ПООнинг 90% ини қопловчи D_{90} ёруғликнинг минимал дозасига мос келади, V_{100} эса белгиланган дозани 100% қабул қилувчи ПООнинг фракцияланган хажми хисобланади.

-
1. Stratis-Cullum, D. N., et al., “Spectroscopic Data of Biologically and Medically Relevant Species and Samples,” in Biomedical Photonics Handbook, pp. 65-1-65-136, T. Vo-Dinh, (ed.) New York: CRC Press,, 2013.
 2. Szeimies, R. M., Landthaler, M., and Karrer, S., “Non-oncologic indications for ALA-PDT,” J Dermatolog Treat, Vol. 13 Suppl 1, 2012, pp. S13–18.

Дозани мувофиқлаштиришнинг 2та меъзони мавжуд:

- 1) минимал бўсаға дозаси ПООга етказилади ва 2) агар даволаш самараси ушбу орган учун салбий клиник натижа берса хавф органларига (ХО) етказилган доза бўсаға дозадан пастроқ бўлади.



Простата ва тўғри ичакни ФДТ даволаш учун доза хажми гистограммаси (ДХГ)га мисол.

Бўсаға доза, D_t ва ПОО қабул қиласан 90% доза, D₉₀, ҳ ўқда кўрсатилган .

D₉₀, V₁₀₀ бу D_t га эга бўлган нурланиш хажмининг фоизи. Мисол учун, V₁₀₀=80% простата учун ва 5% тўғри ичак учун.

Бу эса формуладаги қийматларни хисоблаш йўли орқали қўшилади :

$$F = \sum_{j=1}^M w_j^{PTV} f(D_p, D_T) + \sum_{j=1}^N w_j^{ORV} f(D_o, D_T)$$

ПОО M ва N кўринишида ифодаланган. f (D_p, D_T) етказиб берилган дозани ФДТга муносабатини ифодалайди , D_p ФДТнинг бўсаға дозаси, D_T. Агар D_p>D_T бўлса, у холда f(D_p, D_T)=0 функцияниң минимизация қиймати ошмайди. Агар D_p<D_T бўлса, у холда f(D_p, D_T)>0, ножоиз дозага мос келади. Функция D_T-D_pга мос холда аниқланиши ёки ўзгариши мумкин. Радиацион

терапиядан фарқли ўлароқ, ФДТда ПОО учун универсал дозани аниқлашнинг зарурати йўқ. Тўқима шикастланишига эришилгандан сўнг ПОО билан дозани орттириш мумкин.

ХО учун кўриб чиқилган доза камайтирилади. $Do > Dt$ қиймат ортганда функция камаяди. ($Do, Dt) > Dt, f=0$). Бўсаға доза ФДТга нисбатан сезгирикни хисоблаган холда хар бир орган ёки тўқима тўзилмалари учун турлича бўлиши керак. ХО холати таъсирнинг клиник самарасига пропорционалдир. ХО учун доза бўсаға дозадан юқори бўлади. Охиргача даволанмаган bemorlarغا такрорий таъсир кўрсатилганда ёки нурланиш дозасини ошириш зарурати туғилганда ХОга ортиқча таъсир намоён бўлиши мумкин. Бундай холларда ушбу омилларнинг нисбий ахамиятини хисобга олиш ва шунга мувофиқ тарзда даволашни режалаштириш керак бўлади.^{1,2}

Режалаштирилаётган ёруғлик ФДТси учун белгиланган дозани ошириш ва камайтириш хамда объект кўрсаткичлари қуидагиларни ўз ичига олади:

- 1) манбалар миқдори (нурлантиргичлар миқдорига эквивалент)
- 2) манба типи (сўнишга эквивалент)
- 3) интенсивлик (нурлантиргич интенсивлигига эквивалент).

ФДТ курилмалари чуқур бўлмаган юза хосилаларни, рак олди жараёнларни, яssi хужайрали карцинома, терининг бошқа ўсмалари хусусан, базал хужайрали карцинома, Бовен касаллигини даволашда клиникада кенг қўлланилади. ФДТ учун шунингдек, кўпгина юза нодерматологик касалликларни даволаш мувофиқ келади. Шу билан бирга, ФДТдан макуляр дегенерациянинг ёшга боғлиқ ассоциранган шаклларини (ВМД), Баррет қизилўнгачини даволашда ва вирусларни инактивация қилишда фойдаланилади.

Ушбу юза хосилаларни даволашда ФДТдан сўнг тўқималарнинг тикланиши тез кечади ва атрофдаги ўзгармаган тўқималарнинг заарланиши кузатилмайди. Ёруғлик нурланишини режалаштириш уни патологик тўқималарга бир хил дозада етказиб беришдан иборат. Ушбу холатларни даволаш учун таъсир майдони катта бўлган, гомоген интенсивликдаги нурланиш манбаидан фойдаланилади.

-
1. Tada, D. B., "Methylene blue-containing silica-coated magnetic particles: a potential magnetic carrier for photodynamic therapy," *Langmuir*, Vol. 23, 2015, pp. 8194–8199.
 2. Teichert, M. C., et al., "Treatment of oral candidiasis with methylene blue-mediated photodynamic therapy in an immunodeficient murine model," *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*, Vol. 93, 2002, pp. 155–160. *J Biol Chem*, Vol. 277, 2014, pp. 4902–4909.

ПООнинг ёритилганлигини аниқлаш учун апертура қўлланилади. ПООнинг маълум бир чуқурлигига эришилганда кучланиш оқимида ўзгаришлар юзага келмагунча ёруғлик дозасидаги бир хиллик сақланиб туради, бу эса даволаш натижасига таъсир қилиши мумкин. Шу каби холатларда тўқималарнинг сезувчанлигини хисобга олувчи Moseley моделидан фойдаланиш зарур.

2.2 Махсус рентген ускуналар ёрдамида юқори технологиялик узатгич – катетерлар оркали қон томир ва юрак касалликларини даволашга имкониятлари.

Қизилўнгач ёки сийдик пуфаги каби бўшлиқларни даволашда ёруғлик нурланишининг махсус манбалари бўлиши керак. Юза билан бўшлиқ орасидаги фарқ диффуз ифодаланган ёруғликни хисобга олишда мухим хисобланади, чунки бу бўшлиққа яқин бошқа обьектларга кўрсатиладиган таъсирни кучайтиради.^{1,2}.

Интеграцион мухитнинг кенгайиши факатгина геометрик хисобларга асосланган холда, кучланишининг 4 карра ортиши ва интенсивлик билан ифодаланади.

Фотофрин фотосенсибилизатори қўлланилувчи қизилўнгач ўсмасининг деструктив ФДТси мушак каватининг шикастланишига ва қизилўнгачнинг стриктурасига олиб келиши мумкин.

Бўшлиқларни даволовчи ФДТни мукаммалаштириш учун соғлом тўқималарнинг заарланиш хавфини хисобга олиб, нурлантириш кўрсаткичларини ўзгаририш талаб этилади. Бунга икки хил йўл билан эришилади:

1-қизилга нисбатан кўпроқ ютилиш қобилиятига эга бўлган бошқа спектрал диапазондаги нурланишдан фойдаланилади;

2-фотосенсибилизатор сифатида пролиферацияловчи ёки диспластик тўқимани танлаб ютувчи протолпорфирин -IXнинг ўтмишдоши 5-АЛА қўлланилади.

-
1. Thompson, M. S., et al.: "Clinical system for interstitial photodynamic therapy with combined on-line dosimetry measurements." *Appl. Optics*, Vol 44, No 19, 2015, pp. 4023-4031.
 2. Trachtenberg, J., et al.: "Vascular targeted photodynamic therapy with palla-dium-bacteriopheophorbide photosensitizer for recurrent prostate cancer following definitive radiation therapy: Assessment of safety and treatment response." Vol 178, No 5, 2015, pp. 1974-1979.

Терапияни оптималлаштириш ёруғлик таъсири ва препарат дозасини, аникроғи ютилган ёруғлик нурланиши ва тўқимадаги фотосенсибилизатор микдорини эмпирик таққослашдаги клиник натижаларга асосланган. Бу эса клиникада даволашни режалаштириш учун фойдаланиш мумкин бўлган янада жиддийроқ моделни яратишга зарурат туғдиради.

Тўқима хажми ва ёргулукни интерстициал юбориш

Кам инвазив ФДТни амалга ошириш учун ёруғлик таъсири тўқима марказидан бошланиши керак бўлади, бунинг учун эса оптик нур ўтказгичлардан фойдаланилади. Хозирги пайтгача сийдик пуфаги ФДТси учун бўшлиқ ичи нурланишининг нуктали манбаларидан фойдаланилади ва адабиётларда интерстициал терапия ўтказилганлиги хақидаги маълумотлар мавжуд эмас. Мия ва простата ФДТси учун тўқималарга энсиз ёки цилиндрик диффуз ёруғлик толалари киритилади. Тижоратда мавжуд бўлган цилиндрик диффуз нурлантиргичлар (CeramOptec, Biolitec, Biolighttec, Medlight ва ARTPhotonics) толанинг узунасидан нурланиш қандай ўтадиган бўлса айланасидан хам шундай универсал ўтказиб бериш мақсадида ишлаб чиқарилган. Улардан яна бир талаб етарлича кичик диаметрга (1,2-1,5 мм) эга бўлган, тўқимага чукур, шикастланишларсиз, хавфсиз ўрнатилувчи диод нурлантиргичларни яратиш хисобланади.^{1,2}

Танланган манбанинг сони ва хажми КХХнинг хажми ва шаклидан

келиб чиқади. Агар хосила хажми кичик ва шакли тўғри бўладиган бўлса, у холда даволаш учун ягона нурлантирувчи манбадан фойдаланиш керак бўлади. Турли манбалардан чиқувчи ёргулукни хисоблаш учун маҳсус аналитик моделлар кўлланилади.

Шунингдек, гомоген мухитда цилиндрик манбали ёруғлик тарқалишининг аналитик тавсифидан фойдаланилади. Ушбу хисобларни хар бир манба учун алохида индивидуал тарзда компьютерлаштирилган хисоблашлар йўли орқали осонгина бажариш мумкин.

Бу функциядан шунингдек, ноуниверсал манба оқимининг частоталарини хисоблаш учун хам фойдаланиш мумкин.

1. Tseng, S. H., et al.: "Pseudospectral time domain simulations of multiple light scattering in three-dimensional macroscopic random media." *Radio Sci.*, Vol 41, No 4, 2014, pp1021-1026..

Гетероген оптик хусусиятли хажмий хосилаларнинг янада мураккаброқ геометриясида ёруғлик тарқалишини баҳолаш мақсадида, оптик томография техникаси каби диффўзия тенгламасини ечиш усулидан фойдаланиш мумкин. Бундай хисоблашлар нурлантириш дозасини белгилаш ва мувофиқлаштириш учун қўлланилиши мумкин.

Дастлаб, ёруғлик дозиметрияси радиацион терапия талабларига асосланган, унга кўра ўсмаларни даволаш учун нурланиш дозаси универсал бўлиши керак эди. ФДТ аввалдан аблативный усул хисобланган ва ФДТни режалаштиришнинг эндиғи йўналиши эса юқорида таъкидланганидек келувчи хажмнинг энг камидა бўсаға дозани ютиши билан бирга обьект ичидаги дозани кўп бўлмаган даражада ортиб кетишини чегаралаши буниг исботи хисобланади.^{1.2.3}

Простата тўқималарнинг чуқур қатламларини даволашни ФДТнинг энг намунали мисоли сифатига киритиш мумкин, чунки унинг ўлчамлари кичик, нур ўтказгичларни тери орқали киритиш учун қулай, орган геометрияси содда ҳисобланади. Простата ўсмаларида унинг умумий хажмини, шунингдек у билан чегарадош органларни: уретра ва тўғри ичакни хам хисобга олиш мухимдир. Агар уретра катетеризацияси қайсиdir даражада стеноз ривожланиш хавфини олдини олса, унинг ФДТ натижасида шикастланишига клиник жихатдан йўл қўйиб бўлмайдиган асорат сифатида қаралади. Tookad тадқиқотлари натижасида, уретрадаги коллаген тўқима простата тўқимасига нисбатан ФДТга кам сезгирилиги аниqlанди. Тўғри ичакка ФДТ таъсири натижасида сезиларли клиник самараға эришилади, шу билан бирга, ректал оқма шаклланиш хавфи истисно этилмайди. Шу сабабдан, ФДТда тўғри ичак учун хавф омили уретраникига нисбатан юқорироқдир. Тўғри ичак учун бўсаға доза простата учун қўлланилувчи дозадан камроқ бўлиши керак.

-
1. van Hemmen, J. J. and Meuling, W. J., "Inactivation of Escherichia coli by superoxide radicals and their dismutation products," *Arch. Biochem. Biophys.*, Vol. 182, No. 2, 2013, pp. 743–748.
 2. VanStaveren, H. J.: "Construction, quality assurance and calibration of spherical isotropic fibre optic light diffusers." Vol 10, No 2, 2013, pp. 137-147.
 3. van Veen, R. L. P., et al.: "In situ light dosimetry during photodynamic therapy of Barrett's esophagus with 5-aminolevulinic acid." *Lasers Surg. Med.*, Vol 31, No 5, 2013, pp. 299-304.

Простата ФДТси клиник тажрибалар босқичида турибди, шундай экан, хавф омиллари фотосенсибилизатор ва заарланиш даражасига (томирли ёки хужайрали) хам боғлиқ бўлиши мумкинлигини хисобга олиш зарур.

Тўқималарда ютилган ёруғлик мониторинги – йирик хажмли тўқималарни даволашнинг муҳим жихати саналади. Мониторинг реал нурланишни кучланиш зичлигига мувофиқлашувини ва ХО ларидаги доза критик бўсағадан паст бўлиши кераклигини талаб этади. Объектив ва аниқ тиббий текширувлар (МРТ ёки ЎЗИ) дозиметрик назорат учун зарурдир. Шу сабабдан ёруғлик манбаларининг миқдори синчилаб саналиши лозим.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш жоизки, тўқима хажмини тўғри хисоблаш, ёруғлик манбаи тавсифи ва типини, нурлантиргичнинг тартибини аниқлаш ФДТ нинг мақбул самарасига эришишга имкон беради. Агар барча толалардан ёруғлик етказиб берувчи детекторлар сифатида фойдаланиладиган бўлса, киритилган ёруғлик толаларининг сонини камайтириш мумкин бўлади. Агар тўқималарда ёруғлик диффўзиясининг хусусиятлари хисобга олинадиган бўлса, у холда гетероген тўзилмаларга таъсир қўрсатилганда яхши самара олиш мумкин. Юқори самарага эришиш учун тўқималарнинг ёруғлик нурланишини мониторлаш муҳим аҳамият касб этиши мумкин.^{1.2.3.}

Нурлантиргичга яқин жойлашган ёруғлик детектори омилини, шунингдек, йирик қон томирларнинг мавжудлигини хам хисобга олиш зарур. Тўқималарнинг бир хилда нурланиши учун нур ўтказгичларнинг охирида бўлувчи маҳсус учликлардан фойдаланиш керак. Ёруғликнинг бир хилда тарқалиши учун эса тўқималарга яхшироқ сингувчи қизил спектрдаги нурланишни қўллаш, шунингдек 1 ммгача бўлган нур ўтказгичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

1.van Hemmen, J. J. and Meuling, W. J., "Inactivation of Escherichia coli by superoxide radicals and their dismutation products," Arch. Biochem. Biophys., Vol. 182, No. 2, 2013, pp. 743–748.

2.VanStaveren, H. J.: "Construction, quality assurance and calibration of spherical isotropic fibre optic light diffusers." Vol 10, No 2, 2013, pp. 137-147.

3.van Veen, R. L. P., et al.: "In situ light dosimetry during photodynamic therapy of Barrett's esophagus with 5-aminolevulinic acid." Lasers Surg. Med., Vol 31, No 5, 2013, pp. 299-304.

Ёруғлик манбалари ва нур ўтказгичлар.

ФДТ учун ёруғликнинг лазер ва нолазер манбаларидан фойдаланиш хақида Brancalon ва Moseley маълумотларида келтириб ўтилган. ФДТ учун лазер манбалар фотосенсибилизатор ютилишига мувофиқ келувчи маълум тўлқин узунликларини юзага келтиради. ФДТ учун клиник амалиётда аргонли ва бўёкли лазерларни қўллай бошлишди. Мазкур лазерлар ёруғлик спектрини созлашга имкон яратади. Нурланиш тўлқин узунлигининг ўзгартириш имконияти ушбу тип лазерларнинг асосий афзаллиги хисобланади, яъни ягона қурилманинг ўзи кўпгина фотосенсибилизаторлардан фойдаланиш имконини беради. Тўқима ичи ёки бўшлиқли ФДТнинг самарадорлиги кўпинча, лазер нурларининг кичик диаметрли нур ўтказгичдан ўтиш имкониятига асосланган.

Яrim ўтказгичли диод лазерларнинг яратилиши қайта созланувчи лазерларнинг клиник аҳамиятини сезиларли тарзда пасайтирди. Хозирги кунда яrim ўтказгичли лазерлардан фойдаланиш нисбатан арzonлиги, электроэнергияга бўлган талабнинг камлиги (15 -25A), суюлиқда совиш ва қўлланилишдаги соддалиқ, уларнинг нурланишини фотосенсибилизатор адсорбциясига созлаш имкониятининг мавжудлигига қўра анчагина афзал хисобланади. Замонавий юқори энергияли, 650нмдан юқори диод нурлантригичли лазерлар таннархи билан бирга тахминан 1000\$/ ватт оптик кучланишини ташкил қиласи (диод драйвер ва совитувчи системани уламагандан). Кийматнинг бундай пасайиши кўп каналли, компакт лазер системани пайдо бўлишига олиб келди (Ceramoptic, VGen). ФДТ учун диод лазерлар ALGaIn\GaAs (635-700 нм) ёки ALLnGaAsP\GaAs (780-1000 нм)га асосланган. Иккаласи хам 800 ± 5 нм тўлқин узунлигигача стандарт толерант авж нуқтани беради. Диод лазерли ФДТ ўтказиши учун юқори энергия зарурдир, 250нмдан кичик диаметрли нур ўтказгичлардан нурланиш ўтказилганда бунга эришиш мумкин. Айни пайтда, ФДТнинг тижоратда мавжуд ускуналари 500 нм диаметрли нур ўтказгичлар учун универсал қоннекторлар билан таъминланган.^{1,2}.

-
1. Wang, L. H., Jacques, S. L., and Zheng, L. Q.: "Mcml—Monte-Carlo Modeling of Light Transport in Multilayered Tissues." *Comput. Meth. Programs Biomed.*, Vol 47, No 2, 2015, pp. 131-146.
 2. Weersink, R. A., et al.: "Techniques for delivery and monitoring of TOOKAD (WST09)-mediated photodynamic therapy of the prostate: Clinical experience and practicalities." *J. Photochem. Photobiol. B-Biol.*, Vol 79, No 3, 2015, pp. 211-222.

Диод лазердан фойдаланилганда нурланишнинг тўлқин узунлиги ҳароратга боғлиқ эканлигини хисобга олиш зарур. Шундан келиб чиқкан холда, силжиш асосий материалга боғлиқ бўлади, одатда қизил диод учун

0,18 нм\С⁰, 800 нмдан паст инфрақизил нурлантиргич учун эса 0,28нм\С⁰. Рухсат этилган тиббий лазерлар нурлантирувчи диоднинг ҳароратини назорат қилиш билан нурланишнинг толерант тўлқин узунлигига эга бўлади.

Диод лазерлар ҳарорат таъсирини тез-тез оширилиши нурлантиргичнинг таъсир муддатини икки баробарга қисқартириши мумкин. (масалан: нурлантиргичнинг хона ҳароратидан 10 С⁰га ортиши хам етарли хисобланади).

Кўп холларда ёруғлик диодлардан фойдаланишда янада мукаммали - альтернатив лазерлар хисобланади. Улар асосан юза заарланишлари мавжуд кўпгина bemorlarни бир пайтда даволаш ва ambulator ФДТ ўтказиш имконини беради. ФДТ учун қурилмаларни ишлаб чиқарувчи бир қанча тижорат корхоналари мавжуд(Omnilux light Therapy, StockerYale Inc., Light Science oncology, Biospec, Photocure).

Яrimўтказгичли лазерлар асосан тери ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватларининг малигнизацияланган ва малигнизацияланмаган касалликларини даволаш учун фойдаланилган. Малигнизация холатида қалинлиги <3мм ўсмалар 30-100мВт\см² атрофидаги нурланиш қўлланилувчи ФДТга берилувчан бўлади. Диод лазерларда фақатгина 20% электр энергия оптик энергияга айланади, шу сабабдан ёруғлик кучланиши кам холларда 100мВт\см²дан ортиғига эришади. Бунда нурланиш давомийлиги 2 соат ва ундан кўпроққа чўзилиши мумкин.

ТЎҚИМАЛАРНИ КИСЛОРОД БИЛАН ТАЪМИНЛАНГАНЛИГИ

ФДТ асосида ФСнинг синглет кислород ишлаб чиқариш хусусияти ётади. Бу жараён тўқималарнинг кислород билан етарлича таъминланганидагина бўлиши мумкин. Акс холда, ФДТ самараси умуман кузатилмаслиги ёки етарлича самарали бўлмаслиги мумкин. Ўсмаларни даволашда ишлатиладиган кўпгина ФС патологик тўқимани нобуд қилиш учун кўп миқдорда кислородни талаб қиласди.^{1,2}

-
1. Waidelich, R., et al., "Early clinical experience with 5-aminolevulinic acid for the photodynamic therapy of upper tract urothelial tumors," J Urol, Vol. 159, 2013, pp. 401–404.
 2. Wainwright, M., et al., "Photobactericidal activity of phenothiazinium dyes against methicillin-resistant strains of *Staphylococcus aureus*," FEMS Microbiol Lett, Vol. 160, 2013, pp. 177–181.

Биологик тўқимани нурлантириш тажрибасида тўқиманинг кислород билан тўйинганлигини аниқлаш ёки микроциркуляцияни баҳолаш учун маҳсус асбоблардан фойдаланиш мумкин бўлади.

ФОТОДИНАМИК РЕАКЦИЯНИНГ ДАВОМИЙЛИГИ

Фотодинамик самара ёруғлик нурланиши билан тўқималарни нурлантириш бошлангандан сўнг дархол юзага кела бошлайди. Бунда ёруғлик билан алоқага киришган ФС инактивлашади - фотобличинг самара пайдо бўлади. Шунинг учун даво муолажасигача ёруғлик таъсирига берилмайдиган ёки сақлаш жараёнида ўз фаоллигини йўқотмайдиган ФСни қўллаш жуда мухимдир. Фотодинамик самара секундлар улуши давомида кечади, агар ёруғлик таъсири тўхтатиладиган бўлса ўша захотиёқ тугайди.

ФДТ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Фотодинамик самара деярли ташки белгиларсиз кечганлиги, хужайранинг ўлимини эса фақатгина узоқ вақтли қузатувдан кейингина аниқлаш мумкинлиги сабабли фотодинамик реакцияни баҳолашнинг бевосита ва билвосита усуслари мавжуд.

Синглет кислород – бу фотодинамик реакциянинг асосий ва энг фаол таъсири кўрсатувчи бошланғич бўғинидир. Синглет кислороднинг хаётый муддати жуда қисқа ва уни оддий кимёвий реакцияларда пайқашнинг имкони йўқ. Ажралиб чиқаётган синглет кислородни миқдорий баҳоловчи маҳсус усуслар мавжуд¹. Усулдан асосан *in vitro* тажрибалардаги изланишларда фойдаланилада ва синглет кислороднинг мавжудлик даражаси, реакциянинг ифодаланганини хамда оксидловчи радикаллар аниқланади. Синглет кислороднинг маҳсус флуоресценциясига кўра аниқловчи бошқа усуслар хам мавжуд, лекин улар кўп машақват талаб қиласи ва тиббий текширувларда кам қўлланилади.^{1,2}.

-
1. Wiegell S. R, and Wulf, H. C. "Photodynamic therapy of acne vulgaris using methyl aminolaevulinate: a blinded, randomized, controlled trial." *Br J Dermatol*, Vol 154, 2016, 969–976.
 2. Wilder-Smith, C. H., et al., "Photoeradication of Helicobacter pylori using 5-aminolevulinic acid: preliminary human studies," *Lasers Surg Med*, Vol. 31, 2012, pp. 18–22.

Цитотоксик самарани лахзали баҳолаш

Фотодинамик реакция патологик хужайрани нобуд бўлишига эришишга қаратилганлигини хисобга олганда, ФДТ таъсирини баҳолаш

учун унинг самарасини эрта аниқлаш жуда мухим ҳисобланади. Хозирги даврда шикастланиш оқибатида нурланиши тўхтовчи маҳсус люминесценцияланувчи микроорганизмлар ва хужайралардан фойдаланилади. Хужайра люминесценциясининг пасайиш даражасига кўра ФДТ самарадорлигини тез фурсатда микдорий аниқлаш мумкин.

ФДТни баҳолаш учун моделлар

ФДТ жараёнига таъсир эта оловчи кўпгина омиллар, шунингдек ўтказилаётган текширувларнинг қимматлиги тажрибалар учун адекват моделларни танлаш заруратини туғдиради. Айни пайтда дунёning кўпгина лабараторияларида ФДТ учун асосан текширувларнинг 2 тури : *in vitro* ва *in vivo*дан фойдаланилмоқда. Изланишлар ФДТ вазифаларини хисобга олиб, одатда табиий биологик тўқимага яқин суюқ мухитда ўтказилади. Текширувлар тери орқали ёруғлик нурланишини яхшироқ етказиб бериш учун яратилган маҳсус, тукли қоплами ривожланмаган тажриба сичқонларида олиб борилади.

Тез қўпаювчи хужайраларга нисбатан фотодинамик реакциянинг мукаммаллигини хисобга олиб, биз томондан (Р.А.Садыков ва хаммуаллифлари, 2010 й) *in vitro* шароитида антимикроб таъсир учун модел таклиф этилди. Модел асосида патоген микробларнинг ўсишини тўхтатувчи турли микдордаги ФС хусусиятлари ётади(Садыков Р.А., Баженов Л.Г., Касымова К.Р. 2011).

Антимикроб ФДТни баҳолаш модели

Тажрибалар *in vitro* шароитида, Мюллера-Хинтона мухитида ўтказилди (“HiMedia”, Индия). Бунда фотосенсибилизатор сифатида 0,001%, 0,005%, 0,01% ва 0,05% микдордаги метилен кўкининг (МК) сувдаги эритмаларидан фойдаланилди.

Тажриба қўйидаги тарзда бажарилди: озиқ мухитли Петри косачасига К. Pneumoniaенинг суткалик тест-культураси газон усулида экилди, кейин эса газон юзасига МК эритмаси томчиси сингдирилди, 10дақиқали экспозициядан сўнг, микроорганизмлар билан МК алоқага киришган соҳа

қызил нурда нурлантирилди (1,5 ва 10 мин). Нурлантиргичдан озиқ мухит юзасигача бўлган масофа 2,5 смни ташкил қилди. Сўнгра экмалар 18-24 соатга 37° С ли термостатга жойлаштирилди. Натижаларни баҳолаш тестштамм соҳасида ўсган микробларнинг мавжудлиги ёки йўқлигини аниқлаш йўли билан амалга оширилди. Барча тажрибалар 5 маротаба такроран бажарилди.

Назорат саволлари:

1. Фотодинамик терапия тугрисида тушунча.
2. ФДТ асосий омиллари?
3. Фотосенсибилизатор бу нима?
4. Қуёш нури ва унинг спекторлари?
5. Нурланишнинг қуввати ва уни аниқлаш?
6. Қуёш нурини дозаси?
7. Нуцрланишнинг қувват зичлигининг аҳамияти нимада?
8. Қандай ускуналар ФДТ учун қўлланилади?
9. ФДТ натижалари?
- 10.ФДТ имкониятлари?
- 11.Табиий фотосенсибилизаторлар қандай?
- 12.Қандай дорилар фотосенсибилизатор хисобланади?
- 13.ФДТ усулни онкологик касалликларда қўллашимкониятлари қандай?
- 14.ФДТ усулни микробларга қўллашимкониятлари?
- 15.ФДТ усулни хирургияда қўллашимкониятлари?
- 16.ФДТ усулининг асоратлари?
- 17.Кам қувватли лазерлар бу нима?
- 18.Кам қувватли лазерлар имкониятлари қандай?
- 19.Диод нурлантирувчи ускуналар?
- 20.Ярим ўтказувчи лазерлар қандай?
- 21.Ўзбекистонда ФДТ усулини ривожланиши?
- 22.Ўзбекистонда яратилган лазер ускуналар қандай?
- 23.Фотосенсибилизаторлар турлари?
- 24.ФДТ усулини қўллаш асослари?

Фойдаланилган гана дабиётлар:

1. Sigusch, B. W., et al., “Efficacy of photodynamic therapy on inflammatory signs and two selected periodontopathogenic species in a beagle dog model,” J Periodontol, Vol. 76, 2015, pp. 1100–1105.
2. Singh, G., et al., “Mitochondrial photosensitization by Photofrin II,” Photochem.Photo Biol., Vol. 46, 2015, pp. 645–649.
3. Skovsen, E., et al., “Lifetime and Diffusion of Singlet Oxygen in a Cell,” J. Phys. Chem. B, Vol. 109, 2014, pp. 8570–8573.
4. Sohl, S., Kauer, F., Paasch, U., and Simon, J. C. “Photodynamic treatment of cutaneous leishmaniasis.” J Dtsch Dermatol Ges, Vol 5, 2013, 128–130.
5. Soukos, N. S., et al., “Targeted antimicrobial photochemotherapy,” Antimicrob

Agents Chemother, Vol. 42, 2013, pp. 2595–2601.

6. Star, W., M. (2014). "Diffusion Theory of Light Transport." Optical-thermal response of laser-irradiated tissue, A. J. Welsh and M. J. C. van Gemeert, eds., Plenum, New York, pp.131-205.
7. Star, W. M.: "The Relationship between Integrating Sphere and Diffusion-Theory Calculations of Fluence Rate at the Wall of a Spherical Cavity." *Phys. Med. Biol.*, Vol 40, No 1, 2014, pp. 1-8.
8. Stefflova, K., et al., "Targeted photodynamic therapy agent with built-in apoptosis sensor for in vivo near-infrared imaging of tumor apoptosis triggered by its photosensitization in situ," *Mol Imag*, Vol. 5, 2014, pp. 520–532.

3 мавзу: Эндоваскуляр даволаш усуллари.

Режа:

1. Эндоваскуляр даволаш усуллари.
2. Асоратлар.
3. Самарадорлиги.

Таянч иборалар: транспланталогия, юрак касаллуклари, жигар циррози, қон томир патологияси, муаммолар, хирургия, иммунология, қон томир системаси.

3.1 Эндоваскуляр даволаш усуллари.

Дунёда тиббиёт пайдо бўлибтики хозиргача бирон бир замон йўқки инсонни ташки қиёфасини ўзгартиришга қаратилган реконструктив амалиётлар билан шуғулланмаган бўлса. Мисрда (милоддан аввал 1600) йилларда "Папирус" ихтиро этилган вақтлардан бошлаб, хирурглар ўз амалиётларини эстетик нуқтаи назардан такомиллаштиришга интилиб ишлаган эканлар. Милоддан авалги тиббиёт амалиёти билан шуғулланган табибларни табобатлари ҳақида папирусларда ёзилишича хирургик амалиётлар 3000 йил милоддан аввал бошланган экан. Албатда бу катта давр ичida тиббиётни эстетик йўналишида қилинган амалиётлар, янгиликлар, таълимотлар, ихтиrolар, хатоликларни хозирги замон плактик хирургиясини қад қўтаришига тамал тошини аллақачон қўйиб бўлган эканлар.^{1,2}

1 Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015.
[PMID: 15820460]

3. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

Милоддан аваллаги 800 йилларда Ҳиндистонда нұқсонли бурунларни трансплантология хирургик усуллар билан пешона ёки лунж терисидан трансплантат олиб амалиётлар үтказғанликлари ҳақида папирузларда ёзилған маълумотларда ёзиб қолдирилған.¹ 1794 йили инглизларни мустамлакаилик күшини Ҳиндистонга келиб ўрнашған давларда, инглиз хирурглари томонидан ёзиб қолдириған маълумотларга қараганда, ҳаттоқи ўша даврда Ҳиндистон хирурглари томонидан амалга оширилған реконструктив-транплантация операциялари маромига етказиб қилинған экан, айнан бурунни реконструктив операциясига пешона терисидан оёқдаги тери трансплантат қўлланилғанлигини таъкидлаб үтганлар, шунинг учун ўтмишдаги хинд трансплантология хирурглари трансплантология хирургия тарихида энг тахсинга сазоворли табиблар қаторида эъзозланади. Улар томонидан туғма нұқсонли, жангларда жароҳатлар туфайли, ёки суд ҳукмига билан эстетик кўринишини йўқотған бурун, қулоқ ва лаб каби аъзоларни трансплантология хирургик усуллар билан ўзини олдинги шаклини қайта тиклаш каби реконструктив амалиётларни мохирона амалда бажарғанликлари аниқ мисоллар билан келтирилған. Бу соҳада шарқ хирургияси оврупа хирургиясини то XVIII чи асрларга қадар ортда қолдириб пешқадамлик қилған. Айнан ўша давларда оврупа хирурглари трансплантология хирургия маҳоратларини хинд хирургларидан ўрганишга ўзларини камситиш деб билмаганлар, чунки хиндлар инглизларга мустамлака бўлған миллат эдида. Забардаст олим-индолог Артур Бэшем «Ҳиндистон мўъжиза ва кароматлар юрти» деган китобида келтирилған далиллардан. Инглиз хирурги Джозеф Карпюхинд хирургларидан трансплантология хирургияни ўрганиб 20 йилдан кейинги 1814 йили ринотрансплантология амалиётини бажарган экан.¹

Милоддан аввалги V асрларда яшаб үтган Хитойлик табиб Бянь Цюе ни бизгача сақлаб келинганд қўлёзмаларида ёзилиши бўйича ўша давларда ҳам кўз ва қулоқда хирургик операциялар үтказилған экан.¹

Милоднинг 150-208 йилларида яшаб үтган Хитойлик табиб Хуа То ҳам ўша давларда амалга оширилған трансплантология операциялар ҳақида, айнан трансплантология операциялар баёнини батафсил ёзиб қолдириған маълумотлари бизгача етиб келган.

¹ Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]

2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

Бундан ташқари бир нечта Хитойлик табибларни бизгача етиб келган қўллэзмаларида ёзилишича тугма нуқсон қуён лаб билан туғилган чақалоқларни трансплантология операция йўли билан тўғирланган эканлар, бундан ташқари аёллар қоматини ва ташқи кўринишини чиройли қилишда трансплантология хирургия усуллари билан амалга оширилган экан.²

“Табиий тарих” номли асар муаллифи Римлик ёзувчи Плиний Катта (милоднинг 79 йилларида туғилган) нинг бизгача етиб келган бу асарида ёзадиги Луция Аpron деган қайсиудур давлатни расмий вакили ўғлини

“Семизликни” бартараф қилиш (бу трансплантология операцияни замонавий атамаси липосакция дейилади) трансплантология операция амалда бажарилганлиги ҳақида маълумот берган. Ўша даврларни трансплантология хирурглари жуда кўп жангур-жадалларда ташқи қиёфаси жароҳатлар туфайли мажруҳланган bemorlarни трансплантология хирургия усуллари билан даволаган эканлар, яъни ҳеч ким ўйламаган ташқи кўринишини гўзаллаштиришда трансплантология операция усуллари билан амалга ошириш мумкинлигини исботлаб берганлар.^{6.7}

Хиндистон хирургиясининг нуфӯзи XVII асрларгача дунёда етакчилик қилиб келганлиги тарихдан аён эди. Бу давр ичida Оврупа хирурглари томонидан онда-сонда бундай амалиётлар ўтказилиб турилган.

Милодни VII асрларида Александриялик хирург Паулос Айджинскийтомонидан, эркакларда катталашган кўкрак бези (замонавий номи гинекомастия) ни кичрайтириш амалиётларини операцияларини амалга оширган. Ҳозирги замон трансплантология хирурглари томонидан ўта семизлашиб кетган bemorlarни ўз хоҳиши билан липосакция операциясини кўллашади. Аммо ўтган замон хирурглари ёзиг қолдирган адабиётларда ёзилишича бу каби амалиётлар ўша давр хирурглари томонидан милоднинг биринчи асрларида ёқ бажарилиб бўлинган экан.^{1,2}

Уйғониш – ренессанс даврида трансплантология хирургияни, мустақил тиббиёт фани сифатида тан олиниб, унга “Гўзаллаштириш хирургияси” деган ном ҳам берилган. 1597 йилда ёзилган ва бизгача етиб келган италиялик Гаспара Тальякоццимуаллифлигига чоп этилган тиббий асарда ёзилишича, жароҳатланиб шаклини йўқотган бурунларни билакни юмшоқ тўқималаридан олинган трансплантат билан қайта аввалги шаклига қайтарган экан. Тальякоцци трансплантология хирургия соҳасида шахсан ўзини оператив усулини ишлаб чиққан ва шу усуллар билан шаклини йўқотган бурунларни моҳирона аввалги шаклига қайтарган. Бу қилган хизматлари учун ҳозирги замон хирурглари Тальякоцчини трансплантология хирургияни асосчиси деган унвон билан тақдирлаганлар.

Тальякоцци зарур бўлган трансплантатни билакни ички-медиал сатҳидан олган. Бу операцияни охирги босқичида беморни қўли бурнига 20 кунга маҳкам қилиб боғлам билан боғлаб қўйилган. 1597 йилда Тальякоцци тасвиirlар билан бойитилган асарида, ёзадики “Биз табиат берган тана қисмларини даволаймиз ва тиклаймиз, қачонки тақдир тақозоси билан фалокатлат туфайли тананинг бирон қисмидан маҳрум бўлган бўлса. Биз қилинган трансплантология операциялар хўжа кўрсинга эмас, балки жисмонан ва руҳан шикастланган bemорларга нажот бериш билан биргаликда уларни руҳан титиклашга ҳам қаратилган.” Католиклар черкови руҳонийлари заҳм билан касалланган, айнан шу касалликда учрайдиган бурун, лаб ва танани бошқа жойларида учрайдиган тўқималар емирилиши ҳолати кузатилган bemорларни реконструктив операциялар билан даволашга қатъян қарши чиқиб, бу худо олдида гуноҳи азим саналади деган қарашлари билан Тальякоцциусулини ривожланишига тўсқинлик қилганлар, бу эса сўнги икки аср давомида трансплантология хирургияни ривожланишидан буткул тўхтатиб қўйган. У ўзини трансплантология хирургияга тадбиқ этган шахсий усулинни, тиббиётга тадбиқ этилишини кўрмай вафот этган. Уни жасадини эса католиклар черкови руҳонийларини фатвоси билан, жиноятчи ва ўз жонига қасд қилган гуноҳкор banda сифатида чўлга дафн этишга мажбур қилишган. Тальякоццини ихтиrolари эса адабий уйдирма деб ҳисоблаганлар.

XIX асрни бошларида антисептика ва оғриқсизлантириш усуллари тиббиётга тадбиқ қила бошлаган даврдан бошлаб трансплантология хирургияни ривожланишига қайта туртки бўлди. Диққатга сазоворлиги шундаки XX аср бошларида трансплантология хирурглар ёрдамига фақат эркаклар мурожаат қилишган экан, кейинчалик эса аёллар хам мурожаат қила бошлаган эканлар.

1 Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]

2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

1899 йили Говард А. Балтиморлик Келлилар томонидан илк бор, қорни тери ости ёғ ҳисобига осилиб қолган вазни 129 кг ли аёл қорнидан 6 кг ёғ кесиб олиб ташланган, (3 йил олдин шу аёлни ўзида ўта катталашиб осилиб қолган сут безидан Балтиморлик хирург Дж. У. Чамберс иккала сут безидан 11 кг ёғ кесиб олиб ташланган экан). XX асрни 70-чи йилларида ёғ босган қоринда трансплантология операциялар фақат Келли усули билан бажарилган бўлиб, қорин териси ҳам ёғ билан бирга кесиб олиб ташланган. Аммо операция қилинган жароҳат соҳасида хунук чандиқлар пайдо бўлган, кейинчалик чандиқлар тагида янги ёғ қатлами йифила бошлаган.

Замонавий трансплантология хирургияга XIX асрни бошларида ёқ асос солинган бўлиб, бу соҳа кундан-кунга ривожланиб, давлат томонидан зарур бўлган моддий ва руҳонийлар томонидан маънавий ёрдам бериша бошлагани сабабли, хирурглар томонидан янги-янги маҳсус асбоб-анжомлар ҳамда янги-янги трансплантология операция усулларини ихтиро қилишиб, инсонларни оператив йўл билан ташқи қиёфасини гўзаллаштириш усулларини такомиллаштиришга катта ҳисса қўшмоқдалар.^{1,2}

Охирги 50 йил ичида хирургиянинг энг оғир ва машақатли соҳаларидан бири трансплантология ва реконструктив хирургияда бутун дунё хирурглари томонидан жуда кўп ишлар қилинаётганини гувоҳи бўлиб турибмиз. Жуда қисқа тарихий муддат ичида трансплантология ва реконструктив хирургияни ривожлантириш учун дунё олимлари томонидан тахсинга сазоворли оламшумул янгиликлартадбиқ қилинганлиги айни ҳақиқатdir: буларга дерматом тери лахтагини кўчириб ўтказишдан то бир вақтни ўзида бир нечта қон томир билан таъминланган тўқима трансплантатларини кўчириб ўтказиш; теридаги нуқсонларни оддий бекитишдан организм тизимларида жуда мушкил реконструктив кинематик йўналишда ишлар қилинган.

3.2 Асоратлар

Юқорида келтирилган мисолларни жадал ривожланишининг энг асосий сабаби бу икки омил: яъни операцион микроскопларни яратилиши, маҳсус микрохирургик асбоблар ва тикув илларини яратилиши билан боғлиқdir. Хирургик микроскоплар ва микрохирургик қурилма, тикув илларини трансплантология хирургия амалиётида қўллаш микрохирургик техникани ва уни самарасини оширишга, трансплантология хирургияни дунё миқёсида жадал ривожланишига энг асосий сабабчилардан эканлиги айни ҳақиқатdir²

1 Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2005.
[PMID: 15820460]

Хозирги замон хирурглари томонидан прецизион ажратиш ва иккита айрим-айрим аъзо ва тўқималарни бирлаштириш, ҳаттоқи ўлчамлари миллиметрдан ўн баробар кичик бўлган тўқималарни ажратиш ва бирлаштириш каби мураккаб операцияларни амалда бажариш учун замин яратилди.

Кўриниб турибдики хирургик амалиётлар қаторига янги йўналиш, яъни трансплантология хирургик операциялар турлари барпо бўлди, буларни ичидан энг тахсинга сазоворли турларидан қон билан таъминлаганлиги сақланган ҳолда тўқималарни комплекс эркин ҳолда кўчириб ўтказиш жой олади. XIX асрни 60 чи йиллари охирларида транспланталогия соҳасида амалга оширилган амалиётлар мисолида оёқ бармоғини қўлга кафтига, катта чарвини трансплантацияси, тери-фасциал лоскутлар, мушаклар ва сужкларни кўчириб ўтказиш мисол бўла олади. Хозирги замон трансплантология хирургияси ва транспланталогиясида қон томир билан таъминланган аутотрансплантатларни кенг қўлланиланилиши 60 чи йилларга нисбатан анча кўп ва қундан-кун мунтазам ўсиб бормоқда. Бундан ташқари бир вақтлар бир неча босқичли трансплантология амалиётлардан воз кечиб бир босқичли амалиётлар тадбиқ қилиниши трансплантология ва реконструктив хирургиянинг янги асли бошланганлигидан далолат беради.

Бироқ трансплантология хирургиянинг ривожланишида иккинчи омил-инсон, яъни ўз қасбини мутаассиби, истеъдодли, забардаст ҳамда инсоний хусусиятларни барчасини ўзида мужассамлаштирган оқ ҳалат сохиби бўлмас эди трансплантология ва реконструктив хирургия йўналишида юксак чўққиларни забт этишни иложи имконияти ҳам бўлмас эди.

Маълум вақт ўтиши билан дунё олимларининг трансплантология хирургияга қизиқиши бир тўхтамга келиниб, трансплантология хирургия соҳаси яхлит бир фан сифатда шаклланди ва бу йўналиш мавҳумлигини йўқотиб, ўз олдига қўйилган муайян режали, ҳамда аниқ натижага эриша оладиган, камчиликларини буткул бартараф қила оладиган ва ғояларини амалиётга тадбиқ эта оладиган бир фан сифатда хирургия соҳасида ўз ўрнини топди.

1 Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]

2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

Азал-азалдан устозлар ўгитларидан маълумки, қаерда иш қизғин бўлса албатта камчилик бўлади деган улуг сўзлар трансплантология хирургияни хам четлаб ўтмади, яъни микрохирургик амалиётлар ўта мураккаб техник қийинчиликларга ва жуда кўп бошқа муаммоларга дуч келди, омадсизлик, хатоликлар хам кам бўлмади, аммо трансплантология хирургияни даставал қўллаган усуллари (уларни анъанавий усул деб аташган) ўзини қийматини йўқотмай, балки замонавийлашган, фан техника ривожланиши билан боғлиқ муваффақиятларга бардош бериб келмоқда. Бундан ташқари одам анатомиясини микрохирургик текширувлариға мажбур қилишга, ҳар хил трансплантатларни юқори савия билан маромига етказиб олишга имкон яратди.

3.3 Самарадорлиги

Хитой хирурглари томонидан кашфиёт қилинган оролчали уйғун бирлик ташкил этган тўқималарни алоҳида периферик томирлари билан қўчириб ўтказиш амалиётлари, трансплантология хирургияни янги босқичига олиб чиқди. Вақт ўтиши билан бу усул аутотрансплантация соҳасига нисбатан кам техник қийинчиликларсиз ва микротомир анастомозларни фаолиятини яхшилашда учрайдиган муаммоларни йўқлигига асосланиб бу усул муқобиллигини исботлади.

Охирги йилларда бу икки янги хирургик йўналишни замон талабига жавоб берадиган даражада ўта ривожланганлиги туфайли қўл ва оёқ хирургиясини ривожланишига хам замон талабига жавоб берадиган даражада катта ҳисса қўшди, бу эса хозирги замон техникаларини кўпайиб бориши билан бир қаторда қўл ва оёқни жуда кўп жароҳатланиши кузатилаётган бир замонда қанча-қанча касб сохибларини, травматик ўзилган кафт-бармоқларни, жароҳатланган томир ва нервларни замонавийлашган микрохирургик усулларни қўллаб уларни қайта ўз касбини давом этишда жамиятга моддий ва маънавий ёрдам бермоқда.

Шундай қилиб бугунги замон трансплантология хирургияси тўқималар нуқсонини бартараф қилишда серқирра бой малакавий хазинага эгадур. Бу соҳани нуфӯзини ошиб боришига изоҳ бериб айтиш мумкинки микрохирургик трансплантология амалиётлар ўта мураккаблигига қарамай, қилинаётган барча амалиётлар юқори даражадаги самарадорлиги билан обрў топмоқда.

Ўзбекистонда биринчи маротаба буйрак трансплантацияси операцияси амалга оширилганлиги хақида В.Вахидов номидаги ихтисослаштирилган республика жарроҳлик маркази директори Ф.Назиров ИА REGNUM журналистлариға маълумот берди.Хозирда қўпчилик ривожланган

давлатларда айрим касалликларни даволашда тўқима ва аъзолар трансплантияси яхши йўлга қўйилган.

Бундай ривожланган давлатлардан малака ошириб келган мутахасисларимиз ушбу марказда биринчи марта буйрак трансплантия операциясини амалга оширишди. Бу давлатимиз тамонидан ўрганиб чиқилди ва яқин қариндошлар тамонидан bemor хаётини сақлаб қолиш мақсадида йўлга қўйилган трансплантаология соҳасидаги қадамлардан бири хисобланади. 2010 йил марказда ўтказилган ilk буйрак трансплантияси операциясидан кейинги кузатишлар яхши натижа берди ва асоратсиз кечди. Марказда 2006 йил битта жигарли сиам эгизаклари Камилджановларни хам ажратиш операцияси асоратсиз амалга оширилди.

Хозирги вақтда марказда юрак трансплантияси бўйича хам катта илмий илмий тадқикот ишлари олиб борилмоқда.

Назорат саволлар:

1. Трансплантология хақидаги қандай янгиликларни биласиз? Мисоллар асосида келтирсангиз?
2. Трансплантологияга рухсат берилган давлатлар ва қандай аъзолар трансплантларини биласиз? Мисоллар билан тушунтириб берсангиз?
3. Трансплантология хақидаги қандай янгиликларни биласиз? Мисоллар асосида келтирсангиз?
4. Трансплантологияга рухсат берилган давлатлар ва қандай аъзолар трансплантларини биласиз? Мисоллар билан тушунтириб берсангиз?
5. Ўзак хужайраларини хозирги кундаги муаммолари ва унинг қандай ютуқларини биласиз? Бу борада қилинган ишлардан мисоллар келтира оласизми?
6. Ўқувчини педагогик ва ўқувчилар жамоаси орқали тарбиялаш деганда нимани тушунасиз? Иш фаолиятингиздан келиб чиқиб, мисоллар келтира оласизми?
7. Ўзак хужайра деганда нимани тушунасиз?
8. Ўзак хужайраларни кўчириб ўтказиш бўйича Ўзбекистонда қандай ишлар олиб борилмоқда?
9. Жигар ортотопик трансплантияси ким тамондан биринчи бажарилган?
10. Ўзак хужайраларни қайси тўқимадан олиб ўтказиш мумкин?
11. Буйрак трансплантияси биринчи марта каерда амалга оширилган?
12. Трансплантология билан қайси йуналиш мутахасислари шуғуллана олади?

13. Қандай холатларда ўлган одам аъзоларини кучириб ўтказиш мумкин?
14. Жигар трансплантиациясида цитолиз қандай лаборатор кўрсаткичлари ўзгариши билан кечади?
15. Донор органини қонсервация қилишда қайси эритма ишлатилмайди?
16. Қайси холларда ўликнинг буйраги донор бўла олмайди?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.
3. The critical pathway for deceased donation: reportable uniformity in approach to deceased donation / B. Domingues<Gil, F. L. Delmonico, F. A. M. Shaheen [et al.] // Transplant. International.-2010. — № 4. — Р. 373–378.

4 - мавзу:Юқориқувватли лазерларни хирургияда қўллаш ва афзаллиги.

Режа:

- 1 Юқориқувватли лазерлар тугрисида тушунча. Хирургияда замонавий лазерларни даволашда қўллаш.
- 2 Лазерлар ёрдамида даволаш устида Ўзбекистонда олиб борилаётган ишлар.

Таянч иборалар: лазер, нур, тулкин узунлиги, қувват, лазер энергияси, хирургия.

4.1 Юқориқувватли лазерлар.

Лазерлар замонавий тиббиётнинг истиқболли ва ривожланаётган йўналишларидан бири хисобланади, янги ускуна ва

фотосенсибилизаторларнинг яратилиши эса усулнинг қўллаш жабхаларини кенгайтириб юборди. Ривожланган мамлакатларда (АҚШ, Германия, Буюк британия, Голландия, Италия, Япония ва б.қа.) Лазерлар тажрибада текширувлардан ўтказилиб, онкологик ва яллиғланиш касалликларни ташхислаш ва даволаш учун клиник амалиётда кенг жорий этила бошланди. СНГ мамлакатларида айниқса, Россияда Е.Ф.Странадко ва унинг хаммуаллифларининг (1991) тадқиқот ишлари натижасида бу усул ўз ривожини топди хамда лазер қурилмалар ишлаб чиқарилиши ва самарадор фотосенсибилизаторлар синтезини йўлга қўйишга имкон яратди. СНГ нинг бошқа мамлакатларида эса лазерлар клиник кузатувлар олиб бориш ёхуд тадқиқот ишларини ўтказиш босқичида турибди.^{1,2} Дунё амалиётида лазерлар қурилмалари таркибиغا киравчи лазерлар хамда диод нурлантиргичлар кенг тарқалди. Маълум фотосенсибилизаторлар учун қиймати 10000 дан 300000 АҚШ долларигача бўлган турли хил қурилмалардан фойдаланиш мумкин. Усулнинг кенг тарқалмаганлик сабабларидан бири маҳсус ўлчов–диагностик қурилмалардан иборат ФДТ лаборатория комплексининг катта маблағ талаб қилиши билан боғлиқдир. Замонавий техник имкониятлар фотодинамик терапия учун қурилмалар яратишда нисбатан қиммат бўлмаган ёруғлик диодларидан фойдаланишга йўл очмокда. АҚШ, ЕВРОПА мамлакатлари, ЯПОНИЯ ва РОССИЯда ишлаб чиқарилган лазер учун портатив қурилмаларда эффектив дозани ошириш мақсадида мураккаб технологиялардан фойдаланилади, чунки оддий нурлантиргичлар ёрдамида талаб қилинган кучланиш зичлигига эришилмайди, бу эса bemорда кўп соатли нурланиш заруратини туғдиради.

-
1. Aalders M.C., Sterenborg H.J., Stewart F.A. et al. Journal of Photochemistry & Photobiology. Protodetection with 5-aminolevulinic acid-induced protoporphyrin IX in the rat abdominal cavity: drug-dose-dependent fluorescence kinetics. 2010 Oct; 72: 521—525.
 2. Bonnette P, Heckly GB, Villette S, Fragola A. Chest. Intraoperative Photodynamic Therapy After Pleuropneumonectomy for Malignant Pleural Mesothelioma. 2012; 122 :1866–1867

Хорижий давлатларда ишлаб чиқарилаётган ва фойдаланилаётган замонавий фотосенсибилизаторларни ўрганиш натижасида гематопорфирин хосилалари - хавфли ўсмаларни, хлорин хосилалари- ўсма ва йириングли инфекцияларни, фталацианидлар-ўсмаларни ташхислаш ва даволашда, фенотиазин бўёклари эса инфекцияга қаршилик кўрсатишда самараси юқори эканлиги аниқланди. Юқори даражада ёруғлик заҳри хамда селективликка эга эканлик билан бир қаторда уларнинг организмдан чиқариб юборилиш давомийлиги бир хил эмас. Шу жихатдан организмда синтезланувчи фотосенсибилизатор ўтмишдоши саналган 5-АЛА (аминолевулин кислота) препаратлари устунлик қиласи. Фотосенсибилизатор сифатида баъзи тиббиётда қўлланиловчи маълум антисептик препаратлардан: хлорофиллипт, метилен кўки, фторхинолонлар, тетрациклин қатори антибиотиклари ва б.ка.лардан фойдаланиш мумкин.^{1,2} Лазер технологияларининг жорий этилиши мамлакатимизда ишлаб чиқарилган 600-660нм спектрал диапазонда нурланувчи қурилманинг мавжудлиги ва клиник амалиётда қўллаш мумкин бўлган маълум хамда мавжуд янада самарадор, янги фотосенсибилизаторларнинг яратилиши билан бевосита боғлиқдир. Лазер хавфли ўсмаларнинг бир қанча турларини даволашда нисбатан янги ва истиқболли даволаш усули сифатида ривожланиб бормоқда. Унинг асосида эса препаратнинг фототоксик эффекти (ёруғлик билан ўзаро таъсирга киришганда хужайрага токсик таъсир кўрсатади) ва унинг асосан ўсма тўқимасида тўпланиши ётади.¹

1.Gahlen J., Prosst R.L., Pietschmann M., Haase T. et al. Annals of Surgery. Laparoscopic fluorescence diagnosis for intraabdominal fluorescence targeting of peritoneal carcinosis experimental studies. 2012 Feb; 235(2): 252—260.

Лазер ўсмада тўпланган фотосенсибилизаторнинг ёруғлик таъсирида махаллий фаоллашуви ва кислород иштирокида ўсма хужайраларини нобуд қилувчи фотокимёвий реакцияларни келиб чиқиши билан изохланади. Лазер тез фурсатларда онкологияда ўз ўрнини топди хамда турли босқич ва локализациядаги ўсмаларни, шунингдек ўсма бўлмаган касалликларни даволашда самарадор эканлиги аниқланди. Лазернинг таъсир механизми қуидагича ифодаланади: квант нурини ютган фотосенсибилизатор молекуласи қўзғалган триплет холатига ўтади ва икки хил типдаги фотокимёвий реакцияга киришади. Биринчи тип реакцияда биологик субстрат молекуласи билан бевосита ўзаро таъсир содир бўлади, бунинг натижаси эса эркин радикалларнинг хосил бўлишига олиб келади. Реакциянинг иккинчи типида қўзғалган фотосенсибилизатор билан кислород молекуласининг ўзаро таъсири юзага келади, бу эса биомолекулаларни кучли оксидлаш хусусиятига эга бўлган, тирик хужайрага цитотоксик таъсир кўрсатувчи синглет кислород хосил бўлиши билан кечади.

Қадимги мисрликларнинг ёруғлик ютувчи воситаларни тери касалликларини даволашда қўллаганликларига лазер наъмунаси сифатида қараш мумкин. Маълумки, 6000 йил олдин Қадимги Мисрда тўқималарда фотопреакция чақиравчи ўсимликлардан тайёрланган воситаларда фойдаланилган. Бу препаратлар ёрдамида мохов деб хисобланган, терининг депигментли соҳаларини (витилиго) даволашган. Қуёш нури ёрдамида фаоллашувчи табиий фотосенсибилизаторлар (псораленлар) қўлланилган. Терининг депигмент соҳасига ушбу ўсимликлар кукунидан аппликация ва қуёш нури инсоляция қилингач, тери реакцияси пайдо бўлиб, қуёшдан қорайишга ўхшаш пигментация ривожланган. Бу ўсимлик (*Psoralena corylifolia*) анаэроб фотосенсибилизатор хисобланувчи псорален (фурокумаринлар) тутади. Ўсимлик таркибидағи фурокумарин бирикмалари терини ёруғлик таъсирида сенсибилизацияловчи ва пигментацияланишини тиклашга ёрдам берувчи меланин пигментининг хосил бўлишини қучайтириш хусусиятига эга.

Хозирги кунда аммидан уч фурокумарин аралашмасини (изопимпинеллин, бергаптен, ксантотоксин) тутувчи аммифурин препарати олинмоқда. У витилиго, псориаз, қызил ясси темиратки, нейродермитни даволашда қўлланилмоқда.¹

1897/98й. Мюнхен университети фармакология факультетининг талабаси (директор - проф. Н.Tappeiner) O.Raab-ёруғлик ва бўёқлар таъсирини парамецийларда (Paramecium) ўрганиш натижасида кислородга тобе фотодинамик реакцияни келтириб чиқарди. Бунда акридин бўёғи ёруғликни токсик нурланишга айлантирган. Бундан ташқари, акридин бўёғининг специфик хусусиятларидан бири абсорбция ва флюоресценция хисобланади. Абсорбция ёруғлик токсиклигини кучайтира олмайди, шу сабабли флюоресценция бир хужайраги хайвонларни нобуд қилиш механизмида асосий заарловчи бирлик сифатида баҳоланади. Акридин бўёғига ўхшаш флюоресцентловчи субстратлар ёруғлик энергиясини фаол кимёвий энергияга ("living chemical energy") айлантириб, парамецийни нобуд қиласи. Фотодинамик терапия асосида фаол кимёвий энергия ётади.¹ Усул терининг қатор замбуруғли касалликларини даволашда қўлланилган ва бунинг натижасида маълум клиник самара олинган. 1903 йилда биринчи марта эозин бўёғи билан ёрулик биргаликда таъсир этилганда тери раки муваффақиятли даволанган. Фотодинамикада қўлга киритилган янги билимларга таяниб, 1903-йил Н.Tappeiner ва Н.Jesionek эозиндан фотосенсибилизатор сифатида фойдаланиши ва тери раки мавжуд беморга ФДТнинг биринчи муолажасини ўтказишиди.² Флуоресценция хусусиятига эга табиий бўёқлар - фотосенсибилизатор (ФС) (fon Tappeiner, 1903), усулнинг ўзи эса фотодинамик терапия (fon Tappeiner, 1904) номини олди. Даствор, ушбу атамалар фотосенсибилизатор жалб этилган хамда тирик тўқима (хужайра) ва нурлантириш муолажаси ўтказилган барча жараёнларда кенг қўлланган эди.³ Даствор, ушбу атамалар фотосенсибилизатор жалб этилган хамда тирик тўқима (хужайра) ва нурлантириш муолажаси ўтказилган барча жараёнларда кенг қўлланган эди.³

Кейинчалик (Blum, 1941), фотосенсибилизатор ва фотодинамик терапиятушунчалари хужайрани нобуд қилиш механизми асосида ётувчи, фаол кислород таъсири остида макромолекулалар қўзғалиши рўй берадиган жараёнларни тавсифлаш учун қўлланила бошланди.

4.2 Лазерлар ёрдамида даволаш устида Ўзбекистонда олиб борилаётган ишлар.

Самарага эришиш учун қўлланилган дастлабки қурилмалар чўғланма ёки ёйсимон лампалар бўлиб, улар кенг спектрда оқ нур таратишган. Бу лампалар селективлик қобилиятига эга бўлмаган, нурланиш спектрининг эффектив дозасини аниқлаш имконини яратмаган, кучланиш зичлиги етарлича бўлмаган ва ўсма касалликларини даволашда хар доим хам сезиларли клиник таъсир кўрсатмаган. Лазерлар яратиш соҳасидаги илмий изланишлар нурланишнинг оптик манбаларидан фойдаланишнинг янги истиқболларни белгилаб берди. Уларнинг афзаллиги нурланишни бошқара олиш хамда кириб бориши қийин бўлган биологик объектлар орқали хам ўта олиш хусусиятидадир. Лазернинг асосий таъсири ютилиш спектри ва фотосенсибилизаторлар қўзғалишидан бошланишини хисобга олган холда, даволаш мақсадида турли хил тўлқин узунликдаги лазерлардан фойдаланиш мумкин. Бироқ, клиник амалиётда қўлланиувчи лазерларнинг нархи анча қиммат бўлиб, бундай ускуналардан фойдаланиш эса табиийки, даволаниш қийматини сезиларли тарзда ортишига сабаб бўлади.

-
1. Hahn SM, Smith RP, Friedberg J. Curative Treatment Options in Oncology Photodynamic Therapy for Mesothelioma 2011; 2 :375–383.
 2. Kato H, Furukawa K et al. Lung Cancer. Phase II Clinical Study of Photodynamic Therapy Using Mono-L-aspartyl Chlorin e6 and Diode Laser for Early Superficial Squamous Cell Carcinoma of the Lung. 2013; 42 :103–111.
 3. Kato H, Harada M, Ichinose S, Usuda J, Tsuchida T, Okunaka T. Photodiagnosis & Photodynamic Therapy. Photodynamic Therapy (PDT) of Lung Cancer: Experience of the Tokyo Medical University. 2014; 1 :49–55.

Хозирги пайтда ФДТ учун қуидаги қурилмалар ишлаб чиқарилмоқда:

"Кристал 2000" серияли лазер

Техник тавсиф:

Узлуксиз нурланиш тартиби

Ёруғлик кучланишининг 0 дан 100 мВт гача созлаш

Нурланиш вақтини 1 сек дан 60 мин гача созлаш

Энергия - 220 В, 50 Гц; 110 В, 60 Гц

Талаб этилувчи электрик кучланиш 150 ВА дан юқори эмас

Ўлчамлари 400 x 300 x 260 (мм)

Оғирлиги 4 кг дан ортиқ эмас

ГФ-МОДУЛЬ

Техник тавсифлари:

670 нм тўлқин узунлиқдаги 0,01 ... 1 Вт кучланишдан иборат лазер нурланишли фотодинамик терапия канали

810 ... 1060 нм тўлқин узунлиқдаги 0,1-10 Вт кучланишдан иборат лазер нурланишли термотерапия канали

Нурланишни ўтказиб бериш қобилияти: 3 м, Ø600 мкм узунлиқдаги оптик тола

Тескари боғланиш қонтури 30 ... 50°C диапазондаги 0,2°C аниқлиқда тўқимага берилиган хароратни автоматик тарзда сақлаб туришни таъминлайди.

Ўрнатилган микропроцессор терапия тартибини режали амалга оширишни таъминлайди.

АТО-1-150

Техник тавсифлари:

Нурланишнинг спектрал соҳаси 630 нм ±20 нм (фотогем), 675 нм ± 20 нм (фотосенс)

Биотўқималарда нурланишнинг кучланиш зичлиги 200 мВт/см²гача

Нурланиш зичлигига доғ ўлчами 1 см²гача

Нурланишнинг толали кабельдан етказиб бериш қобилияти

Узлуксиз ишлаш тартиби

Энергия 220 В, 50 Гц, 200 Вт

"Яхрома-2" мис жуфтида лазер пуллагичли бўёқлар асосида қайта ишланган лазернинг физик-техник тавсифлари:

Генерация тартиби - импульсли (частота 10 000 имп./с)

Чиқиш кучланиши - 3 Вт гача

Нурланиш тўлқин узунлиги(Х) - 600-660 нм (бўёққа қараб)

Иш тартибига чиқиш вақти - 60 минут дан кам эмас

Ёруғлик кучланиш дозиметри

Нурланиш вақтини автоматик хисоблаш таймери 50-750 секунд

Кафолатли иш соати - 100 соат (бўёқ алмаштириш хар 2-4-иш соатидан кейин)

Уч фазали токнинг талаб қилувчи кучланиши - 5 кВт

Совутиш - сувли

Совутиш учун сарфланувчи сув - 2-4 л/мин

Оғирлиги - 400кг

"Innova-200" Аргон пуллагичли бўёқда америка лазернинг физик-техник тавсифлари:

Генерация тартиби – узлуксиз

Чиқиш кучланиши - 5 Вт гача

Нурланиш тўлқин узунлиги (Х)- 630 нм

Иш тартибига чиқиш вақти - 5 минут

Ёруғлик кучланиш дозиметри - мавжуд

Нурланиш вақтини автоматик хисоблаш таймери - 1-9999 секунд

Кафолатланган иш соати–1000 соат (бўёқ алмаштириш ишнинг хар 1000 соатидан кейин)

Уч фазали токнинг талаб қилувчи кучланиш - 30 кВт

Совутиш - сувли

Совутиш учун сарфланувчи сув - 9.5 л/мин

Оғирлиги - 250 кг

"МИЛОН-ЛАХТА"ускуналари клиник амалиётда энг кенг тарқалган, мамлакатимизда ва хорижда ишлаб чиқарилган фотосенсибилизаторлардан фойдаланган холда ФДТ ни ўтказишга мўлжалланган.

Ускуналарнинг иккиканалли моделлари ФДТ ва термотерапия усулларини уйғунлаштириш имконини беради.

ТЕХНИК ТАВСИФЛАРИ:

Нурланиш тўлқин узунлиги - (бирканалли) - 635нм, 665нм

Нурланиш тўлқин узунлиги (иккиканалли) - 635/810; 665/810

Нурланиш	чиқиши	кучланиши	:635нм	да	-	1	Вт
665нм	да	-		2,5			Вт
Нишонли	лазернинг	тўлқин	узунлиги	-	532		нм
Нишонли	лазернинг	кучланиши		-	0-1,0		мВт
Экспозиция вақти	-0,01сек-6 с,	узлуксиз					
Паузадаги	импульс	давомийлиги		-	0,01с-1с		
Нур	ўтказувчи	найчанинг	диаметри	-	170-1700мкм		
Энергия /	талаб	қилинувчи	кучланиш	-	220В/100	Вт	
Ўлчамлари	-		200x170x280				мм
Оғирлиги	-	7 кг					

АТКУС-2

Ишчи кўрсаткичлари:

Чиқиши кучланиши 0.1 - 2 Вт

Нурлантириш типи ярим ўтказгичли лазер диодлар

Нурланишнинг тўлқин узунлиги 661 нм

Иш тартиби импульсли ёки узлуксиз

Импульс давомийлиги 0.05 - 10 сек

Экспозиция1 сек - 30 мин

Умумий кўрсаткичлар :

Оғирлиги 14.0 кг

Ўлчамлари 370 - 500 - 170 мм

Совутиш хаволи

Транспорт толасининг диаметри 600 мкм

Ишчи харорат диапазони +10 Сдан, то+30 С

Тармоқ 220 В / 50 Гц

АТКУС-10

Техник тавсифлари :

Ишчи күрсаткичлари:

Нурланиш түлқин узунлиги 0.61 ± 0.03 мкм

Чиқиши күчланишини созланган диапазони 0.0-1.0 Вт

Нурланиш түлқин узунлиги 0.81 ± 0.03 мкм

Чиқиши күчланишини созлаш диапазони 0.1-9.0 Вт

Нурлантиргич типи Ярим ўтказгичли лазер диодлар

Ишлаш тартиби импульсли ёки узлуксиз

Экспозиция 1 сек - 30 мин

Умумий күрсаткичлар : оғирлиги 15.0 кг дан ортиқ эмас

Үлчамлари 370-500-170 мм,

Совутиш – хаволи ,

Транспорт толасининг диаметри 600 мкм,

Ишчи харорат диапазони +10 Сдан то +30 С,

Тармоқ 220 В / 50 Гц

Лазерқурилмалари рўйхати ва қиёсий тавсифи

	Марка	Түлқин узунлиги (нм)	Күчланиш	Күчланиш зичлиги
1.	АТКУС-04	662	0,1-2 Вт	200
2.	ЛАМЕДА	666	0,1-2 Вт	300
3.	ИННОВА-200	630	0,1-2 Вт	100
4.	МЕТЛАЗ	620-680	0,1-2 Вт	100
5.	ПОЛЮС-2	600-670	0,1-2 Вт	100
6.	МИЛОН	660	0,1-2 Вт	100
7.	РАЛАЗ	630	0,1-2 Вт	100
8.	Кристалл 2000	660	3Вт	100

9.	ATO-1-150	630-675	200мВт	200
10.	Модуль- ГФ	670	1Вт	1000
11.	Яхрома -2	600-660	3Вт	1000

Ўсмаларни даволашда имкониятлари

Лазерда фотодеструкция механизми ўсма тўқимасига бевосита фототоксик таъсир ёки ўсма тўқимаси қон томир эндотелийсининг заарланиши ва микротромбози хисобига қон айланишининг бўзилиши билан тушунтирилади. Ўсма парчалангандан сўнг фотодинамик заарланган соҳа чандиқланиш эмас балки регенерация йўли билан тикланади. Шунга кўра, ФДТнинг принципиал фарқи органларнинг мухим тўзилмаларини сақлаб қолган холда, яхши функционал ва косметик натижалар билан таъминлашдадир.

Ўсманинг флуоресцент диагностикаси биологик тўқималарнинг спектрал тахлил усулига асосланади. Усулнинг асосий афзаллиги унинг ноинвазивлиги ва юқори сезгирилигидан бўлиб, гистологик текширувлар билан қиёслаганда 95 % гача бўлган кўрсаткич билан баҳоланади. Тўқималарнинг оптик текширувлардаги яна бир афзаллиги маълумотларни тез фурсатда қайта ишлаш бўлиб, бу эса олинган маълумотларга асосланган холда даволаш тактикасини коррекциялашга имкон яратади. Сўнгги йилларда лазер турли ФСлардан фойдалангандан холда қатор хавфли ўсмаларни даволашда муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда ва уларнинг кўпгина қисмини тери, тил, оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватлари, лаб, хиқилдоқ, ўпка, сийдик пуфаги, меъда- ичак тизими, жинсий ва б.қа. органлар ўсмалари ташкил қиласди. Сероз қаватлардан пайдо бўлувчи ёки унга метастазланувчи ўсмалар ўз ичига қорин парда карцинаматози, хавфли мезотелиома ва плевранинг бошқа хавфли касалликларини ўз ичига олади. Кўпинча бундай бирламчи ёки метастатик рак заарланиш соҳасининг хажмининг катталигига кўра инкурабелдир. Лазер сероз қаватларнинг юза жойлашган хавфли ўсмаларини

даволашда танлов усули бўлиши мумкин. Микроскопик заарланган тўқималарни даволашда лазер ва жаррохлик усулларини биргаликда қўллаш мумкин.¹

Қорин бўшлиғи диссиминирланган ўсмасининг лазер билан даволаш 16 дақиқа давом этувчи лазер билан нурлантиришдан (10 мВт, 514нм) 2 соат аввал қорин бўшлиғига гематопорфирин хосилаларини юбориш йўли орқали ўсманинг асцитик турини даволаганликлари хақида маълумот берган Tochner ва унинг хаммуаллифларининг ишларидан сўнг пайдо бўлди. Юборилгандан 2 соат ўтгач HpD ўсма тўқимасида нормадан 5-12 баробар кўпроқ тўпланиши аниқланди. Жаъми лазернинг 2 кунлик оралиқда 4 тамуолажаси ўтказилди. Барча ўсма тугунлари сезгир бўлиб чиқди, улардан 85% тўлиқ тузалди. Плевранинг хавфли мезотелиомасини бирламчи ўсмасини жаррохлик йўли билан бартараф этиш юқори даражада махаллий рецидивларнинг юзага келиш эҳтимоли билан қўшилиб келади. лазерни қўллаш қолдиқ ўсма хужайраларининг самарали парчалаб, даволаш натижаларини сезиларли равишда яхшилайди. Лазер дан фойдаланиш экстраплеврал пневмонэктомия ўрнига плевроэктомия билан чекланиш имкониятини яратиб, операциядан кейинги асоратлар сони ва ўлим кўрсаткичларини камайтиради¹

Бўшлиқ ичи лазер клиник синовларининг 1-босқичи қорин парда карцинаматозида ўтказилди. Кейинчалик, Takita ва Dougherty клиник синовларнинг 2-босқичини ўтказишиди, бунда плевранинг хавфли мезотелиомаси мавжуд бўлган 31 bemorda жаррохлик аралашув ва бўшлиқ ичи лазер биргаликда олиб борилди. Ушбу изланишларда вена ичига 2 мг/кг Фотофрина юборилгандан 48 соат ўтгач плевропневмонэктомия ёки плеврэктомия ўтказилиб ўсманинг асосий қисми бартараф этилган.

Шундан сўнг, аргонли лазер ва бўёқлар ёрдамида плеврал бўшлиқ 630 нм спектрал диапазонда, 20-25 Дж/см² дозада нурлантирилди. Ўсманинг 3-босқичидаги bemorlar ўртacha умрининг давомийлиги 12 ойни, 4- босқичда 8 ойни, 1 ва 2 босқичдаги 9ta bemornинг ўртacha умри 21 ойни ташкил қилган .

Энг йирик тадқиқотда 42 та бемор қатнашди, клиник синовларнинг 1-босқичида лазер НрДдан фойдаланган холда ўтказилди. Лазер 2 мг/кг дозада Фотофрин юборилгандан 48 соат ўтгач бўёкли аргон лазердан фойдаланган холда ўтказилди. Лазер билан нурлантириш давомийлиги 68 минутни ташкил этиб, бу 25 Дж/см² га teng бўлган таъсирнинг умумий қучланишини беради. Бошқатадқиқотда ФС сифатида 0,3 мг/кг дозадаги m-THPC ва 10 Дж/см² дозадаги лазердан фойдаланилди ва бунда 8 та бемор қатнашди. 7 та беморда ўтказилган терапия ўсманинг маҳаллий намоён бўлишини йўқолишига олиб келди .¹

Қизилўнгач ўスマлари реканализацияси лазер қўлланган дастлабки препараторлардан бири гематопорфирин хосилалари эди. Клиник тадқиқотларда қизилўнгач ва бронхиал дараҳтнинг обструктив ўスマларининг паллиатив терапиясида лазер самараси тасдиқланди. Лазер қизилўнгачнинг эрта босқичдаги ёки юза жойлашган ўスマларини даволаш сифатида фойдаланилган. Бир қанча мамлакатларда (Канада, Япония, АҚШ, Нидерландия ва Франция) қизилўнгачнинг хавфли дисплазияси ва юза жойлашган ўスマларини даволаш учун лазер дан фойдаланилган клиник тадқиқотларнинг 3- босқичи ўтказилди. Шунингдек, қизилўнгачнинг нормал яssi эпителийсини прогрессив равишда призматик эпителийга айланиши билан кечувчи Баррет қизилўнгачини даволашда лазер самараси ўрганилмоқда. Баррет эзофагити мавжуд беморларда ўсма ривожланиш частотаси 30-40 баробар ошди. Бу касаллик тахминан 10% беморларда ривожланади. Баррет эзофагитида аденокарцинома ва баъзан оғир дисплазия ривожланган холларда эзофагэктомия тавсия этилади, бироқ дисплазиянинг 1-2- босқичларида лазер асосланган, кам инвазив усул бўлиб хизмат қилиши мумкин. Overbold ва Panjehpour қизилўнгач дисплазияси мавжуд 12 та беморда ўтказилган

1. Okunaka T, Kato H, Tsutsui H, Ishizumi T, Ichinose S, Kuroiwa Y. Lung Cancer. Photodynamic Therapy for Peripheral Lung Cancer. 2014; 43 :77–82.

лазер натижалари хақида хабар беришди. Баррет эзофагити қизилўнгачнинг кенг кўламли сохаларини эгаллаши мумкин бўлиб, диспластик ўзгаришлар эса одатда мультифокал ва нотекис тарқалади.

Лазер кўп сонли хавфли ўсмаларни, хусусан простатаниг хавфли глиомаси ва ўсмасини интерстициал даволашда фойдаланила бошланди. Бунда нурланишни тўқимага чуқурроқ, бевосита етказиб бериш учун ёруғлик толали оптиканан фойдаланилади. Нурни интерстициал етказиб бериш шунингдек, бошқа органлар, жумладан ўпка, меъда ости бези ва бош мия учун хам ишлаб чиқарилиши мумкин.^{1,2,3}

Тери ва шиллиқ қаватлардан хосил бўлган (халқум, хиқилдоқ, сийдик пуфаги ва б.қа) ўсмаларни даволаш лазернинг асосий соҳаси хисобланади . Клиник тадқиқотлар тери ракини даволашда лазернинг терапевтик самараси тўлиқ регрессия (90%дан ортиқ ўсма ўчоқлари) ва қисман регрессияни (одатда, терининг ўсма билан кўламдор зараланган беморларда) хисобга олиб 100% эканлигини кўрсатади . Ўсманинг бошқа локализацияларида, маълум бир техник қийинчиликлар мавжуд бўлганда ва ўсма инфильтрациясининг барча қатламларига ёруғлик дозасини адекват ўтказилишдаги чекланишлар хисобига лазер таъсири пасаяди ва 70-90 % атрофида бўлади. Хавфли ўсмаларнинг эрта босқичларида таъсир самараси 90-100 % га етади, 55-70% bemорларда ўсмаларнинг тўлиқ резорбцияси кузатилади .

Хозирги даврда дунёning кўргина мамлакатларида (Канада, Япония, Нидерландия) Фотофрин қўлланиувчи лазер бачадон бўйни, қизилўнгач, ўпка раки хамда сийдик пуфагининг рецидивланувчи юза ўсмаларини

-
1. Schouwink H, Rutgers ET. et al. Chest. Intraoperative Photodynamic Therapy After Pleuropneumonectomy in Patients with Malignant Pleural Mesothelioma: Dose Finding and Toxicity Results. 2011; 120 :1167–1174.
 2. Shackley D.C., Briggs C., Gilhooley A. et al. BJU Int Photodynamic therapy for superficial bladder cancer under local anaesthetic. 2012; 89: 665—670.
 3. Stummer W, Reulen HJ, Novotny A, Stepp H, Tonn JC. Acta Neurochir. Suppl. Fluorescence-guided resections of malignant gliomas—an overview. 2013; 88 :9–12.

даволаш қарорига киритилган. лазер қўлланилишининг яна бир сохаси – бу ўсмани жаррохлик йўли билан бартараф этгандан кейинги адъювант махаллий терапиядир. Маълумки, йирик ўсмаларнинг резекциясидан кейинги кўпгина холларда ўсманнг микроскопик ўчоқларининг қолиши рецидив ва хатто метастазлар ривожланишига олиб келиши мумкин. Лазер қўллаш имконияти мавжуд соҳалар: меъда ичак йўлидан хавфли ўсмани олиб ташлангандан кейинги қорин бўшлиғи, қорин парда ортида жойлашган ёки ичакни заарланирувчи кичик хажмдаги саркома, хавфли глиома, радикал простатэктомиядан кейинги холатларни ўз ичига олади.

Лазер жаррохлик аралашувларда хам самарали бўлиши мумкин, сабаби бунда ёруғлик таъсирини тўқималарга максимал равишда кириб бориши таъминланади, шу билан бирга нурлантириш аниқ дозаланади. Nambisan et al. маълумотларига кўра, қорин парда орти саркомасининг рецидиви билан операция бўлган 10та bemor текширувдан ўтказилди. Бартараф этилган ўсма ўрнида интраоперационлазер ўтказилди. 10та bemордан 8тасида ўсма тўлалигича бартараф этишга эришилди. Циторедуктивоперациядан сўнг 2 та bemор рецидивларсиз 24 ва 28 ой яшашди. Терапия асоратлари кузатилмади . 23 та bemорда (13 таси тухумдон ўсмалари, 8 таси саркома ва 2 таси қорин бўшлиғи псевдомиксомаси билан) қорин ичи лазер ўтказилди. Ўсма олиб ташлангандан сўнг қорин парда юзаси 0,2 дан 3 Дж/см² гача 630 нм тўлқин узунликка эга бўлган лазер билан нурлантирилди. Даволашдан сўнг 8 та bemорнинг 5тасида атипик хужайраларни аниқлаш учун қорин парда бўшлиғидан ювинди олинниб цитологик текширилганда манфий натижага кузатилди. 6 та bemорда эса касаллик клиникаси 18 ой мобайнида кўринмади.

Хозирги даврда ўпка ракини лазер ёрдамида даволаш асосан унинг эрта босқичларида ўтказилмоқда. Ўпка ракида операциядан олдинги лазерга операция қилиш имкониятини оширувчи ва жаррохлик амалиёти хажмини камайтирувчи вариантлардан бири сифатида қаралмокда . Каплана Майер усули бўйича хисобланганда ўсманинг 3-босқичидаги bemорларда ва кейинги лобэктомия операциясидан олдинги лазер олган bemорларда 5

йиллик яшаш күрсаткичи 59,3%га тенглиги аниқланды. Шундай қилиб, операция олди лазердан фойданишга янгича ёндашув ўпкада тарқалган хавфли ўсмаларни даволашда ва ўпка ракида лазерни қўллаш соҳаларини кенгайтиришда кимматли бўлиши мумкин.^{1,2}

Шунингдек, лазер қизил суяк кўмигини экстракорпорал тозалашда хам қўлланилиши мумкин. Клиник амалиётда Фотофрин, бензопорфирин(BPD) унумлари ва мероцианин 540 (MC540) каби бир қанча ФС лар қўлланилган. Суяк кўмиги трансплантатлари квант нурланиш ва ФС таъсирига осон берилувчан хужайралар суспензиясидан ташкил топган. Ушбу техниканинг афзаллиги bemorga хужайрани реинфўзия қилишдан аввал системали фотосенсибилизация келиб чиқишини олдини олиш мақсадида препаратни бартараф этиш имкониятининг мавжудлигидадир. Лазер 8 log катталикдаги клоноген хужайралар сақловчи промиелоцитар лейкоз ва сурункали миелоид лейкоз хужайралар сонини камайтириши мумкинлиги хақида маълумотлар бор. Бунда 50 % полипotent гемopoетик хужайралар- ўтмишдошларни сақлаб қолишга эришилади. Sieber маълумотларига кўра, *in vitro* шароитида MC 540 лазерни қўллаган холда Ноходжкин лимфома хужайралари сонини 4-5 баробар камайтиришга муваффақ бўлинди. Бунда препарат дозаси 50% атрофида нормал гемopoетик хужайра- ўтмишдошларни сақланиб қолинишига имкон берди. Келажакдаги изланишларда bemorlarни фотодинамик терапиядан кейин бисульфан ва циклофосфамидинг юқори дозалари хамда суяк кўмиги аутотрансплантацияси йўли билан даволаш режалаштирилмоқда.

-
1. Panjehpour M, Overholt BF, Phan MN, Haydek JM. Gastrointest. Endosc. Optimization of Light Dosimetry for Photodynamic Therapy of Barrett's Esophagus: Efficacy vs. Incidence of Stricture After Treatment. 2015; 61 :13–18.
 2. Rotomskis R., Bagdonas S., Streckyte G. Journal of Photochemistry & Photobiology. Spectroscopic studies of photobleaching and photoproduct formation of porphyrins used in tumour therapy. 2010; 33: 61—67.

Назорат саволлари:

1. Лазерлар тўғрисида тушунча?
2. Қандай лазерлар юқориқувватли хисобланади? Лазер турлари?
3. Лазер нурини тўқимага кириб бориш хусусияти?
4. Лазерлар билан жарохатни ўзига хослиги нимада?
5. Лазер жарохатини юритиш хусусияти?
6. Хирургияда қандай лазерлар қўлланилади? Мисоллар билан тушунтириб берсангиз?
7. Лазерларнинг хозирги кундаги муаммолари ва унинг қандай ютуқларини биласиз? Бу борада қилинган ишлардан мисоллар келтира оласизми?
8. Ўқувчини педагогик ва ўқувчилар жамоаси орқали тарбиялаш деганда нимани тушунасиз? Иш фаолиятингиздан келиб чиқиб, мисоллар келтира оласизми?
9. Инфранурли лазер деганда нимани тушунасиз?
- 10.Лазерлар бўйича Ўзбекистонда қандай ишлар олиб борилмокда?
- 11.Лазер ким тамондан биринчи кашф этилган?
- 12.Лазер едамида қайси тўқимадан олиб ўтказиш мумкин?
- 13.Лазер операцияси биринчи марта каерда амалга оширилган?
- 14.Лазерлар билан қайси йуналиш мутахасилари шугиллана олади?
- 15.Қандай холатларда лазерларни қўллаш мумкин эмас?
- 16.Жигар хирургиясида кандлай лазерни қўллаш мумкин?
- 17.Тўқимани кесиш учун қайси лазер ишлатилмайди?
- 18.Қайси холларда АИГ-неодим лазерни қўллаш мумкин?

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Aalders M.C., Sterenborg H.J., Stewart F.A. et al. Journal of Photochemistry & Photobiology. Protodetection with 5-aminolevulinic acid-induced protoporphyrin IX in the rat abdominal cavity: drug-dose-dependent fluorescence kinetics. 2015 Oct; 72: 521—525.
- 2.Bonnette P, Heckly GB, Villette S, Fragola A. Chest. Intraoperative Photodynamic Therapy After Pleuropneumonectomy for Malignant Pleural Mesothelioma. 2012; 122 :1866–1867.
3. Copper MP, Tan IB, Oppelaar H, Ruevekamp MC, Stewart FA. Arch. Otolaryngology. Head & Neck Surgery. Metatatra(hydroxyphenyl)chlorin Photodynamic Therapy in Early-stage

- Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. 2013; 129 :709–711.
4. D'Cruz AK, Robinson MH, Biel MA. Head & Neck. mTHPC-mediated Photodynamic Therapy in Patients with Advanced, Incurable Head and Neck Cancer: A Multicenter Study of 128 Patients. 2014; 26 :232–40.
 5. Gahlen J., Prosst R.L., Pietschmann M., Haase T. et al. Annals of Surgery. Laparoscopic fluorescence diagnosis for intraabdominal fluorescence targeting of peritoneal carcinosis experimental studies. 2012 Feb; 235(2): 252—260.
 6. Hahn SM, Smith RP, Friedberg J. Curative Treatment Options in Oncology Photodynamic Therapy for Mesothelioma 2011; 2 :375–383.

5-мавзу:Түгма юрак нүксонларини даволаш усуллари.

Режа:

- 1.Түгма юрак нүксонларини ташхис қўйиш
- 2.Даволашда хирургиядаги ўрни.

Таянч иборалар: Ўзак хужайралар, хирургия, трансплантация, тўқима нүксонлари, янги технология, қон томир хужайралари.

5.1 Түгма юрак нүксонларда ташхис қўйиши.

Юқори ва пастки ковак веналар қонни йифиб уни юракнинг ўнг бўлмачача-сига ташийди. Қон ўнг бўлмачачадан ўнг қоринчага уч тавақали клапан билан таъминланган бўлмачача-қоринча тешиги орқали тушади. Ўнг қоринчадан қон ўпка артерияси бўйлаб ўнг ва чап ўпкаларга етади. Улардан артериал қон тўртта вена орқали чап бўлмачачага тушади, кейин эса чап веноз тешик ва бўлмачача-қоринчааро икки тавақали митрал клапан жойлашган тешик орқали чап қоринчага тушади. Кейин қон учта яримойсимон тавақалардан ташкил топган клапан билан таъминланган аортал тешик орқали аортага йўналтири-лади. Ўнг ва чап бўлмачачалар, ўзавомида қоринчалараро тўсиққа ўтадиган бўлмачачалараро тўсиқ билан бўлинган. Юракнинг қон таъминоти аортадан ва Вальсальва синуси соҳасидан чиқадиган иккита тож артерияси томонидан амалга оширилади. Юрак веналари тож синусига ёки бевосита ўнг бўлмачача ва қоринчага

куйилади. Юрак мушаги структураси ва фаолияти бўйича бир-биридан фарқ қиласиган иккита элемент - қисқарувчи миокард толалари ва ўтказувчи системадан ташкил топган. Юракнинг ўтказувчи системаси ўнг қоринча деворида жойлашган синус тугунидан (Кейт-Флак тугуни) иборат. Синус тугунидан келадиган импульслар атриовентрикуляр тугунга тарқалади, чап ва ўнг оёқчаларга бўлинадиган бўлмачача-қоринча тутамларига ўтади. Юракнинг иш фаолияти даври (цикли) қоринчалар систоласи ва диастоласи даврига бўлинаб, уларнинг охирида бўлмачачалар систоласи содир бўлади. Юрак қоринчалари томонидан қон томирларга ҳайдаладиган қон ҳажми, юза майдонига бўлинган минутлик қон ҳажми - юрак индекси деб аталади. Катта одамда осойишта ҳолатда юрак индекси 3,5-4 л (мин.м²)га тенг, жисмоний иш бажарилаётганда эса, унинг қўрсаткичи 5-10 мартаға ортади. Чап қоринча ва аортада нормал босим симоб устуни (Hg) ҳисобида 120 мм дан, ўнг қоринча ва ўпка артериясида - 25 мм дан ошмайди. Перикард эса, юракни қоплаб турган берк сероз қопчиқ ҳисобланади.

Махсус текшириш усуллари. Тўлиқ клиник диагноз (ташхис) қўйиш, гемодинамика ҳолатини аниқлаш, юрак миокарди қисқариши фаолиятини издан чиқиши (бўзилиш) даражасини аниқлаш учун, одатдакуйидаги текширув усуллари қўлланилади:I. Ноинвазивтекширув усуллари: эхокардиография, рентгенография, компьютер томография (КТ), магниторесоҳанс томография (МРТ). Ультратовуш текширув ёрдамида(эхокардиография) юрак тўсиги, юрак клапанлари нуқсонларини диагностика қилиш, миокард қисқариш функцияси бўзилишларини аниқлаш, юрак ичи ва марказий гемодинамика ҳолатининг аниқлаш имконини беради.^{1,2}

Кўкрак қафаси рентгенографияси диагностик усул сифатида кенг кулланилади, албатта бу текширув З проекцияда, қизилўнгачни контрастлаган ҳолда бажаришили шарт: тўғри, чап ва ўнг қийшиқ позицияларда.Д. КТ ва МРТ юқоридаги текширув усулларини тўлдиради.II. Инвазив текширув усуллари:Юрак бўшлиқларини Сельдингер усулида катетерлар ёрдамида зондлаш. Зонд юборишнинг учта усули фарқ қилинади: веноз, артериал ва юракни игна орқали пункция қилиш. Текширишда юрак бўшлиқларидаги босим ўлчанади, қон газ таркибига баҳо берилади ва вентрикулография бажарилади .

-
1. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
 2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

Селектив коронарография – юракнинг тож артерияларига қонтраст модда юбориб, унинг ўтказувчанлигига аниқлаш ва баҳо беришга айтилади. Туғма юрак нуқсонлари, юрак эмбриогенези жараёнларининг бўзилиши ёки постнатал даврда нормал шаклланиш кечикиши оқибатида пайдо бўлади. Кўпчилик юрак нуқсонларининг асосий белгиси - кичик ва катта қон айланиш системасига қоннинг аниқ тақсимланмаслигидир. Бунга, одатда юрак тўсиқларида нуқсон борлиги сабаб бўлади. Туғма юрак нуқсонлари шартли равишда учта гурухга бўлинади. Биринчи гурух - веноз қонни артериал оқимга тушиши билан боғлиқ юрак ичида патологик туташмалари бўлган нуқсонлари (ўнгдан чапга, бирламчи - кўк): триада, Фалло тетрадаси ёки пентадаси, уч тавакали клапан атрезияси, Эйземенгер синдроми, томирлар транспозицияси ва б. Иккинчи гурух – артериал қонни веноз оқимга тушиши билан боғлиқ юрак ичида патологик туташмалари бўлган нуқсонлар (чапдан ўнгга, бирламчи-ок): бўлмачалараро тўсиқ нуқсони, қоринчалараро тўсиқ нуқсони, очиқ артериал йўл ва б. Учинчи гурух - қон айланишининг бўзилиши. Кўкс оралиғидаги магистрал томирларнинг торайиши сабабли келиб чиққан нуқсонлар: ўпка артерияси стенози, аортанинг бошланиш қисми стенози, аорта коарктацияси. Ҳозирги пайтда юрак туғма нуқсонларининг юздан ортиқ турлари маълум бўлиб, улардан асосийлари устида тўхталиб ўтамиш:

Фалло тетрадаси.

тўртта доимий белгилар билан кузатилади.

2. Қоринчалараро тўсиқнинг юқори нуқсони.
3. Аортанинг ўнг томонга сурилиши.
4. Ўнг қоринча гипертрофияси.

Фалло тетрадасида гемодинамиканинг бўзилиши, ўпкага қон тушиши-нинг камайиши ва веноз қонни ўнг қоринчадан аортага ўтишидан иборат бўлади.^{1,2}

Клиникаси ва диагностикаси. Касалликнинг дастлабки аломатлари бола туғилгандан кейинги дастлабки соатларда унинг қичқириши ва эмиши вақтида енгил цианоз қўринишида юзага чиқади. Кейинчалик, цианоз ва нафас қисиши бирмунча яққол намоён бўлади ва 1-2 ёшга келиб доимий тусга кириб, ҳатто бола тинч турганида ҳам йўқолмайди. Катта ёшдаги беморлар нафас қисиши, тез чарчаш, бош оғриғи, жисмоний ишга лаёқатсизликдан нолийдилар. Аксарият bemорлар ўриндан туролмай ётади-

лар. Ахвол тобора ёмонлашади. Беморларнинг тери қопламлари кўқимтири тусга киради, бармоқ биланбосиб кўрилганда, шу жойда аста-секин йўқоладиган оқимтири доғқолади. Кўпинча bemor баданида, ўрта даражада кенгайган веналар кўриниб турди, улар кўкрак қафаси соҳасида ва бош суюги устида айниқса яққол кўзга ташланади. Тирноқ фаланглари ногора таёқчалари кўринишига киради. Мушак системаси суст ривожланади. Кўздан кечирилганда аксари «юрак буқриси» кўринади. Аускультацияда юрак чўққисида I тоннинг қисқарганлиги ва ўпка артерияси II тон сустлашганлиги аниқланади. II—III қовурғалар орасида тўш суюгининг чап чеккасида систолик шовқин эшитилади.

Қон анализларида эритроцитлар миқдори 6—10¹² л гача ва гемоглобин миқдори 130—150 г/л гача кўпайган.

Фонокардиограммада ўпка артерияси устида шовқин ва нуқсон соҳаси устида ва қоринчалараро тўсиқда шовқин қайд этилади.

Рентгенологик текширувда қуйидагилар аниқланади: юрак бир меъёрда кенгайган, юрак бели яхши билинади, чўққиси юқорига силжиган. Ўпка артерияси сатҳидаги қонтур ясси ва ичига ботган; аортанинг юқорига кўтариладиган қисми ва равоги кенгайган; ўпканинг тасвири хидалашган, илдизлари сояси камайган бўлади. Зондлашда катетер бевосита ўнг қоринчадан аортанинг юқорига

кутариладиган қисмига ўтади. Ўнг коринчага қонтраст юборилганда айни вактда ўпка артерияси ва юқорига кўтариладиган аорта тўлади, ўпка артерияси стенози аниқланади (3 расм).^{1,2}

Даволаш. Фақат жарроҳлик усули қўлланилади. Фалло тетрадасида жарроҳлик амалиётлари паллиатив ва радикал бўлиши мумкин.

Паллиатив жарроҳлик амалиётлари аорта билан ўпка артерияси ўртасида туташма (йўл) хосил қилиниб, кучсиз артерилизацияланган қоннинг аортадан ўпка артериясига, торайган қисмини четлаб ўтиб, тушиши таъминланади.

-
1. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
 2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

Радикал жарроҳлик амалиётлари ўпка артерияси стенозини бартараф этиш, қоринчалараро тўсиқ нуқсонига ямоқ солишдан иборат бўлади. Шундай ямоқ, чиқиш бўлимининг эҳтимол тутилган торайишини бартараф қилиш мақсадида, ўнг қоринча девори кесмасига тикилади. Энг кўп тарқалган амалиётларга Блелок-Таусиг жарроҳлик амалиёти киради.

Бунда ўнг ўмров ости артерияси ва ўпка артериясини ўнг тармоғи орасида анастомоз қўйилади. Одатда, радикал операциядан олдин биринчи босқичда паллиатив усул қўлланилади.

Очиқ артериал йўл

Очиқ артериал йўл (Боталлов проток) аортанинг дастлабки бўлимини ўпка артерияси билан бириктириб туради. Эмбрионал даврда очиқ артериал йўл - нормал физиологик ҳолат ҳисобланиб, одатда чақалоқ туғилганидан сўнг, тез орада бу йўл облитерацияга учрайди. Бу жараён бўзилганда, у очиқлигича қолади ва артериал қонни аортадан ўпка артериясига ўтиши ва шу муносабат билан қатор гемодинамик бўзилишлар вужудга келади. Катта қон айланиши доирасидан кичик доирага доимий қоннинг ўтиб туриши натижасида аъзоларлар ва тўқималарнинг қон билан таъминланиши ёмонлашади, кичик қон айланиши доирасида босим ортади, ўпка гипертензияси ошиб борганда шовқин систолик шовқинга айланиб, ўпка артерияси устида жуда яхши эшитилади.

Рентгенологик текширишда ўпка тасвирининг қуюқлашуви, ўпка артерияси ва тармоқларининг кенгайиши қайд этилади. Юракни зондлашда ўпка артериясида босимнинг ортиши, унда қоннинг кислородга тўйиниш

даражасининг юқорилиги қайд қилинади. Аортографияда контраст модданинг аортадан ўпка артериясига тушиши аниқланади.^{1,2}

Даволаш фақат жарроҳлик усули: очиқ артериал йўлни боғлаш ёки боғлаб, сўнг уни кесишдан иборат.

5.2 Даволашда хирургиядаги урни.

Коринчалараро тўсиқ нуқсони

Қоринчалараро тўсиқнинг битмаганлиги (нуқсони), гемодинамиканинг бўзилишига, артериал қоннинг чап қоринчадан ўнг қоринчага, сўнгра кичик қон айланиш доирасига ўтиши билан ифодаланади.

Бу ҳолатда, артериовеноз шунтнинг борлиги чап қоринчанинг гипертрофиясига ва ўпка гипертензиясининг ривожланишига олиб келади. Ўпканинг юқори гипертензияси веноз қоннинг катта қон айланиш доирасига

тушишига, цианоз пайдо бўлишига ва ўнг қоринча етишмовчилиги ривожланишига олиб келиши мумкин.

Клиникаси ва диагностикаси. Янги туғилган чақалоқларда ва болалар ҳаётининг дастлабки йилларидағи декомпенсация ҳолатлари билан оғир кечади. Каттароқ ёшдаги болаларда симптомлар камроқ ифодаланган бўлиб, беморда асосан нафас қисиши, тез чарчаш, юрак соҳасидаги оғриқ, юрак уриши каби шикоятлар билан ўтади.

Объектив текширувда тери қопламларининг рангпарлиги, боланинг ўсиш ва ривожланишда тенгдошларидан орқада қолиши қайд қилинади. Юрак чегаралари ўнгга катталашган бўлиб, аускультацияда тўшнинг чап чети бўйлаб кучли систолик шовқин, III-IV қовурғалар орасида эса унинг жаранглироқ эшитилиши аниқланади.¹

ЭКГда қоринчалар гипертрофияси қайд этилади.

Рентгенологик текширувда ўнг қоринчанинг катталашгани, ўпка артерияси ва унинг тармоқларининг кенгайгани, чап бўлмачача ва қоринчанинг бирмунча катталашгани аниқланади. Юрак бўшлиқлари зондланганда ўнг қоринчада қоннинг кислородга тўйиниш даражасининг ортиши қайд қилинади, катетер ўнг қоринчадан чап қоринчага бемалолўтиши мумкин. Катетер чап қоринчага киритилганда қонтраст модда ўнг қоринчага ва ўпка артериясига тушади.

Даволаш - фақат жарроҳлик усули. Қоринчалараро тўсиқлардаги кичик нуқсонларга П-симон чоклар қўйиб уни бартараф этишдан иборат. Катта нуқсонларда у тешикни синтетик маҳсулотдан тайёрланган ямoқ билан бекитиш йўли билан бартараф этилади.²

Рентгенэндовакуляр жарроҳликни ривожланиши билан, даво усуллари-нинг янги турлари ишлаб чиқилди. Бунда, нуқсонни катетер ва маҳсус мослама (окклюдер) ёрдамида ёпиш усули таклиф килинди.

Бўлмачачалараро тўсиқ нуқсони

Юракнинг туғма нуқсони бўлиб, бунда ўнг бўлмача ва чап бўлмача тўсиғида тешик бўлиб, шу тешик орқали туташган бўлади. Бунда гемодинамиканинг бўзилиши, артериал қоннинг чап бўлмачадан ўнг бўлмачага ўтиши билан боғлиқ бўлади. Бу ҳолатда, артериал қоннинг талайгина қисми нормал қон оқимида қатнашаолмайдиган бўлиб қолади. Артериал қон оқиб келиши натижасида ўнг бўлмачада, ўнг қоринчада ва ўпка артериясида босим кўтарилади (гипертензия), бу эса ўз навбатида ўнг бўлмачанинг кенгайишига, ўнг қоринча гипертрофиясига, ўпка артериясининг «бўртиб чиқиши»га олиб келади. Ўпка томирларидаги гипертензия

ўпкада қон аэрацияси даражасини пасайишига олиб келади. Бу ҳолатнинг авж олиши, ўпка фиброзини келтириб чиқаради.

Бўлмачаларо тўсиқ нуқсони кўпинча митрал клапан ва ўпка томирларидағи ўзгаришлар билан асоратланади.

Клиникаси ва диагностикаси. Ушбу хасталиги бор болаларда, кўпинча жисмоний ўсиб етилмаганлик қайд қилинади. Асосий шикоятлар: нафас қисиши, юрак уриши хуружлари, одатдаги жисмоний харакатда тез чарчаб қолишдан иборат. Беморлар нафас йўлларининг яллигланиш касалликларига осон берилувчан бўлиб қоладилар. Объектив текширишда тери қопламлари ва шиллик пардаларнинг рангпарлиги, чўқки турткисининг кучайиши, юрак “букрилиги” борлиги қайд қилинади. Аускультацияда тўшдан чапроқда, II қовурғалар орасида ўпка артерияси устида систолик шовқин эшитилади. Рентгенологик текширувда юрак ўнг қоринчаси ва бўлмачаси, шунингдек ўпка артерияси ва унинг тармоқларида кенгаймалар кўриниб туради. Эхокардиографик сканерлаш - юрак ўлчамларидағи ўзгаришларни, юрак бўлмачалариаро тўсиқнинг парадоксал ҳаракатини кўрсатиб беради.¹

Юрак зондланганда босимнинг ошганлиги, юракнинг ўнг бўлимларида ва ўпка артериясида қоннинг кислородга тўйинганлиги қайд этилади. Катетер нуқсон орқали ўнг бўлмачадан чап бўлмачага ўтиши мумкин.

Даволаш - фақат жарроҳлик усулда. Туғма нуқсонларни 4-8 ёшда бартараф этган маъқулроқ. Операция сунъий қон айланиш ёки сунъий гипотермия шароитларида бажарилади. Кичикроқ нуқсонлар тикиб қуйилади, 1-2 см дан ортиқ нуқсонларда синтетик ямоқ солинади.

Ўпка артериясининг алоҳида торайиши - оқиш (ацианотик) турдаги нуқсонларга киради. Ўпка артерияси бошланиш жойинингстенози ўнг қоринчадан кичик қон айланиш доирасига қон оқиб келишига тўсқинлик вужудга келтиради. Бошланғич даврда ўнг қоринча гипертрофияси юз бериб, кейинчалик ўнг қоринча етишмовчилигига айланади. Иккиламчи гипертрофия ва бўлмача кенгайиши туфайли трикуспидал клапаннинг нисбий етишмовчилиги пайдо бўлади.

-
1. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
 2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

Клиникаси ва диагностикаси. Асосий шикоятлар: нафас қисиши (жисмоний харакат вактида кучаяди), юракнинг тез-тез уриши, тез чарчаш, боланинг ривожланишда орқада қолиши. Кўздан кечиришда юрак “букрилиги”, тўшнинг чап чеккасида II қовурғалар ораси пайпаслаб кўрилганда систолик титраш аниқланади. Перкутор текширувда юрак ўлчамларининг ўнгга катталашгани аниқланади. Аускультацияда - тўшнинг чап чеккаси бўйлаб II қовурғалар орасида максимал жаранглайдиган дағал систолик шовқин эшитилади. ЭКГ да ўнг қоринча гипертрофияси белгилари кўринади. Рентгенологик манзара ўнг қоринча гипертрофияси, ўпка артериясининг клапанлардан юқори қўтарилиши, ўпка артерияси периферик тармоқлари бўшлигининг торайиши билан таърифланади.^{1,2}

Юрак зондланганда ўнг қоринчада босимнинг ошиши кузатилади. Ўпка артериясида босим нормал ёки бир оз пасайгани ҳолда, у симоб устуни ҳисобида - 300 мм га этиши мумкин. **Даволаш** - фақат жарроҳлик усули. Қон айланиши тўхтатиб қуилган шароитда, стенозни бартараф этиш жарроҳлик амалиётлари ўтказилади.

Тұғма аорта «оғзи»стенози

Клапан, клапан ости ва клапан усти стенозлари тафовут қилинади. Аорта «оғзи»стенози қонни чап қоринчадан катта қон айланиш доирасига ўтишига тўсқинлик қилиб, унинг ортиқча ишлашига, гипертрофияга учрашига, кейин эса дилатациясиغا ва чап қоринча етишмовчилигининг ривожланишига олиб келади. Гемодинамикадаги бўзилишлар биринчи навбатда коронар ва церебрал қон айланиши бўзилишида намоён бўлади.

Клиникаси ва диагностикаси. Нафас қисиши, тезда чарчаб қолиш, юрак астмаси хуружлари, стенокардияга хос оғриқлар, бош айланиши, хушдан кетиш кузатилади. Объектив текширишда чуқки турткисининг кучайиши ва чапга силжиши, аорта проекциясида дағал систолик титраш аниқланади. Ўнг томонда II қовурғалар орасида бўйин томирларига ўтадиган систолик шовқин эшитилади. Пульс тўлиқлиги ва таранглиги кучсиз. Систолик босим пасайган. ЭКГ да левограмма, миокард ишемияси белгилари. Рентгенологик текшириш юракнинг гипертрофияси ва катталашган чап қоринчаси билан типик аортал қонфигурациясини аниқлайди.

Ангиокардиография торайиш жойи ва ўлчамларини аниқ белгилаш, чап қоринча билан аорта ўртасидаги босим градиентини аниқлашга имкон беради.

Даволаш - факат жарроҳлик усули, симоб устуни ҳисобида 30 мм дан ошадиган босим градиентида бажарилади. Операция сунъий қон айланиш ёки гипотермия шароитларида стенозни бартараф этишдан иборат.

Аорта коаркцияси

Аорта бўшлигининг чегараланган туғма торайганлиги. Тўлиқ ёпилиб қолганлиги чап ўмров ости артерияси чиқадиган жойдан пастроқда, торайиш кўпинча аорта равофининг пастга тушадиган кўкрак аортасига ўтадиган жойида жойлашади. Аортада торайган жойдан юқорида қон босими ошади, чап қоринча гипертрофияга учраб, кейин декомпенсация холати пайдо бўлади. Бош мия қон томирлари ҳавзасида гипертензия, церебрал бўзилишлар сифатида намоён бўлади. Артериал системада босим коарктациядан пастда бирмунча пасайган бўлади.

Клиникаси ва диагностикаси. Беморлар бош оғриғи, бош айланиши, юрганда оёқларининг тез оғриб қолиши, кўзнинг хиралариши, оёқлар парестезияси ва совқотишидан шикоят киладилар. Оёқ артерия қон томирларида пульс бўлмайди. Кўл артерияларида артериал босим ошган, оёқ артерияларида эса аниқланмайди ёки бирмунча пасайган. Бемор кўздан кечирилганда қовурғалараро артериялар пульсацияси, уларнинг устида коаркция жойи соҳасида систолик шовқинни аниқлаш мумкин. Рентгенограммаларда чап қоринча қонтурларининг кенгайганлиги қайд қилинади, биринчи ва иккинчи равоқлар қонтурлари 3 рақамини эслатади.

Ангиокардиография - аорта торайган жойини, шаклини, ўлчами ва даражасини аниқлаш имконини беради.

Даволаш - факат жарроҳлик усули. Жарроҳлик амалиётлари аортанинг торайган қисмини резекция қилиш ва «учма-уч» анастомоз қўйишдан иборат. Узайган торайиш бўлган ҳолларда аортанинг резекция қилинган қисми синтетик протез билан алмаштирилади.

Назорат саволлари:

1. Симптоматик артериал гипертензия хақида тушунча, этиопатогенези, классификацияси, клиникаси, ташхиси ва даволаш йўллари.
2. Симптоматик артериал гипертензия даволаш усуллари.
3. Ташхис кўйишга ва жарроҳлик амалиётiga тайёрлашга ўргатиш.
4. Симптоматик артериал гипертензияда жарроҳлик амалиётiga

күрсатмалари.

5. Эндоваскуляр амалиётлар ахамияти
6. Оёқ юза веналарини клапан аппарати ҳолати хақида маълумот берувчи синамаларини айтинг:
7. Оёқ коммуникант веналарини клапан аппарати ҳолати хақида маълумот берувчи синамаларини айтинг:
8. Қандай иккита синама чукур веналарни утказувчанлиги хақида далолат беради:
9. Оёқ веналарининг варикоз кенгайишини қайси касаллик билан дифференциал ташхис утказиш мумкин:
10. ВВК га изоҳ беринг:
11. Оёқлар ВВКнинг жаррохлик давосига асосий карши кўрсатмани санаб беринг: Оёқлар ВВКда склеротерапия килишга карши курсатмани санаб ўтинг:
12. Варикоз касаллигига изоҳ беринг:
13. Сурункали веноз етишмовчилиги симптомокомплексининг клиник қуринишини айтинг:
14. ВВКни асосий асоратини кўрсатинг:
15. Оёқлар юза веналарининг тромбофлебитининг клиник қуринишини айтиб беринг:
16. Қандай холларда оёқ юза веналарининг ўткир тромбофлебитида шошилинч жаррохлик амалиёт курсатилади:
17. Оёқлардаги юза веналар тромбофлебитида консерватив терапиянинг асосий моментини айтинг:
18. Оёқлар ВВКда юза қуринишини шаклини санаб утинг:
19. Юза веналарнинг ўткир тромбофлебитини асосий симптомини айтинг:
20. Юза веналарининг ўткир тромбофлебитининг қайси шаклда Троянов-Тренделенбург операцияси килинади:
21. Тромбофлебит тушунчасига изоҳ беринг:
22. Коммуникант веналарга характерли белгини айтинг
23. Оёқлардаги веноз окимиини кийинлашувига қуйидаги факторлар сабаб бўлиши мумкин
24. Аорта равоги окклюзион касалликлари этиопатогенези.
25. Аорта равоги окклюзион касаликлари сабаблари нозолик турлари.
26. Аорта равоги окклюзион касаликлари ташхислашда қўлланиладиган асосий диагностик усуллар.
27. Бош мия сурункали ишемияси классификацияси.

28. Аорта равоғи окклюзион касаликлари консерватив даволаш учун күрсатмалар.
29. Аорта равоғи окклюзион касаликлари оператив даволаш учун күрсатмалар.
30. Аорта равоғи окклюзион касаликлари оператив даволаш умумий принциплари.
31. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари этиопатогенези.
32. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари сабаблари нозолик турлари.
33. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари ташхислашда қўлланиладиган асосий диагностик усуллар.
34. Оёқлар сурункали ишемияси классификацияси.
35. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари қонсерватив даволаш учун күрсатмалар.
36. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари даволаш учун күрсатмалар.
37. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари даволаш умумий принциплари.
38. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар сабаблари
39. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар клиникаси ва таснифи
40. Дифференциал диагностика
41. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар даволаш усуллари
42. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар профилактикаси

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

IV.АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАЗМУНИ

1-мавзу:Хирургияда имплантатларни қўллашимкониятлари.

Ишдан мақсад: Тингловчиларга хинургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтқазиш, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар гурӯхларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Хозирги кунда реконструктив хирургия, биоматериалларни кенг қўлловчи соҳа бўлиб, турли тўқима ва аъзолар нуқсонларини реконструкция қилиб, bemorлар хаёт сифати даражасини трансплантат ва биологик суний аъзолар қўлламасдан яхшилаш имконини беради.

Юрак-қон томир (қон айланиш) тизими, тананинг барча мухим вазифаларини таъминлайди. Юрак коронар томирлари касалликлари юрак-қон томир тизимида энг кенг тарқалган патология хисобланади. Юрак – қон томир тизими касалликлари етакчи ўринда бўлгани учун, тиббиётда қўлланиладиган материалларнинг йирик гурӯхини юрак – қон томир хирургияси учун ишлатиладиган материаллар ташкил қиласди. Уларнинг қўлланилиш соҳаси кенг бўлиб – булар ишлаб чиқаришда қон сақловчи идишлар, игна ва шприц, томир катетерлари, сунъий юрак клапанлари, сунъий қон айланишини таъминловчи тизимлар хисобланади. Қон билан алоқада бўладиган материаллардан таёrlанадиган протезларга юқори талаб қўйилади. Протезларни қон билан уйғунликда ишлатиладиган материаллар табиати ва ишлаб чиқариш технологиялари шунингдек, бир қатор омилларга боғлиқ. Шунинг учун, хеч тасодиф эмаски, тиббиётда реконструктив хирургиянинг энг ривожланган соҳаси бу кардиохирургия хисобланади.

Синтетик биотурғун полимерлар:

Экстракорпорал қурилмалар учун акрилат материаллар.

Юрак клапанлари ва сунъий юрак элементлари учун эпоксид бирикмалар.

Қон томирларининг протезлари, катетер қопламалари учун фторуглеродлар.

Чоклар учун полиамиidlар.

Экстракорпорал қурилмалар учун конструкцион поликарбонатлар.

Юрак клапанлари, сунъий юрак элементлари учун полиамид.

Юрак клапанлари ва сунъий юрак элементлари учун полисульфонлар.

Катетер, сунъий юрак учун полиуретан.

Биопарчаланувчи полимерлар:

Дорилар учун полиангидрид.

Дорилар учун поликапролактан.

Чоклар учун гликолид ва лактидларнинг сополимерлари.

Дорилар учун полигидроксилкантлар.

Табиий полимерлардан материаллар:

Боғланган албумин қопламалар томир протези учун, контрастли восита ултратовуш ташхиси учун

Ацетат ва целюлоза гидрат диализ учун мембраналар яратишда

Хитозан қопламалар олишда

Коллаген, еластин, гиалуроник кислота, эластик қопламалар олишда ишлатилиди.

Металлар ва уларнинг қотишмаларига:

Кобалт хром қотишмалари сим ўтказгичлар, электродлар

Хромланган никел қотишмалари

Хотира қотишма шакллари

Зангламас пўлат Тантал

Тантал ва титан қотишмалари

Титан ва никел қотишмалари

Керамика, ноорганик, силикатлар

Монокристал алюминий оксиidi (Сапфир)

Юрак клапанлари

Углеродли материаллар:

Пиролитик углерод (паст харорат ва ултра паст харорат изотропик) юрак клапанлари, қопламаларда ишлатилиди

Томирда ишлатиладиган материаллар ва эндопротезлар учун асосий қўйиладиган талаблар шундан иборатки, улар юқори даражада қон билан мосланувчан бўлиши керак.

Қон билан уйғунлиги кўп омилларга боғлиқ:

- тури ва ишлатиладиган материаллар хусусиятлари;
- ишлаб чиқариш технологияси, эндопротез шакллари ва ўлчами;
- физик ва механик хусусиятлари, эластиклик;
- юза хусусиятлари;
- имплантация жойи;
- протез имплантация жойида гемодинамик шароити;
- операциядан кейин bemor холати ва жарохатланган тўқималарнинг битиш жараёнини;
- bemornинг қон ивиши, антитромбоген даволаш усули;
- инфекция ва операциядан кейинги асоратларни ривожланиш эҳтимоли.

Полимер ва бошқа биологик материаллар юрак иш фаолиятини яхшилашда, юрак чап қоринча вазифасинин ўташ, хамда юрак электростимуляциясида кенг қўлланилади. Био ва қон билан уйғун полимер материалларни ишлаб чиқариш соҳасидаги тараққиёт янги технология тўқима инженерияси билан бирга олиб бориладиган изланишлар юрак – томир хирургияси учун катта имкониятлар беради.

Юмшоқ тўқималар ва ички аъзолар реконструкцияси учун

ишлатиладиган материаллар

Юмшоқ тўқима дефектларининг реконструксиясини бир неча усул билан амалга оширилиши мумкин. Нуқсон ўрнига узоқ вақт хизмат қилиши учун олдиндан керакли ўлчам ва шакилдаги биотургун имплантатлардан фойдаланиш мумкин. Нуқсонларни бартараф қилишда иккинчи ёндашув, бу шу жойларга қотувчан полимер киритиш, яъни бундай полимерлар мономер (гел) эритмаси шаклида бўлиб, нуқсон жойига юборилгандан кейин полимерланишга учрайди ва керакли шакилни эгаллайди. Агар бунда биопарчаланувчи материаллардан фойдаланилса, секин аста (уларнинг парчаланишига кўра) нуқсон ўрнида пайдо бўлган тўқималар билан

тўлдирилади. Ва нихоят янги тўқималар билан аста-секин тўлдириш учун мўлжалланган биопарчаланувчи материаллардан тўзилган, олдиндан шакилланган қонструкциялардан фойдаланиш мумкин. Янги материалларни тадбиқ қилмай туриб абдоминал хирургияда қорин девори пластикаси, операциядан кейинги битишмалар, ўт йўллари реқонструксияси ва протезлаш жараёнида хирургик натижаларни яхшиланишига эришиш мумкин эмас.

Энг кўп учрайдиган операциялардан бири чуррани бартараф этиш бўлиб, у умумий операцияларни 10-15% ташкил қиласи ва хозирда функционал эндопротезларнинг янги авлодига муҳтож. Оперциядан кейинги битишмаларни олдини олиш учун хозирда барер усуллари ишлаб чиқилмоқда. Бундай эндопротезларни ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган материаллар битишмалар хосил бўлишига йўл қўймаслиги керак. Клиник амалиёт шуни кўрсатдики, синтетик барер эндопротезлардан фойдаланилганда баъзи асоратлар (серома, инфильтрация, имплантатларнинг миграцияси ва қўчиши) кузатилди.

Шундай қилиб, барер мембрана ва эндопротез учун биологик мос ва функционал материаллари устида олиб бориладиган изланишлар реконструктив хирургиянинг долзарб вазифасидир.

"Барер" имкон қадар хавфсиз ва инерт, қон ва эксадат бор жойда самарали бўлиши, капсулаланмаслиги, яллигланиш, инфекция ва фиброз манбаи бўлмаслиги, тўлик эrimаслиги ва фойдаланиш осон бўлиши, хамда узок вақт хизмат қилиши керак.

Целлюлозадан фойдаланилган холда янги препарат «Interceed» (Ethicon Inc., Somerville, NJ, USA) ишлаб чиқилилган, у 28 кун ичида тўлик сўрилувчан мемранани ташкил қиласи. Бугунги кунда бу воситани кенг қўлланилиши қон ёки қорин суюқликлари мавжуд жойда самараси камлиги учун чегараланган. Карбоксиметил целлюлоза (КМЦ) ва унинг хосилалари масалан Na-КМЦ, Россия давлат дори воситалари реестри, АҚШ ва европа фармакопиясига киритилган; Улар асосидаги имплантатлар («NEW-FILL®» воситаси КМЦ ва полилактид кислота аралашмаси) кенг кўламда пластик хирургияда қўлланилади. КМЦ ва гиолурон кислотаси боғланиши оқибатида турли мембраналар ишлаб чиқилган, масалан биосўрилувчан мембрана «Serafilm» (Genzym корпорацияси, АҚШ) бўлиб, плёнка кўринишида ишлатилиб, жарохатланган соҳаларни бекитиш учун хизмат қиласи. Мембрана 24-48 соат давомида гел холатига утада, лекин ўз жойида 7 кунгача сақланиб қолади. 28 кунда тўлик сўрилади, қушимча фиксацияларни талаб қилмайди, операцион битишмаларни хосил бўлишини сезиларли даражада камайтиради, қон бор жойда ўз самарасини сақлайди.

Бу "барер" Европа мамлакатларида ва Шимолий Америка клиникаларида фойдаланиш учун рухсат берилган. Хорижда ишлаб чиқилган битишмаларга қарши воситаларнинг самарадорлигига хеч шубха йўқ, лекин уларнинг асосий камчилиги бу уларнинг юқори қийматидир.


Ўзбекистонда қўшма илмий-тадқиқотлар асосида "Академик В.Вохидов номидаги РИХМ" АЖ ва ЎзМУ қошидаги КФП ИТИ янги хирургик имплантат ишлаб чиқарилди. Целлюлозанинг уч хосиласини комбинацияси барча талабларга жвоб берувчи қон тўхтатиш хусусиятига эга бўлган имплантат "Гепроцел" деб номланиб (Патент РУ ФАП 04.24.2015 дан 2015 0054) паренхиматоз органлардан кетаётган қонни тўхтатиш учун энг яхши восита эканлиги тадиқланди. Полимернинг тез биопарчаланиши билан бир қаторда яллиғланиш жараёнининг камлиги, жарохатни ёд модда билан боғлик бўлган яллиғланишини олдини олади. Жарохат соҳасида фиброз тўқимани тез шаклланишига олиб келади ва барқарор гемостаз учун имкон беради. Бундан ташқари, қорин парда ва атрофидаги органлар томонидан ножӯя реакциялар кузатилмайди. Изланишлар натижларига кўра "Гепроцел" қон айланиш тизими фаолиятига таъсир кўрсатмаган холда жарохат соҳасидаги қон ивиш омилларини фаоллаштиради ва шу сабабли паренхиматоз аъзолардан кетаётган қонни тўхташига олиб келади.




Жигар жарохати




Жарохат имплантат билан копланди



1 кундан сунг жарохатни
куриниши




Жарохатни битиши




Жигар жарохати 3 соатдан сунг



Жигар жарохати 12 соатдан сунг



Жигар жарохати 1 кундан сүнг



Жигар жарохати 14 кундан сүнг

Үт йўллари рекнострукцияси - бу юқори мустахкам ва биологик мос материаллардан тайёрланган функционал эндопротезларга муҳтож бўлган хирургиянинг йўналишидир. Үт йўллари тизими касаллиги - хирургик патологиялар ичida етакчи ўрин тутади. Хозирги кунга қадар долзарб муаммолардан бири механик сариқлиги бор бўлган беморларни даволаш. Ўтган 10 йил давомида, замонавий жаррохлик ютуқлари натижсида, сезиларли даражда хирургик натижларини яхшилашга муваффақ бўлинди.

Сўнгги йилларда полимерлар синтези соҳасида эришилган ютуқлар натижасида эндобилиар стентлар, тикув материаллар, тўрсимон протезлар учун оптимал материаллар устида изланишлар жадал ривожланмоқда. Лекин, афсуски, бугунги кунга қадар, замонавий билиар хирургия талабларига тўлиқ мос келадиган махсулотлар ишлаб чиқариш учун хеч қандай мукаммал материал топилган эмас. Стент тайёрлаш учун ишлатиладиган қулай синтетик махсулотларга тефлон, полиуретан, полиетилен, перкуфлекс киради. Синтетик стентларнинг клиник қўлланилиши натижасида уларнинг бир қатор камчилклари аниқланди: 3-6 ой ичida тиқилиб қолиши, бундан ташқари бундай стентларни тез-тез миграцияси (ўз жойидан чиқиб кетиши) шундай камчиликлар қаторига киради.

Янада кенг ишлатиладиган, ўзи кенгаядиган металл стент учун қатор чекловлар аниқланди.

Биламизки хирургик амалиётида тикув материалларига талаб юқори. Асосан чоклар учун материал табиий ёки синтетик полимер материаллардан тайёрланади. Тикув материали зарур механик кучга эга бўлиши, хавфсиз, операция вақтида ишлатилиши қулай бўлиши ва осонлик билан стерилизацияниши керак. Сўнгги йилларда, эътибор биосўриувчан хирургик ипларга қаратилган. Биопарчаланувчи хирургик тикув материаллари хавфсиз, етарли эгилувчан, тўқима тиклаш кинетикасига қараб аста – секин сўрилиши керак. Шу билан бирга, материаллар деградацияси махсулотлари организмда осонлик билан элиминацияга учраши, атроф тўқима ва умуман организмда салбий реакцияга сабаб бўлмаслиги лозим. Хозирги кунда ичак анастамозларини қўйиш учун хиургик тикув материалларига талаб юқори. Ичак қовузлоқларини тикишда кенг тарқалган усул, бу лигатурали усул ҳисобланади ва энг кенг тарқалган анастомозлардан эса - икки қаторли анастомоз ҳисобланади. Клиник амалиётга синтетик тикув материалларининг тадбиқ қилиниши бир қаторли ичак чоки техникаси ва операциядан кейинги жараёнга ижобий таъсир кўрсатди. Жаррохлик тикув материаллари табиий ва синтетик полимерлардан таёrlанади. Полипропилен («Prolene», «Sircilene», «Deklene»), полиамиллар («Sircilin», «Dermalon», «nylon 66», "Poliamid 6"), галоген сақловчи полимерлар («Tarix-Tex», "FUMALEN®») синтетик сўрилмайдиган тикув материаллари, чуқур жойлашган хиургик чокларни хосил қилиш учун ишлатилади. Бундай материал фиброз капсула билан қопланади ва бемор хаёти давомида унинг танасида қолади.

Охирги вақтда парчаланувчи тикув материалларини ишлаб чиқиши, фойдаланиш ва тадбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Тўқима битаётганда бундай материалдан ишланган иплар аста – секин янги пайдо бўлган тўқима билан алмашинади, натижада чоклар мустахкамлигини ошишига олиб келада. Кетгут иплари ўринига хозирда унданда мустахкамроқ ва узокроқ хизмат қиласидиган синтетик полимерлардан сўриувчан иплар («Dexon»), («Vicryl») кириб келди. Бу иплар, яқинга қадар идеал ҳисобланарди, лекин уларнинг камчилиги шундаки чоклар ўзининг мустахкамлигини узоқ муддатгача сақлаб қолиши керак бўлган жойларда фойдаланиш мумкин эмас. Полилактид ва полигликолид синтетик биёпарчаланувчи материаллардан фойдаланишда юзага келадиган асосий асоратларнинг сабаблари бу полимерлар деградацияси махсулотларини организмга аллергик ва яллиғланиш таъсирни кўрсатиши мумкин. Шунинг учун, биомеханик кучли ва биосўриувчан оптимал чокларни ишлаб чиқариш тиббиётнинг муҳим маслаларидан бири ҳисобланади.

Хирургик еимлар ва композитлар кўп холатларда юмшоқ тўқималар жаррохлигидаги яралар четларини елимлашда фойдаланилади. Тиббиётда полимер материалларнинг қўлланиши кам ривожланган йўналиш бўлиб, бу айниқса ички органлар (жигар, буйрак, ўпка) операциялари вақтида улардан фойдаланишга эҳтиёж юқори. Хирургияда ишлатиладиган еимлар висцерал тўқималарига хос юқори намлик бор шароитида, тез эластик ёпиштирувчи боғламлар шакиллантириши; мослашувчан бўлиши; қотиш давомида қизиб кетмаслиги; узоқ муддатли фаолият кўрсатиши ва захарли бирикмалар ажратмаслиги керак. Биринчилардан бўлиб, полицианакрилатлар асосидаги еимлардан фойдаланила бошланди ва хозирда хам улар ишлаб чиқарилмокда. Бу еимлар тез парчалангандиги сабабли, уларнинг яроқлилик муддати чекланган (6-9 ой). Полицианакрилатларнинг капролактан ва монокрабон кислотаси полимерлари (полилактид / полигликолид) композицияси билан бирга янада яхшиланган еим турлари бўлиб, аневризмани мустахкамлаш ва мия суюқлиги каналларини эмболизация қилишда тавсия этилади. Фибрин еимлар хам маълум бўлиб, улар асосини оқсиллар тизими ташкил қиласди. Тайёрланиш технологияси мураккаблигига қарамай ички аъзо тўқималари чети яхши ёпишиши билан ифодаланади. Бундан ташқари формалдегид ва глутаральдегид каби желатин асосидаги еимлар хам қўлланилади.

Операциядан кейинги бўшлиқни тўлдириш, аневризмани мустахкамлаш ва тўлдириш, ички аъзолар оқма йўларида (масалан, жигар ёки меъда ости бези каналлари каби) инъекция шаклида қўлланиладиган композициялар хам маълум.

Таркибий асоси полимер композицияли бўлган моддаларни тери остига юбориш, тери ўсмалари олиб ташлангандан кейин ва косметологияда юзнинг юмшоқ тўқималари камчиликларини тузатиш учун ишлатилади. Бундай композицияларга гиалурон кислота асосидаги гидрогеллар, коллаген асосидаги препаратлар ва коллоид массалар киради. Ушбу воситалар юмшоқ тўқима пластикасида жуда муваффақиятли ишлатилади.

Ички эндпротезлар ғоваксимон имплантатлар ёки кичик қопчалар шаклида бўлиб улар биоинерт ва зарарсиз суюқликлар, гел билан тўлдирилган бўлади. Сут бези эндопротезлари кенг тарқалган бўлиб улардан косметик мақсадлар учун фойдаланилади, шунингдек улардан онкохирургик амалиётлардан кейинги нуқсонлари тўлдириш учун ишлатилади. Тўзилиши жихатидан бундай эндопротезлар эластик сумка шаклига эга.

Кремнийорганик материаллари асосида таёrlанган эндопротезлар юз юмшоқ тўқималари ва тоғайларни тўғирлаш учун ишлатилади. Бундай

протез турларини ишлаб чиқариш учун турли силикон каучуклардан фойдаланилади. Монокорбон кислотаси асосида олинган полимер ва сополимерларидан бурун түсиғи ва қулоқ супраси протези тоғайи қонструкцияларини олиш учун ишлатилади.

Шундай қилиб, юмшоқ түқималар учун протез ишлаб чиқаришда, улар учун оптималь материаллар устида изланишлар давом этмоқда.

Пайлар ва мушакларни эндопротезлаш, ўз навбатида янги ва мураккаб вазифа хисобланади. Бойламлар ва пайларнинг эндопротези сифтида ксенотрансплантатлар ва синтетик хамда табиий материаллар қонструкциясидан фойдаланиш мумкин. Синтетик материаллар сифатида улардан узок муддат фойдаланилганда хам зўриқишиларга чидамли бўлган полизтилен тэтрофталатдан фойдаланиш мумкин.

Тери бутунлигининг бўзилиши оғир асоратлар ва оғриқ билан кузатилади. Тери барер сифатда ташқи таъсирлардан, токсинлар ва танани юқумли микрофлораларидан химоя қиласи, шунингдек организмдан моддалар алмашинуви маҳсулотларини чиқаришда иштирок этади. Тери эпидэрма (ёки ташқи қатлами), доим регенерацияланиб туради, дэрма (хусусий қатлам) ва тери ости ёғ қатламидан иборат. Дэрма механик вазифани бажариб, регенерацияланмайди. Суний терига катта эҳтиёж куйишдан кейинги даврда юзага келади. Биринчи даражали куйиш терининг эпидермис қаватини заарлайди. Иккинчи даражали куйиш, хар икки қатламларини халок қиласи, лекин соч фолликулалари атрофида эпидермис қолиб, чандик кўринишида тиклаш имконини беради. Учинчи даражали куйиш барча тери қаватларини халок қиласи. Кучли куйган тери бактериялар тушмасиддан олдин, дархол олиб ташланиши керак. Куйишлар учун энг афзал қоплама аутотрансплантатлар хисобланади. Лекин беморда ўзидан кўчириб ўтказиш учун териси етарли бўлмаслиги мумкин. Хайвон ёки мурда териси трансплантация учун яроқсиз хисобланади, чунки хўжайин организми тез чиқариб ташлайди. Алтернатив усул сифатида бўлиб суний тери қопламалари ва боғламларидан фойдаланиш мумкин. Хозирги кунда турли материаллар ва услублардан фойдаланиб, сунъий тери қопламаларини ишлаб чиқариш фаоллик билан ривожланмоқда. Терининг заарланиш даражаси ва унинг яллиғланиш босқичига қараб (яллиғланиш босқичи, регенерация босқичи, янги эпителиал тери шакилланиш босқичи) сунъий тери қопламаларига қўйиладиган талаблар фарқланади. Биринчи босқичда химоя материаллар (синтетик тери) яраларни тозалигини таъминлаши керак; иккинчи - янги бириктирувчи түқима ўсиши учун шартшароитлар яратиши керак; учинчи - эпителиал хужайраларини ўсиши, хамда

уларнинг миграцияси ва янги эпидэрмисни шакллантириш учун шартшароитлар яратиши керак.

Суний терини яратишда табиий ва сунъий синтетик материаллардан гел, тўқимачилик махсулотлари, плёнкалар, ғовакли қопламалар ва бошқалардан фойдаланилади. Хозирги кунда ишлатилиб келинаётган боғлов материаллари, бугунга келиб қон тўхтатувчи ва сорбцион хусусиятга эга бўлган замонавий материаллар билан алмашинмоқда. Полимерлар асосидаги, сорбцион материаллар толали махсулотлар, губка ва кукун шаклида ишлаб чиқарилади, улар яра юзасида плёнкали қопламалар хосил қилишда иштирок этади. Оқсилполисахаридли қопламалар яраларни тузалишида ижобий таъсир кўрсатади, улар қаторига натрий алгинат ва коллаген ("Алгикол") хамда хитозан ва коллаген асосидаги комплексларни киритиш мумкин.

Таркибида антибиотик сақловчи алгинат кислоатаси ва желатин асосидаги кўпиксимон композициялар хам яраларни тузалишида яхши самара кўрсатади. Куйган терининг заарланган юзасига плёнка хосил қиласиган кукунлар ёки полимер спрейларни ишлатиш мумкин. Поливинил спиртидан тайёрланган пленкали қопламалар яхши адгезия ва микрофлорани ўтказаиш хусусиятига эга, полигликол кислотасидан иборат пленкали қопламалар эса тўлиқ тери юзасига ёпишмайдива тез деструкцияга учрайди. Бир неча қатламлардан иборат функционал тери қопламалари ишлаб чиқилди, улар биринчи гидрофоб қатлам - кислород ва сув буғларига нисбатан ўтказувчанлиги сақланган бўлиб, микроорганизмларни ўтказмайди. Кейинги қатлами гидрофил - тери жарохати юзаси билан контактда бўлиб, суюкликларни сорбциясини таъминлайди. Ушбу турдаги тери қопламалари чандиқли тўқима миқдорини камайтириш учун хизмат қиласиди. Клиникаларда жарохат тикланишига олиб келувчи юқори самрага эга қопламаларга талаб катта ва долзарб бўлганлиги сабали, хозирги вақтда бундай такомиллаштирилган материаллар устида мухим изланишлар олиб борилмоқда.

Хозирга қадар икки компонентли синтетик тери қопламлари яратилган бўлиб, улар коллаген ва гликозаминогликан полисахаридларидан ташкил топган. Хайвонлардан, хусусан, буқалардан олинган коллаген полисахаридларга бириктирилади ва бунинг натижасида коллаген организмда сўрилиши секинлашади. Бу икки компонент кўпиксимон структурани хосил қилиб, тери қуви қатламини хосил қиласиди ва силикон билан қопланади. Бириктирилган қатламлар намлантирилиб жарохат юзаси қопланади, шундан кейин неодэрмис ички қатламга ўсиб киради, трансплантат эса секин аста парчаланиб боради. Шаклланган неодэрмис

терига ўхшаш яхши механик хусусиятларга ва нерв хужайраларига эга, лекин соч фолликуллари ва тер безлари бўлмайди. Неодэрмис ўсиши ва суний тери қопламини сўрилиши тахминан уч хафта вақтни эгаллайди, шундан кейин унинг силикон қатлами олиб ташланади ва эпидэрмис аутотрансплантати неодэрмис регенерациясини кучайтириш учун кўчириб ўтказилади.

Назорат саволлари:

1. Имплантат тўғрисида тушунча.
2. Аъзони ўрнини қопловчи ускунанинг номи нима?
3. Биопротез бу нима?
4. Одамданодамга аъзони ўтказишқандай аталади?
5. Аутотрансплантация бу нима?
6. Керамикани асосий хусусиятлари?
7. Тиббиёт учун кўлланадиган металларнинг хусусиятдари қандай?
8. Тиббиётда. Кўлланадиган биокермика турлари?
9. Биологик тўқима бу нима?
10. Полимер бу нима?
11. Полимерларнинг хусусиятлари нимадан иборат?
12. Қон томир эндопротезларига қандай талаб куйилади?
13. Биоинерт полимер бу нимани англатади?
14. Юрак клапанларига бўлган талаблар?
15. Хайвондан одамга кўчирилган тўқима қандай аталади?
16. Қандай адсорбентлар.ҳозирги махалда кўлланилади?
17. Қандай табиий полимерлар тиббиетда кўлланилади?.
18. Хорижий қон томир протезларини турларини айтиб беринг?
19. Қандай иплар хирургия учун ишлатилади?
20. Сўрилиб кетувчи ипларнинг номини айтинг?
21. Сўрилмайдиган ипларнинг номини айтинг?
22. Гемостатик имплантатларнинг номини айтинг?

Фойдаланилганадабиётлар:

1. Alvarez J. R./ Oxidized cellulose as the cause of an acute ischemic event after coronary revascularization.// Journal of Interactive Cardio Vascular and Thoracic Surgery. - 2014. - Vol. 11. - P. 488–489.
2. Azhar A. H., Azreen S. A., Mohammad Nor G. R., Amer H. K./ Oxidized Cellulose (Surgicel) As a Surgical Hemostat in Liver Injury: A Case Report and Literature Review.// International Journal of Surgical Research. - 2013. - Vol. 2 (3). - P. 21-23.
3. Bouras A. F., Truant S., Pruvot F. R./ Management of blunt hepatic trauma.// Journal of Visceral Surg. - 2015. - Vol. 10 (004). - P. 351-8.

4. Camy S., Condoret J. S., Montanari S., Rattaz A., Vignon M./ Oxidation of cellulose in pressurized carbon dioxide // The Journal of Supercritical Fluids. - 2010. - Vol. 51. - P. 188–196.
5. Carbon R. T, et al./ Fast-track Surgery of Recurrent Pneumothorax in Patients with cystic fibrosis-superiority of minimally invasive tissue management.// 7th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis. Medimond International Proceedings, Munich. - 2010. - 15–28.

2-мавзу: Эндоваскуляр диагностика ва даволаш усуллари.

Ишдан мақсад : Тингловчиларга хирургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтказиш, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар гурӯхларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Атеросклероз патогенезининг энг тарқалган назарияси Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясниковлар таклиф қилган нейрометаболитик назариядир. Гидрофил холестерин комплекси яратилишида бекарор липопротеин комплексларига - 3/4 қисми липидлардан иборат бета-липо протеидларга ва 1/4 қисми оқсил бўлган холестеринга катта аҳамият берилади. Уларнинг томирлар орқали бундай ташилиш усули ишончли эмас, комплекслар эримайдиган липидлар чўкиши билан осон парчаланади. Холестериннинг бу эстерлари эримайдиган комплекслар ҳолида артериялар интимасида тўхталиб қолади ва аста-секин йиғилиб, унинг деворига ўтади.

Атеросклерознинг Уругвай хирурги Пальме тавсия қилган гемодинамик назарияси нуқтаи назардан атеросклероз систолик қон тўлқини зарбларининг артериал деворни сурункали шикастлаши натижаси ҳисобланади. Бу артерияларнинг ҳимоя системаси ўз вазифасини адо этолмагандан рўй беради.

Атеросклерознинг тромбоген назариясини инглиз патологи Дугайт таклиф этган. Унинг тадқиқотларига биноан аортадаги тромблар аввал ғовак, сўнгра қонтакт фибриндан ташкил топган. Тромб юзаси эндотелий билан қопланади, шунга кўра у гўё томир деворининг таркибий қисмига ўхшаб, интимага жойланиб олгандай бўлади. Шундан кейин фибрин конденсацияси ва тромб ҳосил бўлиши юз беради. Фибрин йиғилиши такрорланади. Такрорланиш тез юз берса, фибриннинг бир қатлами иккинчи янги қатлами билан алоқага киришади.

Носпецифик аорта-артерит - томирларнинг система касаллиги бўлиб, асосий хусусияти аортада ва унинг шох тармоқларида стенозловчи, аневризматик ёки аралаш жараён ҳисобланади. Уни 1956 йилда Савори тасвиrlаган. Носпецифик аорта-артерийтнинг ҳақиқий тарихи япон врачи M. Такаясуниг 1905 йилда аорта равоги тармоқлари заарланишининг клиник тасвирини баён этишдан бошланган.

Аортитнинг аллергик табиатини ҳисобга олиб, қатор муаллифлар унинг аутоиммун келиб чиқиши тўғрисидаги тахминни баён қиласадилар. Айрим муаллифлар уни коллагенозлар қаторига киритадилар, чунки унда коллагенозга хос яллигланиш реакциялари, субфебрилитет, систем заарланиш, клиник полилорфизм, айрим мусбат лаборатория синамалари қайд қилинган. Бу касаликда, одатда, артериянинг бирламчи ташқи қатламлари заарланади, сўнгра жараён томирнинг бирмунча чуқур қатламларига тарқалиб, интимани қалинлаштирадиган иккиласми чуқур яллигланиш ходисалари юз беради. Аорта равоги артериялари касалликлари

Такаясу синдроми деган ном остида брахеоцефал артерияларни торайтирадиган ёки тутилиб қолишини келтириб чиқарадиган ва бош мия ҳамда қўллар ишемиясига олиб келадиган ҳар хил этиологияли касалликлар гурухи бирлаштирилади. Япон офтальмологи Такаясу 1908 йилда ёш аёлларда кўз турсимон пардаси артериясининг заарланиши ва қўлда пульс йўқлиги билан таърифланадиган томирлар касаллигини тасвиrlади. Адабиётда бу синдром кашфиётчи шарафига Такаясу деб аталди. Бу патология адабиётда бошқа номлар билан ҳам юритилади, улардан энг кенг тарқалгани «аорта равоги синдроми», «пульс йўқлиги касаллиги», «Марторелле синдроми», «ёш аёллар артериити», «Гигант хўжайраги артериит», «Такаясу синдроми» ва бошқалардир.

Бу касаликнинг анчагина тарқалганлиги ва прогнозининг ёмонлиги, мия инсультига ва даволаш усулларига оид қарашларнинг қайта кўриб чиқилиши муносабати билан унинг клиник аҳамияти етарлича мухимдир. Ишемик инсульт пайдо бўладиган беморларнинг тахминан ярмида бош мияни таъминлайдиган калла суюгидан ташқаридаги артерияларда заарланишлар бўлади. Атеросклерозда бош миянинг ишемик заарланишлари фақат артериал окклузияси стенози сабабли эмас, балки церебрал артерияларнинг атеросклеротик пилакчадан микроэмболияси натижасида ҳам ривожланади.

Этиологияси ва патогенези. Брахеоцефал артериялар тутилиб қолишни келтириб чиқарадиган этиологик омиллар бир неча гурухларга бўлиниши мумкин:

1. Артерияларнинг облитерация қиладиган касалликлари:

- носпецифик аорта-артериит;
- облитерацияловчи тромбангит;
- чакка артериити.

2. Аорта равоғи аневризмалари брахеоцефал артерияларнинг иккиламчи торайиши билан:

- атеросклеротик;
- захмли;
- қатламланадиган аневризмалар.

3. Аорта равоғи тармоқларининг ривожланиш нуксонлари:

- артерияларнинг ратологшик эгри-бугрилиги, оғизнинг сурилиш нуксонлари;
- артерияларнинг патологик эгри-бугрилиги, ковузлоклар хосил килиш ва ангуляцияси;
- аорта равоғи тармоқлари нуксонлари.

4. Артериялар компрессиясининг экстравазал омиллари. Атеросклероз ишемик синдромнинг энг кўп сабабчисихисобланади, беморларнинг тахминан 2/3 қисмида атеросклеротик келиб чиқадиган брахеоцефалик артерияларнинг заарланиши бўлади. Эркаклар аёлларга нисбатан 4 баробар кўпроқ заарланади. Атеросклерознинг муҳим хусусияти шундаки, бош миянинг калла суюгидан ташқаридаги бўлимларининг заарланиши интракраниал артерияларга қараганда 5 марта кўпроқ учрайди.

Уйқу артерияси бифуркацияси ва ички уйқу артериясининг бошланғич сегменти атеросклеротик пилакча ривожланадиган жой хисобланади. Иккала уйқу артерияси бир хилда кўп заарланади. Аксарият патологик жараёнга ўмров ости артериялари ҳам қўшилади, бунда чап артерияси ўнг артериясига нисбатан 3 баравар кўпроқ заарланади. Кўпинча bemорларда аорта равоғи тармоқларининг кўп сонли заарланишлари аниқланади.

Назорат саволлари:

1. Оёқлар юза веналарининг тромбофлебитининг клиник кўринишини айтиб беринг:
2. Қандай холларда оёқ юза веналарининг ўткир тромбофлебитида шошилинч жарроҳлик амалиёт кўрсатилади:
3. Оёқлардаги юза веналар тромбофлебитида қонсерватив терапиянинг асосий моментини айтинг:
4. Оёқлар ВВКда юза кўринишини шаклини санаб утинг:
5. Юза веналарнинг ўткир тромбофлебитини асосий симптомини айтинг:
6. Юза веналарининг ўткир тромбофлебитининг қайси шаклда Троянов-Тренделенбург операцияси килинади:
7. Тромбофлебит тушунчасига изоҳ беринг:
8. Коммуникант веналарга характерли белгини айтинг
9. Оёқлардаги веноз оқимини қийинлашувига қуйидаги факторлар сабаб булиши мумкин
10. Аорта равоги окклюзион касалликлари этиопатогенези.
11. Аорта равоги окклюзион касаликлари сабаблари нозолик турлари.
12. Аорта равоги окклюзион касаликлари ташхислашда кўлланиладиган асосий диагностик усуllар.
13. Бош мия сурункали ишемияси классификацияси.
14. Аорта равоги окклюзион касаликлари консерватив даволаш учун кўрсатмалар.
15. Аорта равоги окклюзион касаликлари оператив даволаш учун кўрсатмалар.
16. Аорта равоги окклюзион касаликлари оператив даволаш умумий принциплари.
17. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари этиопатогенези.
 - 1 Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликларисабаблари нозолик турлари.
 18. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари ташхислашда кўлланиладиган асосий диагностик усуllар.
 19. Оёқлар сурункали ишемияси классификацияси.
 - 2 Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари консерватив даволаш учун кўрсатмалар.
20. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари даволаш

учун кўрсатмалар.

21. Аорта ва оёқ артерияларининг окклизион касалликлари даволаш умумий принциплари.
22. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар сабаблари
23. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар клиникаси ва таснифи
24. Дифференциал диагностика
25. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар даволаш усуллари
26. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар профилактикаси

Фойдаланилганадабиётлар:

1. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
2. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.
3. <http://www.tma.tmn.ru/Vestnik>
4. <http://medi.ru/doc/83.htm>
5. <http://www.rmj.net/index.htm>
6. <http://www.consilium-medicum.com/media/refer>
7. <http://www.mediasphera.aha.ru>

З-мавзу:Юқориқувватли лазерларни хирургияда қўллаш ва афзалиги.

Хирургияда лазер ёрдамида амалга ошириладиган операция усуллари бўйичабилим ва кўникмаларни чуқурлаштириш.

Ишдан мақсад : Тингловчиларга хирургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтқазиш, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар гурӯхларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Турли хилдаги лазер типлари, шунингдек лазер нурланиши кўрсаткичларидаги ўзгаришлар ушбу муаммони ўрганишдаги турли натижаларга эришишга сабаб бўлди.

Юқори энергияли лазерлар ўзидаги кучли термик таъсирга кўра микроорганизмларнинг барча турларини батамом йўқотиш имкониятига эга, бироқ термик таъсир макроорганизм тўқималарининг деструкциясиға олиб келиши хам мумкин. Шунга кўра, микроорганизмлар сонининг камайтириш билан бир қаторда макроорганизм хужайраларининг тузилиши хамда функциясини сақлаб қолишга қаратилган мақбул дозани аниқлаш юзасидан текширувлар ўтказила бошланди.

Карбонат ангидридли лазер йирингли хирургияда тўқималарни кесиб очиш, яшашга ноқобил қисмларни олиб ташлаш, шунингдек йирингли ўчоқни стерилизация қилиш мақсадида қўлланилади. Фокуси топилган, кучланиш зичлиги $1\text{Вт}/\text{см}^2$ гача бўлган нурланиш бактерицид самара кўрсатиши хамда микроорганизмлар сонини 80% гача камайтира олиши аниқланди. Бунда тўқималар 200 мкмгача бўлган қалинликда юза коагуляцияга учрайди ва ярани битиш жараёни издан чиқмайди. Бу усул проктологияда, юмшоқ тўқималаринг йирингли касалликларида, куйишларни даволашда, шунингдек ифлосланган жарохатни тикишдан аввал қўлланилади.

Лазерларнинг бошқа турларидан(АИГ-неодимовий, аргонли ва б.қа.) жарохат инфекциясиға бактерицид таъсир кўрсатишида фойдаланиш амри маҳолдир, чунки термик таъсир чуқур жойлашган тўқималаргача тарқалиб, репарация жараёнини ёмонлаштиради.

Жарохатни тозалаш учун паст энергияли лазерлардан фойдаланиш энг истиқболли йўналиш саналади . Қизил диапазондаги нурланишининг давомли экспозициясини *in vitro* микробларнинг хаёт фаолиятига таъсири унчалик ахамиятли эмаслиги аниқланган. Гелий-неон лазер нурланишининг *in vitro* микроорганизмларнинг ўсишини тўхтатувчи нисбий имконияти мавжудлиги хақида бошқа фикрлар хам мавжуд. Шу билан бирга *in vivo* шароитида гелий-неон лазердан фойдаланиш кўпгина холларда жарохатда бактеријлар ўсишини камайишига шароит яратад. Шундай маълумотлар ушбу типдаги лазерни септик яллигланишли bemорларнинг қонини нурлантириш учун, операцион жарохатдаги асоратлар, юқумли касалликлар, зотилжамни даволашга қаратилган ишларда келтирилган. Айрим илмий ишларда эса лазерларни инфекцияларга қарши кенг қўллаш борасида огохлантирилади, чунки уларнинг маълумотларига кўра лазерлар микроблар хамда вируслар ривожланишини фаоллаштириши мумкин.

ИК-диапазондаги ярим ўтказгичли лазерларнинг микроорганизмларга таъсири хақида шу каби турли фикрлар бор. Давомийлиги 128 с бўлган, 80 Гц частотали ярим ўтказгичли “Узор” лазерининг *E. coli* микроблар культурасига *in vitro* таъсирини ўрганиш, ушбу кўрсаткичларда микроорганизмлар ривожланишининг ортишини кўрсатди. У холда, қай

тарзда, изланишларда ўша тартибдаги "Узор" лазери бактериостатик ва бактерицид самара күрсатиши аниқланды. Ярим ўтказгичли лазерлар йириングли яллиғланиш ва юқумли касалликлар: йириングли яра, куйишлар, зотилжам, септик холатларда қонни нурлантири ва б.қ.ларни даволашда ижобий самара берганлиги хақида маълумотлар бор.

Изланувчиларнинг энг катта қизиқишлиарини ультрабинафша спектрдаги 337нм нурланиш тўлқин узунлигига эга бўлган азотли лазерлар жалб қилди. Дастребаби изланишларданоқ лазерларнинг бошқа турлари билан таққосланганда унинг бактериостатик ёки бактерицид самара күрсатишдаги фаоллиги аниқланды. Нурлантириш тартиби, давомийлиги ва муолажалар сонидаги сезиларли тафовутга қарамай, стафилококк, стрептококк, ичак таёқчали хамда аэроб ва анаэробларнинг баъзи турларига нисбатан ижобий самара олинди]. Бактерицид таъсир күрсатувчи нурланишнинг энг кам дозаси 3-7 Дж/см²га тенг бўлган бўлса, у холда қандай қилиб талайгина микроорганизмлар 1-2 баробар юқори дозада халок бўлиши мумкин. Бактерицид самарани ортиб боришини хисобга олиб, изланувчилар нурланиш дозаси ва кучланиш зичлигини, шу билан бирга нурлантириш муолажаларининг сони хамда частотасини оширишни тавсия этадилар.

Азотли лазер нурланишининг барча ортиб борувчи дозалари клиник амалиётда қўлланила бошланди. Шундай қилиб, йириングли жарохатларни нурлантириш учун 1-10 Дж/см² диапазондаги доза хамда 2тадан 10 тагача муолажа буюрилади. Азотли лазерлардан фойдаланиш қатор холларда баъзи юқумли касалликларни даволашда ягона даволаш усули хисобланган Қонни ультрабинафша нурлантириш борасида олиб борилувчи назоратсиз изланишларда жуда катта хавф мавжуд, бунда дозани оширилиши иммун танқислик холатига олиб келиши мумкин. УБ манбалардан бир неча баробар юқори кучланишга эга бўлган азотли лазер хозирги даврда клиникада қонни нурлантириш мақсадида 15 дақиқадан то 45 дақиқагача давом этувчи хар кунги муолажаларда қўлланилмоқда.

Йириングли инфекцияни даволашда НЛИ имкониятларига қарамай кўпгина изланувчилар уни бошқа медикаментоз препаратлар ва антибиотиклар билан бирга қўллаш зарур деб хисоблайдилар НЛИни микроорганизмлар ривожланишини тўхтатиш учун қўллаш бўйича адабиётлардаги маълумотлар тахлили қўйидагиларни аниқлашга ёрдам берди : НИЛИнинг барча турлари дозалашга боғлиқ холда, стимуллаши, таъсир күрсатмаслиги ёки микробларнинг хаёт фаолиятини издан чиқариши мумкин;

аниқ кўрсаткичларнинг, шунингдек тажриба учун шароитнинг бўлмаслиги кўпгина тажриба натижаларини таққослашга имкон бермайди, бу эса ягона натижа билан чекланишга сабаб бўлади;

микроорганизмларга НЛИ нинг таъсир нуқтаи назаридан *in vitro* ва *in vivo* да олинганлар билан маълумотлар орасида параллелликнинг мавжуд эмаслиги эҳтимол, лазер нурланишининг макроорганизмнинг химоя кучларини ошириш орқали билвосита самара кўрсатиши билан боғлиқ;

лазер нурланишининг кўрсаткичлари ва дозасини танлашда макроорганизмнинг хужайравий хамда гуморал химоя омилларини кам даражада шикастлаши мумкин бўлган “бўсаға доза”дан бошлаш мухимдир.

Тажрибада НЛИнинг микрофлорага таъсир имкониятларини баҳолаш мақсадида биз томондан қуидаги вазифалар қўйилди :

Паст энергияли лазерларни йирингли ярадаги микрофлорага таъсир самарадорлигини аниқлаш;

Йирингли инфекцияда терапевтик таъсир дозаларидан келиб чиқсан холда, лазертерапия принципларини яратиш;

Меъданинг патоген микрофлорасига(*Helikobakter pilori*) нисбатан НИЛИ имкониятларини ўрганиш;

Текширув материаллари ва усуллари Лазерли ускуна: гелий-неонли лазер, ярим ўтказгичли лазер "Узор", азотли лазер.

Культураларни лазер ёрдамида нурлантирганда қуидаги таъсир майдони аниқланди : ГНЛ- 10мм, ЯЎЛ- 1,5см, азотли - 0,3см.

Лазерларнинг кучланиши : ГНЛ- 5мВт, Узор-Римп- 5Вт, v - 80Гц, азотли-3мВт, v - 100Гц.

Нурлантиришнинг кўрсатилган тартиби ишлаб чиқарилаётган лазерли ускуналарнинг стандарт ишчи тавсифларига асослангандир.

Синалган аэроблар: *M. Lysoideicticus*, *S. AureusR*, *P.aeryginosa* 216, *E.Coll M-27* *S.Epldermalls* 295, *S.Aureus* 418, *E.Coll*, *S.marcescensM* Зactills *subtllls,micrococcus lisoideikticus*; анаэроблар:*Clostridium perfringes*, *Bacteroides fragllis*. *Helicobacter pylorndl*; замбуруғлар оиласи: *Candida*.

Анаэроб микроорганизмлар 24 соат давомида озиқ муҳитли агарда ўстирилди, сўнгра физиологик эритма ёрдамида стандарт бўйича 1 мл да 10^6 10^7 10^8 10^9 10^{10} қонцентрацияларда микробли қоришли тайёрланди. Экма қонли агарли косачада ўтказилди. Косачадаги аввалдан белгиланган соҳаларда нурланиш давомийлиги 1-25 дақиқагача чўзилди. Кейин эса экмали косачалар $37,0^\circ$ С хароратда сақланди. Аэроблар оддий шароитга,

анаэробларни эса анаэростатга қўйилди. Лазер таъсирини нурлантиришдан сўнг турли зичликдаги микроб газонида ўсиш ингибицияси соҳасининг катталигига кўра баҳоланди.

Текширув натижалари Гелий-неонли лазер: лазер билан 10,20,30,60 дақиқа давомида нурлантирилганда бактериостатик ва бактерицид самара олинмади. Ўша пайтда нурланишнинг энг кам муддатларида (10 мин) микрофлора ривожланишининг тезлашуви аниқланмади. Ярим ўтказгичли лазер "Узор": унинг нурланиш давомийлиги 128,256,600 секунд бўлиб, лазер нурланиши бир маротаба қўлланилганда микроорганизмларнинг ўсишини камайиши аниқланмади. Шу билан бирга, нурланишнинг ушбу тартибида микроорганизмларнинг ўсишининг тезлашуви хам кузатилмади.

Азотли лазер: УБ- нурланишни микрококк, стафилококк, ичак таёқчаси, кўк йиринг таёқчасига нисбатан сезувчанлиги теширилганда 5 минутли экспозициядан сўнг (қонцентрация 10^{10} мт/ мл) ўсиш тўхтаган соҳа аниқланди.

Кандидага нисбатан таъсир ўрганилганда ўсишнинг тўхташи экспозициянинг 20-дақиқасида кузатилди.

Қўлланилган экспозицияларда *Bacillus subtilis* штамми лазер нурланишга сезгир эмас эди.

Анаэроблар (бактероидлар ва клостиридиялар) ўртача сезувчанлик намоён қилишди. Улар 10 дақиқалик нурланишдан сўнг ўсиш ингибиция соҳаларини хосил қилишди.

Турли зичликдаги микробли газонлар таққосланганда агар муҳитига экилган микроорганизмлар миқдори (10^{10} дан 10^6 мт/млгача) камайгунига қадар ўсиш ингибиция соҳалари кенгайиши (3 мм гача) хамда унинг тиниқлигининг ортиши ("стерил" доғгача) кузатилди, бунда у кратерсимон ўпирилиш кўринишини касб этади.

H.Pylorildi ни лазер нурланишига сезгирлиги текширилганда, азот лазерли нурланиш бошқа НИЛИ дан фарқли ўлароқ экспозициянинг 45-сониясиданоқ юзага келувчи яққол бактерицид таъсирга эгалиги аниқланди.

НЛИнинг *in vitro* микроорганизмлар хаёт фаолиятига таъсирини ўрганиш натижалари гелий-неон ва ярим ўтказгичли лазер "Узор" терапевтик дозаларда патоген микроорганизмлар ривожланишига жиддий таъсир кўрсатмаслигини кўрсатди.

Азотли лазер гарчи патоген микробларнинг баъзи турларига нисбатан бактерицид ва бактериостатик таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, азотли лазернинг H.Pyloridiga нисбатан бактерецид таъсири ундан гастродуоденал хеликобактериози мавжуд bemорларни даволаш сифатида фойдаланишга асос бўлади.

Олинган натижаларнинг тахлили. Бизнинг текширувларда микрофлорага таъсир қилишнинг асосий шарти максимал терапевтик дозани танлаш хисобланган, у холда нима учун адабиётлардаги маълумотларда ушбу қоидага доим хам риоя қилинмайди. Макроорганизм тўқималарида алтерацияловчи таъсирнинг ортиши табиийки, йириングли ярани битиш жараёнини секинлаштиради. Шунга кўра, биз бактериостатик самаранинг хақиқий манзарасини аниқлашга харакат қилдик. Микролар ўсишининг турғун босқичи ёки табиий ўлимида хатто аҳамиятсиз омил хам ғоят халокатли таъсир кўрсатиши мумкин

Бир вақтнинг ўзида лазерларнинг яллиғланишга қарши ва қўзгатувчига таъсири хисобга олинади, *in vivo* синовларда бактерицид самара иммунитетни фаоллаштириш орқали билвосита чақирилади. Авж олган йириングли яллиғланиш инфекциясига таъсир кўрсатилганда янада кўпроқ самарани азотли лазердан кутмоқ керак. Аммо, асосий қоида бактерицид дозадан паст бўлган, стимулловчи дозани қўллашдан иборат бўлиши керак. Лазерли нурланишнинг бактерицидлик даражасидан мумкин қадар қалин пиоген қатламли йириングли бўшлиқлар мавжуд холатларда фойдаланиш мумкин. Турли хилдаги лазерлар учун тўқималарнинг оптик хоссаларидан келиб чиқиб, қуйидагиларни аниқлаш мумкин: карбонат ангидридли лазернинг бактерицид самараси пиоген қаватнинг қалинлиги 1 ммдан ортиқ бўлганда, ультрабинафшаники эса 400мкм дан кам бўлмаган холларда намоён бўлади.

НИЛИнинг H.Pyloridiga таъсири борасидаги ўзига хос изланишлар ўтказишга имкон ушбу микроорганизмни соф культураси ажратиб олингандан сўнг пайдо бўлди. УБ нурланишни рухсат этилган максимал дозанинг хатто минимал қисми қўлланганда хам халокатли таъсир кўрсатиши мумкинлиги хақида қизиқарли далил топилди. Ушбу, мутлақо янги далил хеликобактериоз билан қўшилиб келган яра касаллиги мавжуд bemорларни даволаш замирида ётади. Бундай ёндошув яра касаллигининг рецидивлари хамда операциядан кейинги асоратлар ривожланишини олдини олишга имкон туғдиради, боиси, қатор муаллифларнинг маълумотларига қараганда, ушбу асоратларнинг сабаби бўлиб кўпинча хеликобактериоз хизмат қиласи.

Назорат саволлари:

1. Лазер ибораси нимади билдиради?
2. Юқориқувватли лазерларнинг турлари?
3. Тўқималарни кесиш учун мулжалланган лазер ускунанинг номи?
4. Тўқималарни коагуляция килиш учун лазер тури?
5. Косметология учун кайси лазер кўлланади?
6. Лазер нурида муҳофаза усуллари?
7. Лазернинг қувватини аҳамияти?
8. Лазер нурининг дозасини хисоблаш усули?

Фойдаланилган адабиетлар:

1. Olivo, M., Wilson, B. C., “Mapping ALA-induced PPIX fluorescence in normal brain and brain tumour using confocal fluorescence microscopy,” Int J Oncol, Vol. 25, 2014, pp.37–45.
2. Pandey, R. K., and G. Zheng, “Porphyrins as Photosensitizers in Photodynamic Therapy,” in The Porphyrin Handbook, K.M. Kadish, K. M. Smith, and R. Guilard, (eds.), Vol. 6, pp157–230, Boston: Academic Press, 2014.
3. Pandey, R. K., et al., “Nature: a Rich Source for Developing Multifunctional Agents.Tumor-Imaging and Photodynamic Therapy,” Laser Surg. Med., Vol. 38, No. 5, 2015, pp.445–467.
4. Pandey, S. K., et al., “Multimodality Agents for Tumor Imaging (PET, Fluorescence) and Photodynamic Therapy. A Possible ‘See and Treat’ Approach”, J. Med. Chem., Vol. 48, No. 20, 2015, pp. 6286–6295.

4-мавзу: Хирургик касалликларида фотодинамик даволаш усуллари.

Ишдан мақсад: Тингловчиларга хирургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтқазиши, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар групкаларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Ушбу чоралар индивидуал химоя воситалари ва 2- синф биохавфсизлик хоналаридан (кўлқоплар, лаборатория халати, химоя қўзойнаклари ва ниқоб) фойдаланишдан иборат. Тирик микроорганизмларни сақловчи барча

материаллар утилизация қилинишдан олдин автоклавда стерилизация қилиниши керак. Дезинфекцияловчи аэрозоллар ўриндиқ ва тортмали жавонларни тозалаш учун қўлланилиши зарур. Тортмали жавонларда контаминацияни олдини олиш учун ультрабинафша нурлардан мунтазам равища фойдаланиш зарур.

Микроорганизмлар:

1. Грамм- мусбатбактериялар -*StaphylococcusAureus*-8325-4
2. Грамм- манфийбактериялар-*EscherichiaColi*K-12

Жихозланиши :

1. Шейкер инкубатори
2. Стационар инкубатор
3. 2 -синф биологик хавфсизлик хонаси
4. Центрифуга
5. Автоклав
6. Ёруғлик манбаи- нурлантиргич
7. Кучланишни ўлчагич
8. Вортекс
9. Спектрофотометр (шарт эмас, лекин фойдали).

Реагентлар ваэритмалар:

1. Юрак- мия экстракти (ЮМЭ) (Fisher Scientific, Waltham, MA).
2. Фосфатбуферли эритма(ФБЭ) (Fisher Scientific, Waltham, MA). ФБЭ микробхужайраларини юништариштириш аксадида қўлланилади.
3. Ўстириш учун мухитлар: 200 мл дистилланган сув ва 6г ЮМЭ. Барча суюқ мухитлар фойдаланишдан олдин 15 дақиқадавомида 120° Сда автоклавланади. Қаттиқ озиқ мухитлар:

1,5% агарқүшилгансуюқозиқмухитлар. Микробиологик агар автоклавла шгача суюқ озиқ мухит билан аралаштирилади. Қаттық мухитлар Петри косачасига қуилади ва қаттық холга келгунга қадар қолдирилади.


4. Метилен кўки (МС, 3,7-бидиметиламино-хлорид фенотиазина) (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, штат Миссouri).
5. Azure (Aldrich), Azure B (Aldrich), Azure C (Sigma-Aldrich)
6. 1,9 - диметил-метилен кўки (Sigma-Aldrich)
7. Янги-метилен кўки N, эркин шаклдаги рух (Sigma Aldrich)
8. Толуидин кўки O (Sigma-Aldrich).






Санаб ўтилган барча фотосенсибилизаторлар дистилланган сувда эрийди. Текширув учун 1 mM концентрациядаги фотосенсибилизаторнинг сувли эритмаси тайёрланади ва қоронгу жойда 4°Cда чекланган вақт давомида сақланади (бир неча кун). Барча фотосенсибилизаторлар юкори даражада ёруғликка сезгир бўлганликлари сабабли қоронфижойда сақланди.

Ёруғлик манбаси:


Ёруғлик манбаидан чиқувчи нурлар оптик толага тўғриланган, фильтр билан таъминланган нокогерент чўғланма лампадан иборат(LumaCare, Ньюпорт Бич, Калифорния).Барча фотосенсибилизаторлар учун 1Вт атрофида ёруғлик билан таъминланган, 1,5 смдан 5 смгача бўлган диаметрли доғга йифилувчи, 660 ± 15 нмли фильтрдан фойдаланилди.

Фотосенсибилизаторларнинг кимёвий тўзилиши:







1,9-Диметил-Метилен кўки



Толуидин кўки





Жадвал . Фенотиазин бўёқларининг кимёвий хоссалари

Бўёқ номи	Липо-филлиги (Log P)	500-700 нм диапазондаги абсорбция чўққиси	Флюоресценция спектри
Метилен кўки	-0,10	667	684
Азур А (AA)	+ 0,70	622	652
Азур В (AB)	-0,09	647	671
Азур С (AC)	- 0,40	620	644
Янги метилен кўки	+1,20	628	653

1,9 Диметил метилен кўки	- 0,21	649	671
Толуидин кўки	-0,21	617	666

Кучланишни ўлчагич :

Ёруғлик доғининг интенсивлигини кучланишни ўлчагич ёрдамида хисоблашган (модель DMM, Санта-Клара, Калифорния) ва у ёритилганлик даражасини хисоблаш учун қўлланилади (кучланиш зичлиги мВт/см²).

Бир мартали пластиклар :

Серияли эритиши учун бир мартали пластикларнинг кўп миқдоридан фойдаланилади:

1. Серияли эритишлиарни 200 мкл сариқ учликлардан фойдаланган холда ўтказиш учун 1,5 мл сифимга эга бурама қопқоқли микроцентрифугали идиш (Fisher Scientific, Waltham, MA).

2. Колонияларни хисоблашда агарли мухитдаги серияли экмаларни инкубацияси учун қўлланиувчи, юзаси 10 × 10 см бўлган пластикли Петри косачалари(Fisher Scientific, Waltham, MA).

In Vivo антимикроб ФДТ текширувлари Тажрибалар учун одатда, ўртacha 20 грамм оғирлиқдаги, 6 хафталик сичқонларнинг урғочиларидан BALB / (Charles River Lab, Уилмингтон, Массачусетс) фойдаланилади.

Сичқонларнинг қорин пардаси ичига кетамин / ксилазин (100 мг / кг; 10:1) аралашмасини юбориш орқали анестезия ўтказилди. Сичқонлартанасининг орқа томони қирилди ва кейинги куни жезли блокни қўллаган холда куйиш модели яратилди (Майами, Флорида).

Микроб суспензиясини тайёрлаш. Экма учун мухит тайёрлаш ва шундан сўнг автоклавлаш (бактериялар учун юрак-мияли бульон). Юрак-мияли

бульонга 1,5%ли микробиологик агар қўшиб қаттиқ мухит тайёрлаш, сўнгра уни 10×10 см ўлчамли квадрат Петри косачаларига қўйиб чиқиш

Стерил илмоқчадан фойдаланган холда агарли пластинадан битта колония олиш ва 3мл ЮМБ сақловчи 15 мл центрифугали пробиркага жойлаштириш. Уни $t = 37^\circ\text{C}$ даги шейкер инкубаторида бир кечага қолдирилади. Тезда ўсуви турларида КОЕни 15-30 дақиқа давомида икки хисса оширилади. Дастребки экилган материал бир кечага қайта экилганда 10^9 КОЕ/млда хужайрага зичлик беради. Хужайра зичлигини 600 - 650 нмли спектрофотометр ёрдамида ўлчаб тахминий хисоблаш мумкин. Бу оптик зичлик кўрсаткичининг чегараси 0,6 атрофида бўлиб, микроорганизм хужайраси зичлигига 10^8 КОЕ /мл мос келади. Стационар культуралар соғ мухитда тахминан 1 соат мобайнида, 100:1 нисбатда суюлтирилгандан сўнг янгиланиши керак. Бактериал хужайрали чўқмалар центрифугалаш йўли орқали ажратиб олинади (13690 об/дақиқа 5 дақиқа давомида). Кейин эса стерил ФБРда исталган зичликка эришилгунга қадар қайда суспензияланади (коида бўйича, 10^8 КОЕ / мл).

Фотосенсибилизаторлар билан инкубация:

Хар бир фотосенсибилизатор учун маълум қонцентрациядан фойдаланилади, биз тилларанг стафилакокк (*S.aureus*) учун 10 мкМ, кўк иириング таёқчаси (*P. Aeruginosa*) учун эса 1млМ қонцентрацияни тавсия этамиз. Инкубацион давр қисқа бўлиши мумкин, 15 дақиқали инкубация кўпгина фотосенсибилизаторлар учун мақбул муддат эканлиги аниқланди. Фотосенсибилизаторли хужайра суспензияси ёритилгунгача ёки акси бўлгунга қадар "washing" усулини қўлланилади. Микроб суспензияли фотосенсибилизаторларни ёруғлик нуридан химоя қилиш учун алюмин фольгадан қоплама мақсадида фойдаланилади.

Иллюминация:

Нурлантириш ўтказишнинг энг яхши усули бу 24 – ёки 48-ўйиқчали планшетда иллюминация ўтказишдир. Ёруғлик дөгини бир хил тўртта тирқиши диаметрини 3-4 смга мослаган холда созлаш мумкин. Ёритилганлик 100 мВт/см² (энергия зичлиги) бўлганда хар дақиқада 6 Дж/см² дан етказиб турилади.

Тажрибанинг ўзига хос хусусиятлари

Тажрибаларнинг бир неча вариантлари ушбу усульнинг самарадорлигини тасдиқлаш мақсадида қўлланилади. Эритилган фотосенсибилизатор (МК) ва бактериал қоришмали биринчи суспензияни центрифугалаш ва кейинчалик ФБРда чўкмани қайта суспензиялаш йўли орқали, “washing” (ёки йўқ) усулида текшириш мумкин. 13690 об./дақиқа тезлиқда, 5 минут давомида центрифугаланади ва бактериал қоришмани ФБР билан бир хил хажмда қайта суспензияланади. Фотодинамик заарсизлантиришнинг иккинчи текшириш усули инкубацион аралашмадаги фотосенсибилизатор қонцентрацияси ва 660нм спектрли нурланишга эга бўлган, 10Дж/см² дозали ёруғлик нурланиши (0,3дан 30мкМгача, тилларанг стафилакокк учун расмда кўрсатилган) орқали амалга оширилади. Бундан ташқари, фотодинамик текширув ўтказишнинг яна бир усули бу инкубацион аралашмада ФС қонцентрациясини доимий сақлашдир (1 мМ МК кўк йиринг таёқча бўлганда). Бундай холатда 320 Дж/см² га етувчи нурланишнинг кучланиш зичлиги ўзгартирилади.

Серияли суйилтиришлар:


Доза-реакция графигини тўзиш учун хар бир суюлтиришдан кейинги яшовчанлик белгилари ўрганиб чиқилади. Биринчиси- хужайраларнинг бирламчи-назорат суспензияси, иккинчиси- МК билан 15 дақиқали инкубациядан кейинги холат(фотосенсибилизаторнинг қоронгулик захрини аниқлаш учун), кейинги эгри чизик- нурланиш давомийлигига

кўраўзаришларни ифодалайди (масалан, 5, 10,20 ва 40 Дж/см²). Микроб хужайра суспензиясининг хар бири стерил ФБРда индивидуал равишда беш маротаба, ўн каррали, серияли суюлтиришдан ўтказилади. Қуйидаги суюлтирилган эритмаларга эришилади: 1 ×, 10 ×, 100 ×, 1000 ×, × 10000 ва 100000. Микродозаторда хар бир эритмадан олинган 10 мкл хажм Джетт усулида, горизонтал холда Петри косачасидаги агарли пластинка юзасига, тарам-тарам қилиб жойлаштирилади. 24 соатли инкубациядан сўнг пластиналар саналади. Идеал холда хар бир пластинада икки ёки уч қаторни санаб чиқиш мумкин, натижага эса 10га қўпайтириш ва хар бир эритмада КОЕнинг ўртacha қийматини хисоблаб топиш орқали эришилади.

Фракциянинг яшовчанлик қиймати хужайра назорат суспензиянинг (тўлиқ назорат) КОЕ / млда фотодинамик зарарсизлантирилишидан кейин КОЕ/ млни бўлиш йўли орқали олинади. Шунингдек, фотосенсибилизаторсиз ёруғлик захрининг яшовчанлик эгри чизифи ўзгаришини тўзиб чиқиш мумкин. Бизнинг натижалар билан мутлоқ назорат ўртасида сезиларли тафовут аниқланмади.

Чизма МК ФДТнинг *in vitro* текширувларини иллюстрация

қиласи:



Назорат саволлари:

1. ФДТ тугрисида тушунча
2. Фотосенсибилизаторлар турлари?
3. Ўзбекистонда қўлланилиши мумкин бўлган фотосенсибилизатор?
4. Метилен кўки хусусиятлари?
5. Метилен кўки билан қандай нурлантирувчи ускунани қўллаш мумкин?
6. ФДУ-1 ускунанинг характеристикалари?
7. ФДТ даволаш методикаси қандай?
8. ФДТ самарадорлиги?
9. ФДТга қарши курсатмалар?
10. ФДТ асоратлари қандай бўлиши мумкин?

Фойдаланилган адабиетлар:

1. Halliwell, B., and J. M. C. Gutteridge, Free Radicals in Biology and Medicine, Third Edition, New York: Oxford University Press, 2015.
2. Hamblin, M. R., and Hasan, T., "Photodynamic therapy: a new antimicrobial approach to infectious disease?", Photochem Photobiol Sci, Vol. 3, 2014, pp. 436–450.
3. Hamblin, M. R., et al., "Optical monitoring and treatment of potentially lethal wound infections in vivo," J Infect Dis, Vol. 187, 2013, pp. 1717–1726.
4. Hamblin, M. R., et al., "Polycationic photosensitizer conjugates: effects of chain length and Gram classification on the photodynamic inactivation of bacteria," J Antimicrob Chemother, Vol. 49, 2014, pp. 941–951.

КУЧМА МАШГУЛОТ

1-мавзу:Хирургияда имплантатларни қўллашимкониятлари.

Ишдан мақсад: Тингловчиларга хинургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтқазиш, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар гурухларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Хозирги кунда реконструктив хиругия, биоматериалларни кенг қўлловчи соҳа бўлиб, турли тўқима ва аъзолар нуқсонларини реконструкция қилиб, bemorлар хаёт сифати даражасини трансплантат ва биологик суний аъзолар қўлламасдан яхшилаш имконини беради.

Юрак-қон томир (қон айланиш) тизими, тананинг барча мухим вазифаларини таъминлайди. Юрак коронар томирлари касалликлари юрак-қон томир тизимида энг кенг тарқалган патология хисобланади. Юрак – қон томир тизими касалликлари етакчи ўринда бўлгани учун, тиббиётда қўлланиладиган материалларнинг йирик гурухини юрак – қон томир хиругияси учун ишлатиладиган материаллар ташкил қиласди. Уларнинг қўлланилиш соҳаси кенг бўлиб – булар ишлаб чиқаришда қон сақловчи идишлар, игна ва шприц, томир катетерлари, сунъий юрак клапанлари, сунъий қон айланишини таъминловчи тизимлар хисобланади. Қон билан алоқада бўладиган материаллардан таёrlанадиган протезларга юқори талаб қўйилади. Протезларни қон билан уйғунликда ишлатиладиган материаллар табиати ва ишлаб чиқариш технологиялари шунингдек, бир қатор омилларга боғлиқ. Шунинг учун, хеч тасодиф эмаски, тиббиётда реконструктив хиругиянинг энг ривожланган соҳаси бу кардиохиругия хисобланади.

Синтетик биотурғун полимерлар:

Экстракорпорал қурилмалар учун акрилат материаллар.

Юрак клапанлари ва сунъий юрак элементлари учун эпоксид бирикмалар.

Қон томирларининг протезлари, катетер қопламалари учун фторуглеродлар.

Чоклар учун полиамиллар.

Экстракорпорал қурилмалар учун конструкцион поликарбонатлар.

Юрак клапанлари, сунъий юрак элементлари учун полиамид.

Юрак клапанлари ва сунъий юрак элементлари учун полисульфонлар.

Катетер, сунъий юрак учун полиуретан.

Биопарчаланувчи полимерлар:

Дорилар учун полиангидрид.

Дорилар учун поликапролактан.

Чоклар учун гликолид ва лактидларнинг сополимерлари.

Дорилар учун полигидроксилкантлар.

Табиий полимерлардан материаллар:

Боғланган албумин қопламалар томир протези учун, контрастли восита ултратовуш ташхиси учун

Ацетат ва целюлоза гидрат диализ учун мембраналар яратишда

Хитозан қопламалар олишда

Коллаген, еластин, гиалуроник кислота, эластик қопламалар олишда ишлатилиди.

Металлар ва уларнинг қотишмаларига:

Кобалт хром қотишмалари сим ўтказгичлар, электродлар

Хромланган никел қотишмалари

Хотира қотишма шакллари

Зангламас пўлат Тантал

Тантал ва титан қотишмалари

Титан ва никел қотишмалари

Керамика, ноорганик, силикатлар

Монокристал алюминий оксиidi (Сапфир)

Юрак клапанлари

Углеродли материаллар:

Пиролитик углерод (паст харорат ва ултра паст харорат изотропик) юрак клапанлари, қопламаларда ишлатилиди

Томирда ишлатиладиган материаллар ва эндопротезлар учун асосий қўйиладиган талаблар шундан иборатки, улар юқори даражада қон билан мосланувчан бўлиши керак.

Қон билан уйғунлиги кўп омилларга боғлиқ:

- тури ва ишлатиладиган материаллар хусусиятлари;
- ишлаб чиқариш технологияси, эндопротез шакллари ва ўлчами;
- физик ва механик хусусиятлари, эластиклик;
- юза хусусиятлари;
- имплантация жойи;
- протез имплантация жойида гемодинамик шароити;
- операциядан кейин бемор холати ва жарохатланган тўқималарнинг битиш жараёнини;
- беморнинг қон ивиши, антитромбоген даволаш усули;
- инфекция ва операциядан кейинги асоратларни ривожланиш эҳтимоли.

Полимер ва бошқа биологик материаллар юрак иш фаолиятини яхшилашда, юрак чап қоринча вазифасинин ўташ, хамда юрак электростимуляциясида кенг қўлланилади. Био ва қон билан уйғун полимер материалларни ишлаб чиқариш соҳасидаги тараққиёт янги технология тўқима инженерияси билан бирга олиб бориладиган изланишлар юрак – томир хирургияси учун катта имкониятлар беради.

Юмшоқ тўқималар ва ички аъзолар реконструкцияси учун

ишлатиладиган материаллар

Юмшоқ тўқима дефектларининг реконструкциясини бир неча усул билан амалга оширилиши мумкин. Нуқсон ўрнига узоқ вақт хизмат қилиши учун олдиндан керакли ўлчам ва шакилдаги биотурғун имплантатлардан фойдаланиш мумкин. Нуқсонларни бартараф қилишда иккинчи ёндашув, бу шу жойларга қотувчан полимер киритиш, яъни бундай полимерлар мономер (гел) эритмаси шаклида бўлиб, нуқсон жойига юборилгандан кейин полимерланишга учрайди ва керакли шакилни эгаллайди. Агар бунда биопарчаланувчи материаллардан фойдаланилса, секин аста (уларнинг парчаланишига кўра) нуқсон ўрнида пайдо бўлган тўқималар билан тўлдирилади. Ваnihоят янги тўқималар билан аста-секин тўлдириш учун мўлжалланган биопарчаланувчи материаллардан тўзилган, олдиндан шакилланган қонструкциялардан фойдаланиш мумкин. Янги материалларни тадбик қилмай туриб абдоминал хирургияда қорин девори пластикаси,

операциядан кейинги битишмалар, ўт йўллари реқонструксияси ва протезлаш жараёнида хирургик натижаларни яхшиланишига эришиш мумкин эмас.

Энг кўп учрайдиган операциялардан бири чуррани бартараф этиш бўлиб, у умумий операцияларни 10-15% ташкил қиласди ва хозирда функционал эндопротезларнинг янги авлодига муҳтож. Оперциядан кейинги битишмаларни олдини олиш учун хозирда барер усуллари ишлаб чиқилмоқда. Бундай эндопротезларни ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган материаллар битишмалар хосил бўлишига йўл қўймаслиги керак. Клиник амалиёт шуни кўрсатдики, синтетик барер эндопротезлардан фойдаланилганда баъзи асоратлар (серома, инфильтрация, имплантатларнинг миграцияси ва кўчиши) кузатилди.

Шундай қилиб, барер мембрана ва эндопротез учун биологик мос ва функционал материаллари устида олиб бориладиган изланишлар реконструктив хиургиянинг долзарб вазифасидир.

"Барер" имкон қадар хавфсиз ва инерт, қон ва эксадат бор жойда самарали бўлиши, капсуланмаслиги, яллиғланиш, инфекция ва фиброз манбаи бўлмаслиги, тўлиқ эrimаслиги ва фойдаланиш осон бўлиши, хамда узок вақт хизмат қилиши керак.

Целлюлозадан фойдаланилган холда янги препарат «Interceed» (Ethicon Inc., Somerville, NJ, USA) ишлаб чиқилилган, у 28 кун ичидаги тўлиқ сўрилувчан мембранани ташкил қиласди. Бугунги кунда бу воситани кенг қўлланилиши қон ёки қорин суюқликлари мавжуд жойда самараси камлиги учун чегараланган. Карбоксиметил целлюлоза (КМЦ) ва унинг хосилалари масалан Na-КМЦ, Россия давлат дори воситалари реестри, АҚШ ва европа фармакопиясига киритилган; Улар асосидаги имплантатлар («NEW-FILL®» воситаси КМЦ ва полилактид кислота аралашмаси) кенг кўламда пластик хиургияда қўлланилади. КМЦ ва гиолурон кислотаси боғланиши оқибатида турли мембраналар ишлаб чиқилган, масалан биосўрилувчан мембрана «Seprafilm» (Genzym корпорацияси, АҚШ) бўлиб, плёнка кўринишида ишлатилиб, жарохатланган соҳаларни бекитиш учун хизмат қиласди. Мембрана 24-48 соат давомида гел холатига утада, лекин ўз жойида 7 кунгача сақланиб қолади. 28 кунда тўлиқ сўрилади, қушимча фиксацияларни талаб қилмайди, операцион битишмаларни хосил бўлишини сезиларли даражада камайтиради, қон бор жойда ўз самарасини сақлайди. Бу "барер" Европа мамлакатларида ва Шимолий Америка клиникаларида фойдаланиш учун рухсат берилган. Хорижда ишлаб чиқилган битишмаларга қарши воситаларнинг самарадорлигига хеч шубха йўқ, лекин уларнинг асосий камчилиги бу уларнинг юқори қийматидир.

Ўзбекистонда қўшма илмий-тадқиқотлар асосида "Академик В.Вохидов номидаги РИХМ" АЖ ва ЎзМУ қошидаги КФП ИТИ янги хирургик имплантат ишлаб чиқарилди. Целлюлозанинг уч хосиласини комбинацияси барча талбларга жвоб берувчи қон тўхтатиш хусусиятига эга бўлган имплантат "Гепроцел" деб номланиб (Патент РУ ФАП 04.24.2015 дан 2015 0054) паренхиматоз органлардан кетаётган қонни тўхтатиш учун энг яхши восита эканлиги тадиқланди. Полимернинг тез биопарчаланиши билан бир қаторда яллиғланиш жараёнининг камлиги, жарохатни ёд модда билан боғлик бўлган яллиғланишини олдини олади. Жарохат соҳасида фиброз тўқимани тез шаклланишига олиб келади ва барқарор гемостаз учун имкон беради. Бундан ташқари, қорин парда ва атрофидаги органлар томонидан ножӯя реакциялар кузатилмайди. Изланишлар натижларига кўра "Гепроцел" қон айланиш тизими фаолиятига таъсир кўрсатмаган холда жарохат соҳасидаги қон ивиш омилларини фаоллаштиради ва шу сабабли паренхиматоз аъзолардан кетаётган қонни тўхташига олиб келади.

Ўт йўллари рекнострукцияси - бу юқори мустахкам ва биологик мос материаллардан тайёрланган функционал эндопротезларга муҳтож бўлган хирургиянинг йўналишидир. Ўт йўллари тизими касаллиги - хирургик патологиялар ичida етакчи ўрин тутади. Хозирги кунга қадар долзарб муаммолардан бири механик сариқлиги бор бўлган беморларни даволаш. Ўтган 10 йил давомида, замонавий жаррохлик ютуқлари натижсида, сезиларли даражда хирургик натижларини яхшилашга муваффақ бўлинди.

Сўнгги йилларда полимерлар синтези соҳасида эришилган ютуқлар натижасида эндобилиар стентлар, тикув материаллар, тўрсимон протезлар учун оптимал материаллар устида изланишлар жадал ривожланмоқда. Лекин, афсуски, бугунги кунга қадар, замонавий билиар хирургия талбларига тўлиқ мос келадиган махсулотлар ишлаб чиқариш учун хеч қандай мукаммал материал топилган эмас. Стент тайёрлаш учун ишлатиладиган қулай синтетик махсулотларга тефлон, полиуретан, полиетилен, перкуфлекс киради. Синтетик стентларнинг клиник қўлланилиши натижасида уларнинг бир қатор камчилклари аниқланди: 3-6 ой ичida тиқилиб қолиши, бундан ташқари бундай стентларни тез-тез миграцияси (ўз жойидан чиқиб кетиши) шундай камчиликлар қаторига киради.

Янада кенг ишлатиладиган, ўзи кенгаядиган металл стент учун қатор чекловлар аниқланди.

Биламизки хирургик амалиётида тикув материалларига талаб юқори. Асосан чоклар учун материал табиий ёки синтетик полимер материаллардан

тайёрланади. Тикув материали зарур механик кучга эга бўлиши, хавфсиз, операция вақтида ишлатилиши қулай бўлиши ва осонлик билан стерилизацияниши керак. Сўнгги йилларда, эътибор биосўриувчан хирургик ипларга қаратилган. Биопарчаланувчи хирургик тикув материаллари хавфсиз, етарли эгилувчан, тўқима тиклаш кинетикасига қараб аста – секин сўрилиши керак. Шу билан бирга, материаллар деградацияси махсулотлари организмда осонлик билан элиминацияга учраши, атроф тўқима ва умуман организмда салбий реакцияга сабаб бўлмаслиги лозим. Хозирги кунда ичак анастамозларини қўйиш учун хиургик тикув материалларига талаб юқори. Ичак қовузлоқларини тикишда кенг тарқалган усул, бу лигатурали усул ҳисобланади ва энг кенг тарқалган анастомозлардан эса - икки қаторли анастомоз ҳисобланади. Клиник амалиётга синтетик тикув материалларининг тадбиқ қилиниши бир қаторли ичак чоки техникаси ва операциядан кейинги жараёнга ижобий таъсир кўрсатди. Жаррохлик тикув материаллари табиий ва синтетик полимерлардан таёrlанади. Полипропилен («Prolene», «Sircilene», «Deklene»), полиамиидлар («Sircilin», «Dermalon», «nylon 66», "Poliamid 6"), галоген сакловчи полимерлар («Tagix-Tex», "FUMALEN®») синтетик сўрилмайдиган тикув материаллари, чукур жойлашган хирургик чокларни хосил қилиш учун ишлатилади. Бундай материал фиброз капсула билан қопланади ва бемор хаёти давомида унинг танасида қолади.

Охирги вақтда парчаланувчи тикув материалларини ишлаб чиқиши, фойдаланиш ва тадбиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Тўқима битаётганда бундай материалдан ишланган иплар аста – секин янги пайдо бўлган тўқима билан алмашинади, натижада чоклар мустахкамлигини ошишига олиб келада. Кетгут иплари ўринига хозирда унданда мустахкамроқ ва узокроқ хизмат қиласиган синтетик полимерлардан сўрилувчан иплар («Dexon»), («Vicryl») кириб келди. Бу иплар, яқинга қадар идеал ҳисобланарди, лекин уларнинг камчилиги шундаки чоклар ўзининг мустахкамлигини узоқ муддатгача сақлаб қолиши керак бўлган жойларда фойдаланиш мумкин эмас. Полилактид ва полигликолид синтетик биёпарчаланувчи материаллардан фойдаланишда юзага келадиган асосий асоратларнинг сабаблари бу полимерлар деградацияси махсулотларини организмга аллергик ва яллигланиш таъсирни кўрсатиши мумкин. Шунинг учун, биомеханик кучли ва биосўриувчан оптимал чокларни ишлаб чиқариш тибиётнинг мухим маслаларидан бири ҳисобланади.

Хирургик елимлар ва композитлар кўп холатларда юмшоқ тўқималар жаррохлигига яралар четларини елимлашда фойдаланилади. Тиббиётда полимер материалларнинг қўлланиши кам ривожланган йўналиш бўлиб, бу

айниқса ички органлар (жигар, буйрак, ўпка) операциялари вактида улардан фойдаланишга эхтиёж юқори. Хирургияда ишлатиладиган елимлар висцерал түқималарига хос юқори намлик бор шароитида, тез эластик ёпиширувчи боғламлар шакиллантириши; мослашувчан бўлиши; қотиши давомида қизиб кетмаслиги; узоқ муддатли фаолият кўрсатиши ва захарли бирикмалар ажратмаслиги керак. Биринчилардан бўлиб, полицианакрилатлар асосидаги елимлардан фойдаланила бошланди ва хозирда хам улар ишлаб чиқарилмоқда. Бу елимлар тез парчаланганилиги сабабли, уларнинг яроқлилик муддати чекланган (6-9 ой). Полицианакрилатларнинг капролактан ва монокрабон кислотаси полимерлари (полилактид / полигликолид) композицияси билан бирга янада яхшиланган елим турлари бўлиб, аневризмани мустахкамлаш ва мия суюқлиги каналларини эмболизация қилишда тавсия этилади. Фибрин елимлар хам маълум бўлиб, улар асосини оқсиллар тизими ташкил қиласди. Тайёрланиш технологияси мураккаблигига қарамай ички аъзо түқималари чети яхши ёпишиши билан ифодаланади. Бундан ташқари формалдегид ва глутаральдегид каби желатин асосидаги елимлар хам қўлланилади.

Операциядан кейинги бўшлиқни тўлдириш, аневризмани мустахкамлаш ва тўлдириш, ички аъзолар оқма йўларида (масалан, жигар ёки меъда ости бези каналлари каби) инъекция шаклида қўлланиладиган композициялар хам маълум.

Таркибий асоси полимер композицияли бўлган моддаларни тери остига юбориш, тери ўсмалари олиб ташлангандан кейин ва косметологияда юзнинг юмшоқ түқималари камчиликларини тузатиш учун ишлатилади. Бундай композицияларга гиалурон кислота асосидаги гидрогеллар, коллаген асосидаги препаратлар ва коллоид массалар киради. Ушбу воситалар юмшоқ тўқима пластикасида жуда муваффақиятли ишлатилади.

Ички эндопротезлар ғоваксимон имплантатлар ёки кичик қопчалар шаклида бўлиб улар биоинерт ва зарарсиз суюқликлар, гел билан тўлдирилган бўлади. Сут бези эндопротезлари кенг тарқалган бўлиб улардан косметик мақсадлар учун фойдаланилади, шунингдек улардан онкохирургик амалиётлардан кейинги нуқсонлари тўлдириш учун ишлатилади. Тўзилиши жихатидан бундай эндопротезлар эластик сумка шаклига эга.

Кремнийорганик материаллари асосида таёrlанган эндопротезлар юз юмшоқ тўқималари ва тоғайларни тўғирлаш учун ишлатилади. Бундай протез турларини ишлаб чиқариш учун турли силикон каучуклардан фойдаланилади. Монокрабон кислотаси асосида олинган полимер ва

сополимерларидан бурун тўсиғи ва қулоқ супраси протези тоғайи конструкцияларини олиш учун ишлатилади.

Шундай қилиб, юмшоқ тўқималар учун протез ишлаб чиқаришда, улар учун оптималь материаллар устида изланишлар давом этмоқда.

Пайлар ва мушакларни эндопротезлаш, ўз навбатида янги ва мураккаб вазифа хисобланади. Бойламлар ва пайларнинг эндопротези сифтида ксенотрансплантатлар ва синтетик хамда табиий материаллар конструкциясидан фойдаланиш мумкин. Синтетик материаллар сифатида улардан узоқ муддат фойдаланилганда хам зўриқишиларга чидамили бўлган полизтилен тэтрофталатдан фойдаланиш мумкун.

Тери бутунлигининг бўзилиши оғир асоратлар ва оғриқ билан кузатилади. Тери барер сифатда ташқи таъсирлардан, токсинлар ва танани юқумли микрофлораларидан химоя қиласи, шунингдек организмдан моддалар алмашинуви маҳсулотларини чиқаришда иштирок этади. Тери эпидэрма (ёки ташқи қатлами), доим регенерацияланиб туради, дэрма (хусусий қатлам) ва тери ости ёғ қатламидан иборат. Дэрма механик вазифани бажариб, регенерацияланмайди. Суний терига катта эҳтиёж куйишдан кейинги даврда юзага келади. Биринчи даражали куйиш терининг эпидэрмис қаватини заарлайди. Иккинчи даражали куйиш, хар икки қатламларини халок қиласи, лекин соч фолликулалари атрофида эпидэрмис қолиб, чандиқ қўринишида тиклаш имконини беради. Учинчи даражали куйиш барча тери қаватларини халок қиласи. Кучли куйган тери бактериялар тушмасиддан олдин, дархол олиб ташланиши керак. Куйишлар учун энг афзал қоплама аутотрансплантатлар хисобланади. Лекин беморда ўзидан кўчириб ўтказиш учун териси етарли бўлмаслиги мумкин. Хайвон ёки мурда териси трансплантация учун яроқсиз хисобланади, чунки хўжайин организми тез чиқариб ташлайди. Алтернатив усул сифатида бўлиб суний тери қопламалари ва боғламларидан фойдаланиш мумкин. Хозирги кунда турли материаллар ва услублардан фойдаланиб, сунъий тери қопламаларини ишлаб чиқариш фаоллик билан ривожланмоқда. Терининг заарланиш даражаси ва унинг яллиғланиш босқичига қараб (яллиғланиш босқичи, регенерация босқичи, янги эпителиал тери шакилланиш босқичи) сунъий тери қопламаларига қўйиладиган талаблар фарқланади. Биринчи босқичда химоя материаллар (синтетик тери) яраларни тозалигини таъминлаши керак; иккинчи - янги бириктирувчи тўқима ўсиши учун шартшароитлар яратиши керак; учинчи - эпителиал хужайраларини ўсиши, хамда уларнинг миграцияси ва янги эпидэрмисни шакллантириш учун шартшароитлар яратиши керак.

Суний терини яратишда табиий ва сунъий синтетик материаллардан гел, тўқимачилик махсулотлари, плёнкалар, ғовакли қопламалар ва бошқалардан фойдаланилади. Хозирги кунда ишлатилиб келинаётган боғлов материаллари, бугунга келиб қон тўхтатувчи ва сорбцион хусусиятга эга бўлган замонавий материаллар билан алмашинмоқда. Полимерлар асосидаги, сорбцион материаллар толали махсулотлар, губка ва кукун шаклида ишлаб чиқарилади, улар яра юзасида плёнкали қопламалар хосил қилишда иштирок этади. Оқсилполисахаридли қопламалар яраларни тузалишида ижобий таъсир қўрсатади, улар қаторига натрий алгинат ва коллаген ("Алгикол") хамда хитозан ва коллаген асосидаги комплексларни киритиш мумкин.

Таркибида антибиотик сақловчи алгинат кислоатаси ва желатин асосидаги кўпиксимон композициялар хам яраларни тузалишида яхши самара қўрсатади. Куйган терининг заарланган юзасига плёнка хосил қиладиган кукунлар ёки полимер спрейларни ишлатиш мумкин. Поливинил спиртидан тайёрланган пленкали қопламалар яхши адгезия ва микрофлорани ўтказаиш хусусиятига эга, полигликол кислотасидан иборат пленкали қопламалар эса тўлиқ тери юзасига ёпишмайдива тез деструкцияга учрайди. Бир неча қатламлардан иборат функционал тери қопламалари ишлаб чиқилди, улар биринчи гидрофоб қатлам - кислород ва сув буғларига нисбатан ўтказувчанлиги сақланган бўлиб, микроорганизмларни ўтказмайди. Кейинги қатлами гидрофил - тери жарохати юзаси билан контактда бўлиб, суюкликларни сорбциясини таъминлайди. Ушбу турдаги тери қопламалари чандиқли тўқима миқдорини камайтириш учун хизмат қиласи. Клиничаларда жарохат тикланишига олиб келувчи юқори самрага эга қопламаларга талаб катта ва долзарб бўлганлиги сабали, хозирги вактда бундай такомиллаштирилган материаллар устида мухим изланишлар олиб борилмоқда.

Хозирга қадар икки компонентли синтетик тери қопламлари яаратилган бўлиб, улар коллаген ва гликозаминогликан полисахаридларидан ташкил топган. Хайвонлардан, хусусан, буқалардан олинган коллаген полисахаридларга бириктирилади ва бунинг натижасида коллаген организмда сўрилиши секинлашади. Бу икки компонент кўпиксимон структурани хосил қилиб, тери қўйи қатламини хосил қиласи ва силикон билан қопланади. Бириктирилган қатламлар намлантирилиб жарохат юзаси қопланади, шундан кейин неодэрмис ички қатламга ўсиб киради, трансплантат эса секин аста парчаланиб боради. Шаклланган неодэрмис терига ўхшаш яхши механик хусусиятларга ва нерв хужайраларига эга, лекин соч фолликуллари ва тер безлари бўлмайди. Неодэрмис ўсиши ва

суний тери қопламини сўрилиши тахминан уч хафта вақтни эгаллади, шундан кейин унинг силикон қатлами олиб ташланади ва эпидэрмис аутотрансплантати неодэрмис регенерациясини кучайтириш учун кўчириб ўтказилади.

Назорат саволлари:

- 23.Имплантат тўғрисида тушунча.
- 24.Аъзони ўрнини қопловчи ускунанинг номи нима?
- 25.Биопротез бу нима?
- 26.Одамданодамгааъзони ўтказишқандайаталади?
- 27.Аутотрансплантация бу нима?
- 28.Керамикани асосий хусусиятлари?
- 29.Тиббиёт учун қўлланадиган металларнинг хусусиятдари қандай?
- 30.Тиббиётда. Қўлланадиган биокермика турлари?
- 31.Биологик тўқима бу нима?
- 32.Полимер бу нима?
- 33.Полимерларнинг хусусиятлари нимадан иборат?
- 34.Қон томир эндопротезларига қандай талаб куйилади?
- 35.Биоинерт полимер бу нимани англатади?
- 36.Юрак клапанларига бўлган талаблар?
- 37.Хайвондан одамга кўчирилган тўқима қандай аталади?
- 38.Қандай адсорбентлар.хозирги махалда қўлланилади?
- 39.Қандай табиий полимерлар тиббиетда қўлланилади?.
- 40.Хорижий қон томир протезларини турларини айтиб беринг?
- 41.Қандай иплар хирургия учун ишлатилади?
- 42.Сўрилиб кетувчи ипларнинг номини айтинг?
- 43.Сўрилмайдиган ипларнинг номини айтинг?
- 44.Гемостатик имплантатларнинг номини айтинг?

Фойдаланилганадабиётлар:

6. Alvarez J. R./ Oxidized cellulose as the cause of an acute ischemic event after coronary revascularization.// Journal of Interactive Cardio Vascular and Thoracic Surgery. - 2014. - Vol. 11. - P. 488–489.
7. Azhar A. H., Azreen S. A., Mohammad Nor G. R., Amer H. K./ Oxidized Cellulose (Surgicel) As a Surgical Hemostat in Liver Injury: A Case Report and Literature Review.// International Journal of Surgical Research. - 2013. - Vol. 2 (3). - P. 21-23.
8. Bouras A. F., Truant S., Pruvot F. R./ Management of blunt hepatic trauma.// Journal of Visceral Surg. - 2015. - Vol. 10 (004). - P. 351-8.

9. Camy S., Condoret J. S., Montanari S., Rattaz A., Vignon M./ Oxidation of cellulose in pressurized carbon dioxide // The Journal of Supercritical Fluids. - 2010. - Vol. 51. - P. 188–196.
10. Carbon R. T, et al./ Fast-track Surgery of Recurrent Pneumothorax in Patients with cystic fibrosis-superiority of minimally invasive tissue management.// 7th World Congress on Trauma, Shock, Inflammation and Sepsis. Medimond International Proceedings, Munich. - 2010. - 15–28.

2-мавзу: Эндоваскуляр диагностика ва даволаш усуллари.

Ишдан мақсад : Тингловчиларга хирургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтказиш, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар гурӯхларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Атеросклероз патогенезининг энг тарқалган назарияси Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясниковлар таклиф қилган нейрометаболитик назариядир. Гидрофил холестерин комплекси яратилишида бекарор липопротеин комплексларига - 3/4 қисми липидлардан иборат бета-липо протеидларга ва 1/4 қисми оқсил бўлган холестеринга катта аҳамият берилади. Уларнинг томирлар орқали бундай ташилиш усули ишончли эмас, комплекслар эримайдиган липидлар чўкиши билан осон парчаланади. Холестериннинг бу эстерлари эримайдиган комплекслар ҳолида артериялар интимасида тўхталиб қолади ва аста-секин йиғилиб, унинг деворига ўтади.

Атеросклерознинг Уругвай хирурги Пальме тавсия қилган гемодинамик назарияси нуқтаи назардан атеросклероз систолик қон тўлқини зарбларининг артериал деворни сурункали шикастлаши натижаси ҳисобланади. Бу артерияларнинг ҳимоя системаси ўз вазифасини адо этолмагандан рўй беради.

Атеросклерознинг тромбоген назариясини инглиз патологи Дугайт таклиф этган. Унинг тадқиқотларига биноан аортадаги тромблар аввал ғовак, сўнгра қонтакт фибриндан ташкил топган. Тромб юзаси эндотелий билан қопланади, шунга кўра у гўё томир деворининг таркибий қисмига ўхшаб, интимага жойланиб олгандай бўлади. Шундан кейин фибрин конденсацияси ва тромб ҳосил бўлиши юз беради. Фибрин йиғилиши такрорланади. Такрорланиш тез юз берса, фибриннинг бир қатлами иккинчи янги қатлами билан алоқага киришади.

Носпецифик аорта-артерит - томирларнинг система касаллиги бўлиб, асосий хусусияти аортада ва унинг шох тармоқларида стенозловчи, аневризматик ёки аралаш жараён ҳисобланади. Уни 1956 йилда Савори тасвиrlаган. Носпецифик аорта-артерийтнинг ҳақиқий тарихи япон врачи M. Такаясуниг 1905 йилда аорта равоги тармоқлари заарланишининг клиник тасвирини баён этишдан бошланган.

Аортитнинг аллергик табиатини ҳисобга олиб, қатор муаллифлар унинг аутоиммун келиб чиқиши тўғрисидаги тахминни баён қиласадилар. Айрим муаллифлар уни коллагенозлар қаторига киритадилар, чунки унда коллагенозга хос яллигланиш реакциялари, субфебрилитет, систем заарланиш, клиник полилорфизм, айрим мусбат лаборатория синамалари қайд қилинган. Бу касаликда, одатда, артериянинг бирламчи ташқи қатламлари заарланади, сўнгра жараён томирнинг бирмунча чуқур қатламларига тарқалиб, интимани қалинлаштирадиган иккиласми чуқур яллигланиш ходисалари юз беради. Аорта равоги артериялари касалликлари

Такаясу синдроми деган ном остида брахеоцефал артерияларни торайтирадиган ёки тутилиб қолишини келтириб чиқарадиган ва бош мия ҳамда қўллар ишемиясига олиб келадиган ҳар хил этиологияли касалликлар гурухи бирлаштирилади. Япон офтальмологи Такаясу 1908 йилда ёш аёлларда кўз турсимон пардаси артериясининг заарланиши ва қўлда пульс йўқлиги билан таърифланадиган томирлар касаллигини тасвиrlади. Адабиётда бу синдром кашфиётчи шарафига Такаясу деб аталди. Бу патология адабиётда бошқа номлар билан ҳам юритилади, улардан энг кенг тарқалгани «аорта равоги синдроми», «пульс йўқлиги касаллиги», «Марторелле синдроми», «ёш аёллар артериити», «Гигант хўжайраги артериит», «Такаясу синдроми» ва бошқалардир.

Бу касаликнинг анчагина тарқалганлиги ва прогнозининг ёмонлиги, мия инсультига ва даволаш усулларига оид қарашларнинг қайта кўриб чиқилиши муносабати билан унинг клиник аҳамияти етарлича мухимдир. Ишемик инсульт пайдо бўладиган беморларнинг тахминан ярмида бош мияни таъминлайдиган калла суюгидан ташқаридаги артерияларда заарланишлар бўлади. Атеросклерозда бош миянинг ишемик заарланишлари фақат артериал окклузияси стенози сабабли эмас, балки церебрал артерияларнинг атеросклеротик пилакчадан микроэмболияси натижасида ҳам ривожланади.

Этиологияси ва патогенези. Брахеоцефал артериялар тутилиб қолишни келтириб чиқарадиган этиологик омиллар бир неча гурухларга бўлиниши мумкин:

1. Артерияларнинг облитерация қиладиган касалликлари:

- носпецифик аорта-артериит;
- облитерацияловчи тромбангит;
- чакка артериити.

2. Аорта равоғи аневризмалари брахеоцефал артерияларнинг иккиламчи торайиши билан:

- атеросклеротик;
- захмли;
- қатламланадиган аневризмалар.

3. Аорта равоғи тармоқларининг ривожланиш нуксонлари:

- артерияларнинг ратологшик эгри-бугрилиги, оғизнинг сурилиш нуксонлари;
- артерияларнинг патологик эгри-бугрилиги, ковузлоклар хосил килиш ва ангуляцияси;
- аорта равоғи тармоқлари нуксонлари.

4. Артериялар компрессиясининг экстравазал омиллари. Атеросклероз ишемик синдромнинг энг кўп сабабчисихисобланади, беморларнинг тахминан 2/3 қисмида атеросклеротик келиб чиқадиган брахеоцефалик артерияларнинг заарланиши бўлади. Эркаклар аёлларга нисбатан 4 баробар кўпроқ заарланади. Атеросклерознинг муҳим хусусияти шундаки, бош миянинг калла суюгидан ташқаридаги бўлимларининг заарланиши интракраниал артерияларга қараганда 5 марта кўпроқ учрайди.

Уйқу артерияси бифуркацияси ва ички уйқу артериясининг бошланғич сегменти атеросклеротик пилакча ривожланадиган жой хисобланади. Иккала уйқу артерияси бир хилда кўп заарланади. Аксарият патологик жараёнга ўмров ости артериялари ҳам қўшилади, бунда чап артерияси ўнг артериясига нисбатан 3 баравар кўпроқ заарланади. Кўпинча bemорларда аорта равоғи тармоқларининг кўп сонли заарланишлари аниқланади.

Назорат саволлари:

27. Оёқлар юза веналарининг тромбофлебитининг клиник кўринишини айтиб беринг:
28. Қандай холларда оёқ юза веналарининг ўткир тромбофлебитида шошилинч жарроҳлик амалиёт кўрсатилади:
29. Оёқлардаги юза веналар тромбофлебитида қонсерватив терапиянинг асосий моментини айтинг:
30. Оёқлар ВВКда юза кўринишини шаклини санаб утинг:
31. Юза веналарининг ўткир тромбофлебитини асосий симптомини айтинг:
32. Юза веналарининг ўткир тромбофлебитининг қайси шаклда Троянов-Тренделенбург операцияси килинади:
33. Тромбофлебит тушунчасига изоҳ беринг:
34. Коммуникант веналарга характерли белгини айтинг
35. Оёқлардаги веноз оқимини қийинлашувига қуйидаги факторлар сабаб булиши мумкин
36. Аорта равоги окклюзион касалликлари этиопатогенези.
37. Аорта равоги окклюзион касаликлари сабаблари нозолик турлари.
38. Аорта равоги окклюзион касаликлари ташхислашда кўлланиладиган асосий диагностик усуллар.
39. Бош мия сурункали ишемияси класификацияси.
40. Аорта равоги окклюзион касаликлари консерватив даволаш учун кўрсатмалар.
41. Аорта равоги окклюзион касаликлари оператив даволаш учун кўрсатмалар.
42. Аорта равоги окклюзион касаликлари оператив даволаш умумий принциплари.
43. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари этиопатогенези.
- 3 Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликларисабаблари нозолик турлари.
44. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари ташхислашда кўлланиладиган асосий диагностик усуллар.
45. Оёқлар сурункали ишемияси класификацияси.
- 4 Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари консерватив даволаш учун кўрсатмалар.
46. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари даволаш

учун кўрсатмалар.

47. Аорта ва оёқ артерияларининг окклузион касалликлари даволаш умумий принциплари.
48. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар сабаблари
49. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар клиникаси ва таснифи
50. Дифференциал диагностика
51. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар даволаш усуллари
52. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар профилактикаси

Фойдаланилганадабиётлар:

8. Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]
9. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.
- 10.<http://www.tma.tmn.ru/Vestnik>
- 11.<http://medi.ru/doc/83.htm>
- 12.<http://www.rmj.net/index.htm>
- 13.<http://www.consilium-medicum.com/media/refer>
- 14.<http://www.mediasphera.aha.ru>

З-мавзу:Юқориқувватли лазерларни хирургияда қўллаш ва афзалиги.

Хирургияда лазер ёрдамида амалга ошириладиган операция усуллари бўйичабилим ва кўникмаларни чуқурлаштириш.

Ишдан мақсад : Тингловчиларга хирургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтқазиш, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар гурӯхларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Турли хилдаги лазер типлари, шунингдек лазер нурланиши кўрсаткичларидаги ўзгаришлар ушбу муаммони ўрганишдаги турли натижаларга эришишга сабаб бўлди.

Юқори энергияли лазерлар ўзидаги кучли термик таъсирга кўра микроорганизмларнинг барча турларини батамом йўқотиш имкониятига эга, бироқ термик таъсир макроорганизм тўқималарининг деструкциясиға олиб келиши хам мумкин. Шунга кўра, микроорганизмлар сонининг камайтириш билан бир қаторда макроорганизм хужайраларининг тузилиши хамда функциясини сақлаб қолишга қаратилган мақбул дозани аниқлаш юзасидан текширувлар ўтказила бошланди.

Карбонат ангидридли лазер йирингли хирургияда тўқималарни кесиб очиш, яшашга ноқобил қисмларни олиб ташлаш, шунингдек йирингли ўчоқни стерилизация қилиш мақсадида қўлланилади. Фокуси топилган, кучланиш зичлиги $1\text{Вт}/\text{см}^2$ гача бўлган нурланиш бактерицид самара кўрсатиши хамда микроорганизмлар сонини 80% гача камайтира олиши аниқланди. Бунда тўқималар 200 мкмгача бўлган қалинликда юза коагуляцияга учрайди ва ярани битиш жараёни издан чиқмайди. Бу усул проктологияда, юмшоқ тўқималаринг йирингли касалликларида, куйишларни даволашда, шунингдек ифлосланган жарохатни тикишдан аввал қўлланилади.

Лазерларнинг бошқа турларидан(АИГ-неодимовий, аргонли ва б.қа.) жарохат инфекциясиға бактерицид таъсир кўрсатишида фойдаланиш амри маҳолдир, чунки термик таъсир чуқур жойлашган тўқималаргача тарқалиб, репарация жараёнини ёмонлаштиради.

Жарохатни тозалаш учун паст энергияли лазерлардан фойдаланиш энг истиқболли йўналиш саналади . Қизил диапазондаги нурланишининг давомли экспозициясини *in vitro* микробларнинг хаёт фаолиятига таъсири унчалик ахамиятли эмаслиги аниқланган. Гелий-неон лазер нурланишининг *in vitro* микроорганизмларнинг ўсишини тўхтатувчи нисбий имконияти мавжудлиги хақида бошқа фикрлар хам мавжуд. Шу билан бирга *in vivo* шароитида гелий-неон лазердан фойдаланиш кўпгина холларда жарохатда бактеријлар ўсишини камайишига шароит яратад. Шундай маълумотлар ушбу типдаги лазерни септик яллигланишли bemорларнинг қонини нурлантириш учун, операцион жарохатдаги асоратлар, юқумли касалликлар, зотижамни даволашга қаратилган ишларда келтирилган. Айрим илмий ишларда эса лазерларни инфекцияларга қарши кенг қўллаш борасида огохлантирилади, чунки уларнинг маълумотларига кўра лазерлар микроблар хамда вируслар ривожланишини фаоллаштириши мумкин.

ИК-диапазондаги ярим ўтказгичли лазерларнинг микроорганизмларга таъсири хақида шу каби турли фикрлар бор. Давомийлиги 128 с бўлган, 80 Гц частотали ярим ўтказгичли “Узор” лазерининг *E. coli* микроблар культурасига *in vitro* таъсирини ўрганиш, ушбу кўрсаткичларда микроорганизмлар ривожланишининг ортишини кўрсатди. У холда, қай

тарзда, изланишларда ўша тартибдаги "Узор" лазери бактериостатик ва бактерицид самара күрсатиши аниқланды. Ярим ўтказгичли лазерлар йириングли яллиғланиш ва юқумли касалликлар: йириングли яра, куйишлар, зотилжам, септик холатларда қонни нурлантири ва б.қ.ларни даволашда ижобий самара берганлиги хақида маълумотлар бор.

Изланувчиларнинг энг катта қизиқишлиарини ультрабинафша спектрдаги 337нм нурланиш тўлқин узунлигига эга бўлган азотли лазерлар жалб қилди. Дастребаби изланишларданоқ лазерларнинг бошқа турлари билан таққосланганда унинг бактериостатик ёки бактерицид самара күрсатишдаги фаоллиги аниқланды. Нурлантириш тартиби, давомийлиги ва муолажалар сонидаги сезиларли тафовутга қарамай, стафилококк, стрептококк, ичак таёқчали хамда аэроб ва анаэробларнинг баъзи турларига нисбатан ижобий самара олинди]. Бактерицид таъсир күрсатувчи нурланишнинг энг кам дозаси 3-7 Дж/см²га тенг бўлган бўлса, у холда қандай қилиб талайгина микроорганизмлар 1-2 баробар юқори дозада халок бўлиши мумкин. Бактерицид самарани ортиб боришини хисобга олиб, изланувчилар нурланиш дозаси ва кучланиш зичлигини, шу билан бирга нурлантириш муолажаларининг сони хамда частотасини оширишни тавсия этадилар.

Азотли лазер нурланишининг барча ортиб борувчи дозалари клиник амалиётда қўлланила бошланди. Шундай қилиб, йириングли жарохатларни нурлантириш учун 1-10 Дж/см² диапазондаги доза хамда 2тадан 10 тагача муолажа буюрилади. Азотли лазерлардан фойдаланиш қатор холларда баъзи юқумли касалликларни даволашда ягона даволаш усули хисобланган Қонни ультрабинафша нурлантириш борасида олиб борилувчи назоратсиз изланишларда жуда катта хавф мавжуд, бунда дозани оширилиши иммун танқислик холатига олиб келиши мумкин. УБ манбалардан бир неча баробар юқори кучланишга эга бўлган азотли лазер хозирги даврда клиникада қонни нурлантириш мақсадида 15 дақиқадан то 45 дақиқагача давом этувчи хар кунги муолажаларда қўлланилмоқда.

Йириングли инфекцияни даволашда НЛИ имкониятларига қарамай кўпгина изланувчилар уни бошқа медикаментоз препаратлар ва антибиотиклар билан бирга қўллаш зарур деб хисоблайдилар НЛИни микроорганизмлар ривожланишини тўхтатиш учун қўллаш бўйича адабиётлардаги маълумотлар тахлили қўйидагиларни аниқлашга ёрдам берди : НИЛИнинг барча турлари дозалашга боғлиқ холда, стимуллаши, таъсир күрсатмаслиги ёки микробларнинг хаёт фаолиятини издан чиқариши мумкин;

аниқ кўрсаткичларнинг, шунингдек тажриба учун шароитнинг бўлмаслиги кўпгина тажриба натижаларини таққослашга имкон бермайди, бу эса ягона натижа билан чекланишга сабаб бўлади;

микроорганизмларга НЛИ нинг таъсир нуқтаи назаридан *in vitro* ва *in vivo* да олинганлар билан маълумотлар орасида параллелликнинг мавжуд эмаслиги эҳтимол, лазер нурланишининг макроорганизмнинг химоя кучларини ошириш орқали билвосита самара кўрсатиши билан боғлиқ;

лазер нурланишининг кўрсаткичлари ва дозасини танлашда макроорганизмнинг хужайравий хамда гуморал химоя омилларини кам даражада шикастлаши мумкин бўлган “бўсаға доза”дан бошлаш мухимдир.

Тажрибада НЛИнинг микрофлорага таъсир имкониятларини баҳолаш мақсадида биз томондан қуидаги вазифалар қўйилди :

Паст энергияли лазерларни йирингли ярадаги микрофлорага таъсир самарадорлигини аниқлаш;

Йирингли инфекцияда терапевтик таъсир дозаларидан келиб чиқсан холда, лазертерапия принципларини яратиш;

Меъданинг патоген микрофлорасига(*Helikobakter pilori*) нисбатан НИЛИ имкониятларини ўрганиш;

Текширув материаллари ва усуллари Лазерли ускуна: гелий-неонли лазер, ярим ўтказгичли лазер "Узор", азотли лазер.

Культураларни лазер ёрдамида нурлантирганда қуидаги таъсир майдони аниқланди : ГНЛ- 10мм, ЯЎЛ- 1,5см, азотли - 0,3см.

Лазерларнинг кучланиши : ГНЛ- 5мВт, Узор-Римп- 5Вт, v - 80Гц, азотли-3мВт, v - 100Гц.

Нурлантиришнинг кўрсатилган тартиби ишлаб чиқарилаётган лазерли ускуналарнинг стандарт ишчи тавсифларига асослангандир.

Синалган аэроблар: *M. Lysoideicticus*, *S. AureusR*, *P.aeryginosa* 216, *E.Coll M-27* *S.Epldermalls* 295, *S.Aureus* 418, *E.Coll*, *S.marcescensM* Зactills *subtllls,micrococcus lisoideikticus*; анаэроблар:*Clostridium perfringes*, *Bacteroides fragllis*, *Helicobacter pylorndl*; замбуруғлар оиласи: *Candida*.

Анаэроб микроорганизмлар 24 соат давомида озиқ муҳитли агарда ўстирилди, сўнгра физиологик эритма ёрдамида стандарт бўйича 1 мл да 10^6 10^7 10^8 10^9 10^{10} қонцентрацияларда микробли қоришли тайёрланди. Экма қонли агарли косачада ўтказилди. Косачадаги аввалдан белгиланган соҳаларда нурланиш давомийлиги 1-25 дақиқагача чўзилди. Кейин эса экмали косачалар $37,0^\circ$ С хароратда сақланди. Аэроблар оддий шароитга,

анаэробларни эса анаэростатга қўйилди. Лазер таъсирини нурлантиришдан сўнг турли зичликдаги микроб газонида ўсиш ингибицияси соҳасининг катталигига кўра баҳоланди.

Текширув натижалари Гелий-неонли лазер: лазер билан 10,20,30,60 дақиқа давомида нурлантирилганда бактериостатик ва бактерицид самара олинмади. Ўша пайтда нурланишнинг энг кам муддатларида (10 мин) микрофлора ривожланишининг тезлашуви аниқланмади. Ярим ўтказгичли лазер "Узор": унинг нурланиш давомийлиги 128,256,600 секунд бўлиб, лазер нурланиши бир маротаба қўлланилганда микроорганизмларнинг ўсишини камайиши аниқланмади. Шу билан бирга, нурланишнинг ушбу тартибида микроорганизмларнинг ўсишининг тезлашуви хам кузатилмади.

Азотли лазер: УБ- нурланишни микрококк, стафилококк, ичак таёқчаси, кўк йиринг таёқчасига нисбатан сезувчанлиги теширилганда 5 минутли экспозициядан сўнг (қонцентрация 10^{10} мт/ мл) ўсиш тўхтаган соҳа аниқланди.

Кандидага нисбатан таъсир ўрганилганда ўсишнинг тўхташи экспозициянинг 20-дақиқасида кузатилди.

Қўлланилган экспозицияларда *Bacillus subtilis* штамми лазер нурланишга сезгир эмас эди.

Анаэроблар (бактероидлар ва клостиридиялар) ўртача сезувчанлик намоён қилишди. Улар 10 дақиқалик нурланишдан сўнг ўсиш ингибиция соҳаларини хосил қилишди.

Турли зичликдаги микробли газонлар таққосланганда агар мухитига экилган микроорганизмлар миқдори (10^{10} дан 10^6 мт/млгача) камайгунига қадар ўсиш ингибиция соҳалари кенгайиши (3 мм гача) хамда унинг тиниқлигининг ортиши ("стерил" доғгача) кузатилди, бунда у кратерсимон ўпирелиш кўринишини касб этади.

H.Pylorildi ни лазер нурланишига сезгирлиги текширилганда, азот лазерли нурланиш бошқа НИЛИ дан фарқли ўлароқ экспозициянинг 45-сониясиданоқ юзага келувчи яққол бактерицид таъсирга эгалиги аниқланди.

НЛИнинг *in vitro* микроорганизмлар хаёт фаолиятига таъсирини ўрганиш натижалари гелий-неон ва ярим ўтказгичли лазер "Узор" терапевтик дозаларда патоген микроорганизмлар ривожланишига жиддий таъсир кўрсатмаслигини кўрсатди.

Азотли лазер гарчи патоген микробларнинг баъзи турларига нисбатан бактерицид ва бактериостатик таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, азотли лазернинг H.Pyloridiga нисбатан бактерецид таъсири ундан гастродуоденал хеликобактериози мавжуд bemорларни даволаш сифатида фойдаланишга асос бўлади.

Олинган натижаларнинг тахлили. Бизнинг текширувларда микрофлорага таъсир қилишнинг асосий шарти максимал терапевтик дозани танлаш хисобланган, у холда нима учун адабиётлардаги маълумотларда ушбу қоидага доим хам риоя қилинмайди. Макроорганизм тўқималарида алтерацияловчи таъсирнинг ортиши табиийки, йириングли ярани битиш жараёнини секинлаштиради. Шунга кўра, биз бактериостатик самаранинг хақиқий манзарасини аниқлашга харакат қилдик. Микролар ўсишининг турғун босқичи ёки табиий ўлимида хатто аҳамиятсиз омил хам ғоят халокатли таъсир кўрсатиши мумкин

Бир вақтнинг ўзида лазерларнинг яллиғланишга қарши ва қўзгатувчига таъсири хисобга олинади, *in vivo* синовларда бактерицид самара иммунитетни фаоллаштириш орқали билвосита чақирилади. Авж олган йириングли яллиғланиш инфекциясига таъсир кўрсатилганда янада кўпроқ самарани азотли лазердан кутмоқ керак. Аммо, асосий қоида бактерицид дозадан паст бўлган, стимулловчи дозани қўллашдан иборат бўлиши керак. Лазерли нурланишнинг бактерицидлик даражасидан мумкин қадар қалин пиоген қатламли йириングли бўшлиқлар мавжуд холатларда фойдаланиш мумкин. Турли хилдаги лазерлар учун тўқималарнинг оптик хоссаларидан келиб чиқиб, қуйидагиларни аниқлаш мумкин: карбонат ангидридли лазернинг бактерицид самараси пиоген қаватнинг қалинлиги 1 ммдан ортиқ бўлганда, ультрабинафшаники эса 400мкм дан кам бўлмаган холларда намоён бўлади.

НИЛИнинг H.Pyloridiga таъсири борасидаги ўзига хос изланишлар ўтказишга имкон ушбу микроорганизмни соф культураси ажратиб олингандан сўнг пайдо бўлди. УБ нурланишни рухсат этилган максимал дозанинг хатто минимал қисми қўлланганда хам халокатли таъсир кўрсатиши мумкинлиги хақида қизиқарли далил топилди. Ушбу, мутлақо янги далил хеликобактериоз билан қўшилиб келган яра касаллиги мавжуд bemорларни даволаш замирида ётади. Бундай ёндошув яра касаллигининг рецидивлари хамда операциядан кейинги асоратлар ривожланишини олдини олишга имкон туғдиради, боиси, қатор муаллифларнинг маълумотларига қараганда, ушбу асоратларнинг сабаби бўлиб кўпинча хеликобактериоз хизмат қиласи.

Назорат саволлари:

9. Лазер ибораси нимади билдиради?
10. Юқориқувватли лазерларнинг турлари?
11. Тўқималарни кесиш учун мулжалланган лазер ускунанинг номи?
12. Тўқималарни коагуляция килиш учун лазер тури?
13. Косметология учун кайси лазер қўлланади?
14. Лазер нурида муҳофаза усуллари?
15. Лазернинг қувватини аҳамияти?
16. Лазер нурининг дозасини хисоблаш усули?

Фойдаланилган адабиетлар:

5. Olivo, M., Wilson, B. C., “Mapping ALA-induced PPIX fluorescence in normal brain and brain tumour using confocal fluorescence microscopy,” Int J Oncol, Vol. 25, 2014, pp.37–45.
6. Pandey, R. K., and G. Zheng, “Porphyrins as Photosensitizers in Photodynamic Therapy,” in The Porphyrin Handbook, K.M. Kadish, K. M. Smith, and R. Guilard, (eds.), Vol. 6, pp157–230, Boston: Academic Press, 2014.
7. Pandey, R. K., et al., “Nature: a Rich Source for Developing Multifunctional Agents.Tumor-Imaging and Photodynamic Therapy,” Laser Surg. Med., Vol. 38, No. 5, 2015, pp.445–467.
8. Pandey, S. K., et al., “Multimodality Agents for Tumor Imaging (PET, Fluorescence) and Photodynamic Therapy. A Possible ‘See and Treat’ Approach”, J. Med. Chem., Vol. 48, No. 20, 2015, pp. 6286–6295.

4-мавзу: Хирургик касалликларида фотодинамик даволаш усуллари.

Ишдан мақсад: Тингловчиларга хирургия фани бўйича тадқикотлар ва уларни ўтқазиши, таълим ва тарбия жараёнларини ташкил этишда хорижий тажрибалар ўрни.

Масаланинг қўйилиши: тингловчилар групкаларда топшириқни ечишади.

Ишни бажариш учун намуна:

Ушбу чоралар индивидуал химоя воситалари ва 2- синф биохавфсизлик хоналаридан (қўлқоплар, лаборатория халати, химоя қўзойнаклари ва ниқоб) фойдаланишдан иборат. Тирик микроорганизмларни сақловчи барча

материаллар утилизация қилинишдан олдин автоклавда стерилизация қилиниши керак. Дезинфекцияловчи аэрозоллар ўриндиқ ва тортмали жавонларни тозалаш учун қўлланилиши зарур. Тортмали жавонларда контаминацияни олдини олиш учун ультрабинафша нурлардан мунтазам равища фойдаланиш зарур.

Микроорганизмлар:

3. Грамм- мусбатбактериялар -*StaphylococcusAureus*-8325-4
4. Грамм- манфийбактериялар-*EscherichiaColi*K-12

Жихозланиши :

- 10.Шейкер инкубатори
- 11.Стационар инкубатор
- 12.2 -синф биологик хавфсизлик хонаси
- 13.Центрифуга
- 14.Автоклав
- 15.Ёруғлик манбаи- нурлантиргич
- 16.Кучланишни ўлчагич
- 17.Вортекс
- 18.Спектрофотометр (шарт эмас, лекин фойдали).

Реагентлар ваэритмалар:

9. Юрак- мия экстракти (ЮМЭ) (Fisher Scientific, Waltham, MA).
10. Фосфатбуферли эритма(ФБЭ) (Fisher Scientific, Waltham, MA). ФБЭ микробхужайраларини юништариштириш аксадида қўлланилади.
11. Ўстириш учун мухитлар: 200 мл дистилланган сув ва 6г ЮМЭ. Барча суюқ мухитлар фойдаланишдан олдин 15 дақиқадавомида 120° Сда автоклавланади. Қаттиқ озиқ мухитлар:

1,5% агарқүшилгансуюқозиқмухитлар. Микробиологик агар автоклавла шгача суюқ озиқ мухит билан аралаштирилади. Қаттық мухитлар Петри косачасига қуилади ва қаттық холга келгунга қадар қолдирилади.


- 12.Метилен кўки (MC, 3,7-бидиметиламино-хлорид фенотиазина) (Sigma-Aldrich, Сент-Луис, штат Миссouri).
- 13.Azure (Aldrich), Azure B (Aldrich), Azure C (Sigma-Aldrich)
- 14.1,9 - диметил-метилен кўки (Sigma-Aldrich)
15. Янги-метилен кўки N, эркин шаклдаги рух (Sigma Aldrich)
- 16.Толуидин кўки O (Sigma-Aldrich).






Санаб ўтилган барча фотосенсибилизаторлар дистилланган сувда эрийди. Текширув учун 1 mM концентрациядаги фотосенсибилизаторнинг сувли эритмаси тайёрланади ва қоронгу жойда 4°Cда чекланган вақт давомида сақланади (бир неча кун). Барча фотосенсибилизаторлар юкори даражада ёруғликка сезгир бўлганликлари сабабли қоронфижойда сақланди.

Ёруғлик манбаси:


Ёруғлик манбаидан чиқувчи нурлар оптик толага тўғриланган, фильтр билан таъминланган нокогерент чўғланма лампадан иборат(LumaCare, Ньюпорт Бич, Калифорния).Барча фотосенсибилизаторлар учун 1Вт атрофида ёруғлик билан таъминланган, 1,5 смдан 5 смгача бўлган диаметрли доғга йифилувчи, 660 ± 15 нмли фильтрдан фойдаланилди.

Фотосенсибилизаторларнинг кимёвий тўзилиши:







1,9-Диметил-Метилен кўки



Толуидин кўки





Жадвал . Фенотиазин бўёқларининг кимёвий хоссалари

<i>Бўёқ номи</i>	<i>Липо-филлиги (Log P)</i>	<i>500-700 нм диапазондаги аборбция чўққиси</i>	<i>Флюоресценция спектри</i>
Метилен кўки	-0,10	667	684
Азур А (AA)	+ 0,70	622	652
Азур В (AB)	-0,09	647	671
Азур С (AC)	- 0,40	620	644
Янги метилен кўки	+1,20	628	653

1,9 Диметил метилен кўки	- 0,21	649	671
Толуидин кўки	-0,21	617	666

Кучланишни ўлчагич :

Ёруғлик доғининг интенсивлигини кучланишни ўлчагич ёрдамида хисоблашган (модель DMM, Санта-Клара, Калифорния) ва у ёритилганлик даражасини хисоблаш учун қўлланилади (кучланиш зичлиги мВт/см²).

Бир мартали пластиклар :

Серияли эритиши учун бир мартали пластикларнинг кўп миқдоридан фойдаланилади:

1. Серияли эритишлиарни 200 мкл сариқ учликлардан фойдаланган холда ўтказиш учун 1,5 мл сифимга эга бурама қопқоқли микроцентрифугали идиш (Fisher Scientific, Waltham, MA).

2. Колонияларни хисоблашда агарли мухитдаги серияли экмаларни инкубацияси учун қўлланиувчи, юзаси 10×10 см бўлган пластикли Петри косачалари(Fisher Scientific, Waltham, MA).

In Vivo антимикроб ФДТ текширувлари Тажрибалар учун одатда, ўртacha 20 грамм оғирлиқдаги, 6 хафталик сичқонларнинг урғочиларидан BALB / (Charles River Lab, Уилмингтон, Массачусетс) фойдаланилади.

Сичқонларнинг қорин пардаси ичига кетамин / ксилазин (100 мг / кг; 10:1) аралашмасини юбориш орқали анестезия ўтказилди. Сичқонлартанасининг орқа томони қирилди ва кейинги куни жезли блокни қўллаган холда куйиш модели яратилди (Майами, Флорида).

Микроб суспензиясини тайёрлаш. Экма учун мухит тайёрлаш ва шундан сўнг автоклавлаш (бактериялар учун юрак-мияли бульон). Юрак-мияли

бульонга 1,5%ли микробиологик агар қўшиб қаттиқ мухит тайёрлаш, сўнгра уни 10×10 см ўлчамли квадрат Петри косачаларига қўйиб чиқиш

Стерил илмоқчадан фойдаланган холда агарли пластинадан битта колония олиш ва 3мл ЮМБ сақловчи 15 мл центрифугали пробиркага жойлаштириш. Уни $t = 37^\circ\text{C}$ даги шейкер инкубаторида бир кечага қолдирилади. Тезда ўсуви турларида КОЕни 15-30 дақиқа давомида икки хисса оширилади. Дастребки экилган материал бир кечага қайта экилганда 10^9 КОЕ/млда хужайрага зичлик беради. Хужайра зичлигини 600 - 650 нмли спектрофотометр ёрдамида ўлчаб тахминий хисоблаш мумкин. Бу оптик зичлик кўрсаткичининг чегараси 0,6 атрофида бўлиб, микроорганизм хужайраси зичлигига 10^8 КОЕ /мл мос келади. Стационар культуралар соғ мухитда тахминан 1 соат мобайнида, 100:1 нисбатда суюлтирилгандан сўнг янгиланиши керак. Бактериал хужайрали чўқмалар центрифугалаш йўли орқали ажратиб олинади (13690 об/дақиқа 5 дақиқа давомида). Кейин эса стерил ФБРда исталган зичликка эришилгунга қадар қайда суспензияланади (коида бўйича, 10^8 КОЕ / мл).

Фотосенсибилизаторлар билан инкубация:

Хар бир фотосенсибилизатор учун маълум қонцентрациядан фойдаланилади, биз тилларанг стафилакокк (*S.aureus*) учун 10 мкМ, кўк иириング таёқчаси (*P. Aeruginosa*) учун эса 1млМ қонцентрацияни тавсия этамиз. Инкубацион давр қисқа бўлиши мумкин, 15 дақиқали инкубация кўпгина фотосенсибилизаторлар учун мақбул муддат эканлиги аниқланди. Фотосенсибилизаторли хужайра суспензияси ёритилгунгача ёки акси бўлгунга қадар "washing" усулини қўлланилади. Микроб суспензияли фотосенсибилизаторларни ёруғлик нуридан химоя қилиш учун алюмин фольгадан қоплама мақсадида фойдаланилади.

Иллюминация: Нурлантириш ўтказишнинг энг яхши усули бу 24 – ёки 48-ўйиқчали планшетда иллюминация ўтказишидир. Ёруғлик доғини бир хил

түртта тирқиши диаметрини 3-4 смга мослаган холда созлаш мумкин. Ёритилганик 100 мВт/см² (энергия зичлиги) бўлганда хар дақиқада 6 Дж/см² дан етказиб турилади.

Тажрибанинг ўзига хос хусусиятлари

Тажрибаларнинг бир неча вариантлари ушбу усульнинг самарадорлигини тасдиқлаш мақсадида қўлланилади. Эритилган фотосенсибилизатор (МК) ва бактериал қоришмали биринчи суспензияни центрифугалаш ва кейинчалик ФБРда чўкмани қайта суспензиялаш йўли орқали, “washing” (ёки йўқ) усулида текшириш мумкин. 13690 об./дақиқа тезлиқда, 5 минут давомида центрифугаланади ва бактериал қоришмани ФБР билан бир хил хажмда қайта суспензияланади. Фотодинамик заарсизлантиришнинг иккинчи текшириш усули инкубацион аралашмадаги фотосенсибилизатор қонцентрацияси ва 660нм спектрли нурланишга эга бўлган, 10Дж/см² дозали ёруғлик нурланиши (0,3дан 30мкМгача, тилларанг стафилакокк учун расмда кўрсатилган) орқали амалга оширилади. Бундан ташқари, фотодинамик текширув ўтказишнинг яна бир усули бу инкубацион аралашмада ФС қонцентрациясини доимий сақлашдир (1 мМ МК кўк йиринг таёқча бўлганда). Бундай холатда 320 Дж/см² га етувчи нурланишнинг кучланиш зичлиги ўзгартирилади.

Серияли суйилтиришлар:

Доза-реакция графигини тўзиш учун хар бир суюлтиришдан кейинги яшовчанлик белгилари ўрганиб чиқилади. Биринчиси- хужайраларнинг бирламчи-назорат суспензияси, иккинчиси- МК билан 15 дақиқали инкубациядан кейинги холат(фотосенсибилизаторнинг қоронгулик захрини аниқлаш учун), кейинги эгри чизик- нурланиш давомийлигига кўраўзгаришларни ифодалайди (масалан, 5, 10,20 ва 40 Дж/см²). Микроб хужайра суспензиясининг хар бири стерил ФБРда индивидуал равишда беш маротаба, ўн каррали, серияли суюлтиришдан ўтказилади. Қуйидаги

суюлтирилган эритмаларга эришилади: $1 \times 10 \times$, $100 \times$, $1000 \times$, $\times 10000$ ва 100000 . Микродозаторда хар бир эритмадан олинган 10 мкл хажм Джетт усулида, горизонтал холда Петри косачасидаги агарли пластинка юзасига, тарам-тарам қилиб жойлаштирилади. 24 соатли инкубациядан сўнг пластиналар саналади. Идеал холда хар бир пластинада икки ёки уч қаторни санаб чиқиш мумкин, натижага эса 10 га кўпайтириш ва хар бир эритмада КОЕнинг ўртacha қийматини хисоблаб топиш орқали эришилади.

Фракциянинг яшовчанлик қиймати хужайра назорат суспензиянинг (тўлиқ назорат) КОЕ / млда фотодинамик заарсизлантирилишидан кейин КОЕ/ млни бўлиш йўли орқали олинади. Шунингдек, фотосенсибилизаторсиз ёруғлик захрининг яшовчанлик эгри чизиги ўзгаришини тўзиб чиқиш мумкин. Бизнинг натижалар билан мутлоқ назорат ўртасида сезиларли тафовут аниқланмади.

Назорат саволлари:

53. Оёқлар юза веналарининг тромбофлебитининг клиник кўринишини айтиб беринг:

54. Қандай холларда оёқ юза веналарининг ўткир тромбофлебитида шошилинч жарроҳлик амалиёт кўрсатилади:

55. Оёқлардаги юза веналар тромбофлебитида қонсерватив терапиянинг асосий моментини айтинг:

56. Оёқлар ВВКда юза кўринишини шаклини санаб уting:

57. Юза веналарнинг ўткир тромбофлебитини асосий симптомини айтинг:

58. Юза веналарининг ўткир тромбофлебитининг қайси шаклда Троянов-Тренделенбург операцияси килинади:

59. Тромбофлебит тушунчасига изоҳ беринг:

60. Коммуникант веналарга характерли белгини айтинг

61. Оёқлардаги веноз оқимини қийинлашувига қуйидаги факторлар сабаб булиши мумкин

62. Аорта равоги окклюзион касалликлари этиопатогенези.

63. Аорта равоги окклюзион касаликлари сабаблари нозолик турлари.

64. Аорта равоги окклюзион касалииклари ташхислашда

кўлланиладиган асосий диагностик усуллар.

65. Бош мия сурункали ишемияси классификацияси.

66. Аорта равоги окклюзион касаликлариконсерватив даволаш учун кўрсатмалар.

67. Аорта равоги окклюзион касаликлари оператив даволаш учун кўрсатмалар.

68. Аорта равоги окклюзион касаликлари оператив даволаш умумий принциплари.

69. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари этиопатогенези.

5 Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликларисабаблари нозолик турлари.

70. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари ташхислашда кўлланиладиган асосий диагностик усуллар.

71. Оёқлар сурункали ишемияси классификацияси.

6 Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари консерватив даволаш учун кўрсатмалар.

72. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари даволаш учун кўрсатмалар.

73. Аорта ва оёқ артерияларининг окклюзион касалликлари даволаш умумий принциплари.

74. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар сабаблари

75. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар клиникаси ва таснифи

76. Дифференциал диагностика

77. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар даволаш усуллари

78. Ўткир тромбозлар ва эмболиялар профилактикаси

Фойдаланилганадабиётлар:

15.Robb A, Etchells E, Cusimano MD, et al: A randomized trial of teaching bioethics to surgical residents. *Am J Surg* 189:453, 2015. [PMID: 15820460]

16. Steinemann S, Furoy D, Yost F, et al: Marriage of professional and technical tasks: A strategy to improve obtaining informed consent. *Am J Surg* 191:696. 2014.

17.<http://www.tma.tmn.ru/Vestnik>

18.<http://medi.ru/doc/83.htm>

19.<http://www.rmj.net/index.htm>

20.<http://www.consilium-medicum.com/media/refer>

21.<http://www.mediasphera.aha.ru>

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

Вазиятли масала № 1. Қабул бўлимига 25 ёшли бемор мурожат қилди.

Беморнинг шикоятлари анал соҳасида майда ўсимталар пайдо бўлганига, қичишига. Касаллик тарихи бўйича 3 ой давомида бу ўсимталар пайдо бўлиб, кўпаябошлаган. Объектив кўрганда: bemorni умумий ахволи қониқарли. Анал соҳасини кўрганда анал тешиги атрофида кўплаб хажми $1,0 \times 0,2$; $0,5 \times 0,2$; $0,2 \times 0,3$ см келадиган, оғриқсиз, юмшоқ хосилалар аниқланади. Хосилалар соҳасидаги тери бир оз кизарган ва шишган. Ректоскопия қилинганда анал каналида хам юқорида кўрсатилган хосилалар аниқланади.

Саволлар:

- 1) Сизнинг дастлабки ташхисингиз
- 2) Текшириш режаси
- 3) Дифференциал ташхис
- 4) УАШнинг даволаш тактикаси

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Беморда анал соҳасида ўткир учли қондиломалар аниқланади			
2	Қон ва сийдикнинг умумий анализ, ЭКГ, ректоскопия, қоннинг специфик анализи(реакция Вассермана)			
3	Дифференциал диагностикани бавосир, анал полиплари, сурункали анал ёрмасисифилисва ВИЧ инфекцияси билан ўтказиш керак			
4	Беморни текширишлардан ўтказгандан кейин проктология бўлимига оператив даволаш учун			

	юбориш керак.			
--	---------------	--	--	--

Вазиятли масала №2. 39 ёшли bemорорқа чиқарув тешиги соҳасида оғриқли тугунчалар борлигига, дефекациядан кейин қон келишига, тўғри ичакдан тугунчалар чиқишига ва уни ўзи тўғрилашига, холсизликга, бошини айланишига шикоят бўйича мурожат қилди. Касаллик тарихи бўйича ўзини 3 йилдан бери касал деб хисоблайди. Объектив кўрганда: умумий ахволи қониқарли. Тери қоплами ва шиллиқ қаватлари оқарган. Анал соҳасида соат милини 3, 7, 11 да хажми 2x2; 2,5x3; 3x3 см келадиган эластик қонсистенцияли, кўкимтири тугунчалар аниқланади. Тўғри ичакни бармоқ билан текширганда хам шунга ўхшаш кучсиз оғриқли тугунчалар борлиги аниқланади.

Саволлар:

- 1) Сизнинг тахминий ташхисингиз
- 2) Қандай қўшимча текширишлар ўтказиш керак?
- 3) Дифференциал ташхис
- 4) УАШ ни даволашдаги тактикаси
- 5)

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Беморда ташқи ва ички бавосир касаллиги қон кетиш ва ички тугунчаларни тушиш асорати			
2	Умумий қон ва сийдик анализи, Вассерман анализи, ректоскопия, ЭКГ			
3	Дифференциал ташхисни анал полипи, сурункали анал ёрмаси, сифилис, тўғри ичак саратони, ярали проктит, ўткир учли қондиломалар			
4	Беморни режали хирургик даволаш учун стационарга			

	юбориш.			
--	---------	--	--	--

Вазиятли масала №3. 30 ёшли бемор анал сохасида оғрикли тугунчалар пайдо бўлганига, хожатга борганда оғриқ кучайишига шикоятлари бўйича мурожат қилди. Касаллик тарихи бўйича бу ўзгаришлар 5 кун давомида безовта қиласди. Беморнинг умумий ахволи қониқарли. Махаллий кўрганда: анал сохасида соат милини 7, 11 да хажми 2x2см; 2,5x3см келадиган кўкимтири рангли ўсмасимон тугунча аниқланади. Тугунчаларни пайпаслагандаги у эластик қонсистенцияда, кучли оғриқ сезади.

Саволлар:

1. Сизнинг тахминий ташхисингиз
2. Қандай текширишлар ўтқазиш керак
3. Дифференциал ташхис
4. УАШни даволаш тактикаси
- 5.

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Беморда ташқи ва ички бавосир тромбоз асорати 2 даври			
2	Қон ва сийдикни умумий анализи, ЭКГ, тўғри ичакни бармоқ билан текшириш, оғриқ камайгандан кейин ректоскопия			
3	Дифференциал ташхисни анал полиплари, ўткир парапроктит, сурункали анал ёрмаси, сифилис, тўғри ичак ўсмаси, ўткир учли кондилома			
4	Беморни қонсерватив даволаш учун проктология бўлимига юбориш			

Вазиятли масала №4. 35 ёшли бемор анал соҳасида ўсмасимон хосила борлигига, оғриқларга, дефекация вақтида оғриқларни кучайишига шикоятлари бўйича мурожат қилди. Касаллик тарихи бўйича бундай шикоятлари уч кун давомида пайдо бўлган. Кўрганда: bemorning умумий ахволи қониқарли. Анал соҳасини текширганда соат милини 3 да ҳажми 3x2 см келадиган кукимтир рангли, бир оз қаттиқ-эластик қонсистенцияли хосила аниқланади, пайпаслагандаги оғриқ кучаяди. Анал соҳасида кучли оғриқ бўлгани учун тўғри ичакни бармоқ билан текширишни имкони бўлмади.

Саволлар:

1. Дастребаки ташҳисингиз нима?
2. Қандай текшириш усусларни қўллаш мумкин?
3. Қайси каслликлардан дифференциал диагностикаси қилиш керак?
4. УАШ тактикаси қандай?

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Кониқрсиз жавоб
1	Беморда ташқи бавосир тугунийнинг тромбоз асорати.			
2	Анал соҳасини оғриқсизлантириб тўғри ичакни бармоқ билан текшириш керак, ЭКГ, ректоскопия			
3	Ўткир парапроктит, ўткир учли қондилома, эпителиал думфаза йўли яллиғланиши, тератоид кистанинг йиринглаш асорати, анал ёрмаси биландифференциал ташҳис қилиш.			
4	Беморга қонсерватив даволашни бошлаш ва яллиғланишни бартараф қилиб оператив даволаш.			

Вазиятли масала №5. Бемор 40 ёнда орқа чиқарув тешик соҳасида хожатга борганда кучли оғриқ бўлишига ва бир оз қон кетишига шикоят қиласди. Касаллик тарихи бўйича 3 йил давомида ўзини касал деб ҳисоблади. Кўрганда: умумий ҳолати қониқарли. Орқа чиқарув тешиги соҳасида соат милини 6 да 2,5x1,0x0,5 см ҳажмда, қирғоқлари чандиқли яра борлиги аниқланади. Яранинг ташқи қирғоғида тери тўқимасини бўртиб турганлиги аниқланади.

Саволлар:

1. Сизнинг дастлабки ташхисингиз қандай?
2. Қандай текшириш режаси туздингиз?
3. Қайси касалликлар биландифференциал диагностикаси ўтқазасиз?
4. УАШ даволаш тактикаси.

№	Жавоблар	Макс. балл	Тұлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Беморда сурункали орқа чиқарув тешик ёрмаси оғриқ асорати билан.			
2	Маҳаллий оғриқсизлантириш ёрдамида түғри ичакни бармоқ билан текшириш, ЭКГ ва ректороманоскопия қилиш.			
3	Үткір парапроктит, үткір учли қондилома, эпителиал думғаза йўли йиринглаши ва ташқи ва ички бавосир тромбоз асорати, түғри ичак саратон касаллиги, түғри ичак ўсмалари, тератоид киста яллиғланиши, кокцигодения биландифференциал диагностика ўтқазиш керак.			
4	Беморга оператив даволаш тавсия этилади – ёрмани кесиш, ўлчанган орқа сфинктеротомия.			

№	Баҳо	аъло	яхши	ққониқарлы	қониқарсиз	ёмон
	Ўзлаштириш %	100%-86%	85%-71%	70-55%	54%-37%	36% ва паст

3	Вазиятли масала ва тестлар					
---	---	--	--	--	--	--

4. Амалий қисм

Орқа чиқарув тешик соҳасидаги қасаллик белгиларини аниқлаш

№	Қадам	Бажарилмаган (0 балл)	Тўлиқ тўғри бажарилган (10 балл)
1	Беморни гинекологик креслога ётқизиш ёки тиза-тирсак ҳолатида кўриш		
2	Диққат билан орқа чиқарув тешик соҳасини кўздан кечириш		
3	Тўғри ичакни бармоқ билан текшириш		
4	Ташқи сфинктер тонусини аниқлаш(сфинктерометрия)		
5	Орқа чиқарув тешик атрофи тери ва тери ости клечаткасини, оралиқ, чов соҳа лимфа тугунларини ҳолатини аниқлаш		
6	Аноскопия		
7	Ректороманоскопия		
8	Колоноскопия		
	Жами:		

Ректороманоскопия

Кўрсатма: Тўғри ва чамбар ичакни фаолиятини бўзилиши

Керакли асбоб-ускуналар: ректоскоп, трансформатор, глицерин ёки вазелин , резина қўлқоп. Беморни ҳолати: тизза - тирсак.

Талабага топшириқ: ректороманоскопия қилишга кўрсатма, керакли асбоб-ускуналарни таёrlаш.Ректороманоскопия қилиш усулларини ва унга bemорларни тайёрлаш усулларини тушунтириб бериш.

Ўқитувчининг ахбороти: Талабани билим ва кўникмасини қадамма- қадам баҳолаш.

№	Қадамлар	Бажарилмagan(балл)	Тўлиқ бажарилган (10 балл)
1.	Беморни тозаловчи хукна ёки фортранс билан текширувига тайёрлаш.		
2.	Ректоскопни тубосини глицеринёки вазелин суртиш.		
3.	Ректоскопни орқа чиқарув тешик каналининг 4-5 см чуқурлигига киритгандан кейин обтуратор олинади ва окулят тақилади.		
4.	Тубусни кўз назорати остида20-30 см чуқурликгача ҳаракатлантириб борилади.		
5.	Ичак девори тушганда, тубусни периферик қисми ёпиқ ҳолатда ичак резина баллон билан шиширилади ва ректоскопни астасекин охиригача олиб борилади.		
6.	Тубусни куч билан итармаслик керак, чунки шиллиқ қаватга тирагиб ичакни шикастлаши мумкин. Шифокор доимо ичак бўшлигини қўриши керак.		
7.	Йўғон ичак шиллиқ қавати катарал проктосигмоидитда тўқ- қизил рангла, шишган, қон тўпланиши ва шилиқ билан қопланган бўлади. Йирингли проктосигмоидитда шилиқ қаватига ўчоқли йиринг тўпланиши кузатилади		

	<p>Геморрагик проктосигмоидитда шилиқ қават ёйилган қизариш қон кетиши билан кечади. Ичак бўшлиғида шилиқ, қон моддаси бўлиши мумкин. Шиллик қаватига текканда қон кетиши кузатилади.</p> <p>Ярали проктосигмоидитда нотўғри шаклли яра қиррасини йиртилиши, ўртаси фибриноз қоплама билан қопланган бўлади.</p>		
8.	Полипозда, полипли ўсмалар орасида шилиқ қаватида меъёрий ўзгариш бўлиши мумкин. Ичак ичида шилиқ, йиринг, қон массаси бўлиши мумкин.		
9.	Кроне касаллигида шиллик қаватида полипга ўхшаш шишлар (“булыжная мостовая” симптоми) кузатилади.		
10	Ректороманскопия текшириш давомида лозим булса суртма, биопсия олинади ва таххил қилинади.		
	Бекат бўйича жами баллар		

№	Баҳо	аъло	яхши	қониқарли	қониқарсиз	ёмон
1	Ўзлаштириш в %	100%-86%	85%-71%	70-55%	54%-37%	36% ва пасти
2	Амалий қисми					

5. Фанни билиш ва бажаришни назрат қилиш шакли

- оғзаки;
- ёзма;
- тест;
- вазиятли масалалар;
- амалий кўникмаларни ўзлаштириш.

1. Шу кунда баҳолашни назрат қилиш мезони

№	Баҳо	аъло	яхши	қониқарли	қониқарсиз	ёмон
1	Ўзлаштириш %	100%- 86%	85%- 71%	70-55%	54%-37%	36% ва пости
2	Назарий қисми					
3	Кейс-босқичи	50-43 балл	42,5- 35,5балл	35- 27,5балл	27-18,5 балл	18 балл
4	Ситуацион топшириқлар ва тестлар					
5	Амалий қисми					

Эксперт вараги

1-гурух.

1. Вена томирлари варикоз касаллиги нима?
2. Вена қон томирларини варикоз кенгайиши таснифини гапириб беринг.
3. Сабабини айтиб беринг.

Ҳолат муаммоси ҳақида жадвални тўлдиринг

Муаммо тури	Ҳолат муаммаларини туғилиш сабаблари	Муаммони етиш йўллари

2- гурүү

1. Варикоз касаллигини қандай клиник белгиларини биласиз?
2. Қандай консерватив даволаш усулларнини биласиз?
3. Вена қон томирларини уткыр тромбофлебитиде даволаш тактикаси.

Холат муаммоси ҳақида жадвални түлдириңг

Муаммо түри	Холат муаммаларини туғилиш сабаблари	Муаммони етиш йўллари

3-ИЛОВА

2 - топширик

“Т-чизма” жадвални түлдириңг

Постромбофлебитик синдромни келиб чикиш сабаблари?	Шифокор оёқларда шиш ва огриклар пайдо булса қандай касаллик түғрисида ўйлаш мумкин?

Кейс билан ишлаганда баҳолар кўрсаткичи мезони.

Аудиторияда ишлаганда баҳолар кўрсаткичини мезони.

Гурухнинг руйхат	Фаол гурӯҳ мак. 10 б	Ахборот илюстриатцияси мак. 30 б	Тўлиқ ва аниқ жавоблар мак. 10 б	Жами мак. 50 б
1				
2				

50-48 баллар – аъло, 46- 38 баллар – яхши, 34- 36 баллар – қониқарли 34-32 қониқарсиз, 31 ва пасти – ёмон

Тингловчилар жребия асосида саволларни танлайди кейин З дақиқа тайёрланади ва ҳар биттаси ўзи танлаган саволга жавоб беради. Имконият туғилса бир-бирини тўлдиради ёки жавобларга ўқитувчи тўлдиради.

Карточка №1. Вена қон томири қасалликларига учраган беморларни диспансер ҳисобида кўзатиш.

Беморни клиник кўриш:

- 1) Оёқларда оғриқ ва шишлар пайдо булиш.
- 2) Оёқларда гиперпигментация пайдо булиш.
- 3) Оёқда гиперстезия аломатлари
- 4) Вена қон томирларини варикоз кенгайиши.

Анамнез йифиши:

Қасалликнинг сабаблари

Қасалликнинг ривожланиш вақти

Олган даволар дориларнинг турлари.

Давонинг самараси.

Қайталаш сони.

Лаборатория текшируви:

Умумий қон ва сийдик таҳлили.

Текширув усулларини қўллаш:

Оёқларни кўздан кечириш.

Пальпация ва томирлар аускультацияси.

Оёқларни хаждақи улчаш.

Функционал синамаларни утказиш

Қон томирларини УТТ усуллари

Касалликни шакли ва асоратига қараб шифокорнинг тактикаси.

- Оёқ веналарини варикоз касаллиги компенсатор даврида, асорати бўлмаса оддий профилактик тавсиялар берилади..
- Оёқ веналар варикоз касаллигини асоратлари кузатилса маҳсус ихтисослаштирилган муассасага юборилади.

Интерактив ўйин «саволли тўп»

Кичгина қоғоз бўлагига мавзуга тааллуқли саволларни тўпга ёпишидириди ва саволларга жавоббергандан кейин қоғозни олиб ташланади.

Тўпниталабаларни бирига олиб беради. Тўпни олган талаба қоғозга ёзилган саволлардан бирини олиб жавоб беради. Агар саволларни ҳаммасига жавоб тўғри жавоб берса кейин тўпни бошқа талабага беради. Шундай қилиб, саволларга тўлиқ жавоб бергунча давом этади..

– УТТ дуплексини вена касалликларига ташхис кўйишдаги ахамияти..

Датчикдаги нурланиши частотаси 4 ва 8 МГц, допплеров текшируви билан кўшилиб, томирларни куради. Ёнбош суюкни пастидаги барча жойлашган чукур веналарни текширишга қурби етади. Чукур веналар тромбози ташхисида асосий текширув усули бўлиб, флебографиядан олдинга ўтмокда. Тромб белгилари: вена девори чидамсиз, қон харакатига нисбатан эхогенни кўтарилиши, заарланган жойда қонни йўқлиги. УТТ дуплекси янги ривожланаётган тромб билан эски тромбни фаркини аниклади. Ёнбош веналарнин ичакда газ тўпланиши туфайли текшириш бир канча кийинчиликларга дуч келади. Ташхисни тўғри чикиши - 95%, сезувчанлиги — 94%.

2. Веналар нуксонларини ривожланиши

А. Венани нуксон билан ривожланиши — нисбатан кам ва бир-бирига ўхшамайдиган касалликларни ичига олади: аплазия, гипоплазия, венани кўпайиши ваrudimentар веналар Тугма вена касалликлари артериовеноз мальформациялар билан бирга пайдо бўлиши мумкин..

Б. Клиппеля—Тренон синдроми — тугма вена касалликларининг энг асосийси хисобланади. Бунга триада белгилар тавсифли: томир невуси, туғма томир варикози, юмшок тўқималарни гипертрофияси. Бундан ташкари, чукур веналарни тўлиқ ривожланмаслиги ёки ёки бутунлай бўлмаслиги, иккиламчи

веноз босидақи күтарилиши. Венани бўлмаган жойда коллатерал турлари ўраб олиб, катта девори ингичка варикоз тугунлар чаноқ веналарида пайдо бўлади. Бу эса тўгри ичак ва киндан қон кетишига олиб келади.

Артериовеноз мальформация борлигини билиш учун ангиография килиш керак. Консерватив даво: оёқни күтариб ётиш, эластик бинт тақиши.

3. Ўпка артерияситромбоэмболияси .

Бирданига кўкракда кучли оғриқ, нафас етишмаслиги ва кўкариш(юз, буйин, кўкракни юқори кисми), қон босидақи тушиб кетиши. Бу пайтда ўпка инфаркти қон тупириш ва юқори тана ҳарорати кузатилади.

Ката дозада гепарин (30-50 тыс. ед.), селектив ўпка артериясига ёки вена ичига стрептаза (500 тыс- 1млн. ЕД), авелизин (250 тыс – 1,5 млн. ЕД сут). Кам холларда шошилинч операция – ўпка артериясида эмболэктомия килинади.

4. Чукур вена тромбози

Касалланиш. Чукур веналар тромбози кўп холларда белгисиз ўтади ва билиб бўлмайди. Шунинг учун хам умумий сони маълум эмас. Синтиграфиянинг кўрсатишича ^{125}I -фибриногеном, чукур веналар тромбози билан операциядан кейин 30% bemor 40 ёшдан катталарда учрайди. Чукур венлар тромбозининг яримидан кўпи оёқ паралич бўлганда ва узок пайт тўшакда ётиб колганда аникланади.

Сабаби ва патогенези. Чукур веналар тромбозининг асосий сабаблари патогенитик тромб хосил бўлиш омил(Вирхов учлиги):

- 1) эндотелияни шикастланиши;
- 2) қон харакатини сусайиши;
- 3) қон ивишини кўтарилиши.

Омиллар хавфига юрак етишмаслиги, ката ёш, хавфли ўсмалар, шикастлар, семизлик, узок вакт оёқ ва кўлни иммобилизацияда туриш, узок еток режим, перорал қонтрацептлар кабул килиш, эритремия, тромбоцитоз.

4. 1. Консерватив: оёқ кўтарилиган холатда;эластик бинтни такиши; оёқ учидан сонга караб босим юбориш керак. Бу усуслар постфлебитик синдром ва веналар кенгайганда,тугма артериовеноз мальформациясида энг самарали ҳисобланади.

2. Склеротерапия кичгина варикоз тугунларда ва операциядан кейин қолган варикозларда күлланилади.
 3. Жаррохлик. Энг күп операцияга күрсатма оёқ дефектини косметик тиклаш. Бошка күрсатмалар: қонсерватив давони самарасизлиги, доимий оғрик, асоратлар (қон кетиши, трофик яралар, юза веналар тромбофлебити). Ортирилган артериовеноз оқмалар хам жаррохлик амалиётини талаб қиласы.
58. Тромбофлебит профилактикаси

Тромбофлебит профилактикасида чукур веналар тромбозидан, үпка артерияси эмболияси, посттромбофлебитик синдромлардан тутилиш катта ахамиятга эга. Тромбозни олдини олиш тадбирлари асосан катта ёшдаги одамларга пайдоси катта бўлади. Асосан операциядан кейинги юрак-томир тизимидағи касаллуклари аҳамияти яхши бўлади. Кўрсатиб ўтилган беморларда қонни реологик хоссасини ва микроциркуляциясини, тромбоцитларни адгезив-агрегацион функциясига ингибитор таъсирига эга, қонни коагуляцион потенциалини пасайтирадиган ва яхшилайдиган дорилар тавсия этилиши лозим. Тромбозларни носпецифик профилактикаси: бинт тақиши, болдири мушагини электр токи ёрдамида стимуляция килиш, машқлар бажариш, веноз қон харакатини яхшилаш, операциядан кейин эрта юриш, анемияни тиклаш, сув-электролит етишмаслигини ўз вақтида тиклаш, юрак-томир ва нафас бузилишларини олдини олиш билан курашиш.

Топшириқ №1.

Бемор 65 ёш, кўп йилдан бери оёқ веналари варикоз кенгайиши билан оғрийди. З кун олдин чап болдири орқа медиал кенгайган вена бўйлаб оғриқ борлиги кузатилади. Оғриқ кучайиши билан ҳаракати қийинлашиб иситмаси $37,8^{\circ}\text{C}$ гача етди. Кўрганда: вена бўйлаб тери қизариши кузатилди. Вена катталашган, шнурга ўхшаган шишни пайпаслаганда кучли оғриқ бор. Тери бир қанча қаттиқлашган, қизарган, оғриқли. Панжа ва болдири соҳасида шиш йўқ.

Ташхиси? Текшириш? Тактикаси?

Эталон жавоб:

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавобП	Қониқарсиз жавоб
1	Ката тери ости веналари ўткир	5	5	0

	тромбофлебити			
2	Венани КТТ доплер қилиш	5	5	0
3	Қаттиқ постел режим	5	5	0
4	Оёқни күтариб ётиш	5	5	0
5	Антикаогулянтлар, мазли боғлам, антибиотиклар	5	5	0

Топшириқ №2.

Бемор 70 ёш, иккиламчи сон ва болдир веналари варикоз кенгайиши 10 йил олдин чуқур веналар тромбофлебитидан кейин ривожланган. Бундан ташқари болдирнинг медиал юзасида 10x5 см трофик яра борлиги кузатилади. Бу ярани битишига мойиллиги йўқ. Флебографияда сон ва болдир чуқур веналари реканализицияси ва жуда кўп коммуникант веналар борлиги аниқланди.

Ташхиси? Тактикаси?

Жавобларэталонни:

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	ПТФС, қўзшма шакли	5	5	0
2	Жарроҳлик бўлимига ётқизиш	5	5	0
3	Трофик ярани даволаш	5	5	0
4	Қон таъдақланишини яхшилайдиган дорилар ва антибиотиклар	5	5	0
5	Бэбкок бўйича флебэктомия ва коммуникант венани Линтон бўйича боғлаш	5	5	0

Топшириқ №3

Бемор 62 ёш, баччадон экстирпациясидан 8 кун кейин bemорда бирданига нафас қисилиши, күкракда оғриқ, хушини юқатиш пайдо бўлди. Реанимацион муложалар самарали: хуши ўзига келди. Беморнинг умумий аҳволи жуда оғир. Кўкарган юзи ва юқори танада аниқланди. Ўпкада икки томонлама нафас эшитилади.. Ps-120 та 1 дақда. А/Б - 80/50 мм рт ст. Ўнг оёқда унча катта бўлмаган шиш, чов соҳасида томир чизмасини кучайиши, сон томири бўйлаб оғриқ борлиги кузатилди. Ангиография қилганда “чўлтоқ” белгиси ўпка артерияси чап тармоғида аниқланди.

Қандай касаллик операциядан кейин асорати ривожланди? Нима сабаб бўлди ? Шифокор тактикаси?

Жавобларэталони:

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Операциядан кейин сон веналари флеботромбози	5	5	0
2	Ўпка артерияси чап тармоғи тромбоэмболияси	5	5	0
3	Тромболитиклар ва антикоагулянтларни кава фильтр қўйгандан кейин тавсия қилиш	5	5	0
4	Махаллий мазли боғлам қилиш	5	5	0
5	Давони пойдаси бўлмаганда операция қилиш	5	5	0

Топшириқ №4

Бемор 53 ёш, ўнг оёқда бирданига оғриқ, бижирлаш, қичиш ва истма 37,8. Күрганда: болдир шишган, кўкарган, шишган. Ўнг оёқ юза веналари қизарган шнурга ўхшаб қаттиқлашган. Бу венларда оғиқ кузатилади. Беморни ташхиси. Бу вазиятда қандай асоратлар ривожланиши мумкин?

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Ўнг оёқ веналарининг варикоз кенгайиши декомпенсация босқичи	5	5	0
2	Ўнг оёқ тери ости веналари ўткир тромбофлебити	5	5	0
3	Ўпка артерияси тромбоэмболияси	5	5	0
4	Кўтариувчи тромбоз	5	5	0
5	Веноз гангрена	5	5	0

Топшириқ №5

Бемор 27 ёш, чап оёқни тез чарчаши, катталашиши, оғирлаши, қалтираши, терини қичиши. Болдир ва панжада шиш кузатилади. Шиш кеч пайти пайдо бўлади ва эрталабга йўколади. Охирги хафтадан бери ички тўриқ соҳасида кўкариш ва пигментация падо бўлди. Кўрганда: чап оёқ катта тери ости веналари кенгайган, ётганда аниқ илон шаклида кўринади.

Бемор ташхиси. қандай касалликлар билан дифференциал ташхис килинади.
Даволаш тактикаси

№	Жавоблар	Макс. балл	Тўлиқ жавоб	Қониқарсиз жавоб
1	Ўнг оёқ веналарининг варикоз кенгайиши субкомпенсация босқичи	5	5	0
2	Постромбофлебитик синдроми	5	5	0
3	Паркс-Вебер-Рубашов синдроми	5	5	0
4	Клипнеля-Тренонасиндроми	5	5	0
5	Оператив даво	5	5	0

VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Тингловчи мустақил ишни муайян модулни хусусиятларини ҳисобга олган холда қуидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- меъёрий хужжатлардан, ўқув ва илмий адабиётлардан фойдаланиш асосида модул мавзуларини ўрганиш;
- тарқатма материаллар бўйича маъruzалар қисмини ўзлаштириш;
- автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи дастурлар билан ишлаш;
- маҳсус адабиётлар бўйича модул бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;
- тингловчининг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган модул бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш.

Мустақил таълим мавзулари:

1. Трансплантология Ўзбекистонда қай даражада ривожланган.
2. Ўзбекистонда қайси органлар трансплантация қилишга рухsat берилган.
3. Ўзбекистонда биринчи марта қайси орган трансплантация қилинган ва қаерда.
4. Дунё бўйича трансплантология соҳасида қандай ишлар олиб борилмоқда.

VII ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Авульсия (avulsion)	Куч ишлатиб тўқимани шаклини ўзгартириш ёки бузиш	Imperative destruction or interoption of structure or anatomy
Антростомия (Antrostomy)	Суяк устида тешик яратиш	Artificial formation on the bone the hole
Бистури (Bistoury)	Жаррохлик инструмент – лезвия думолок ёки ўткир шаклида	Surgical knife with round or shurp shape
АЛТ	аланинаминотрансфераза	alanintransferasa
АТ	Антитело	Antybody
Аутотрансплантация	ўз тўқимасини қўчириб ўтказиш	autotransplantation
АФП	а-фетопротеин	a-alfaphetoprotein
Гетеротрансплантация	бошка турдаги донордан тўқима ёки аъзо қўчириб ўтказиш.	Tissue transplantation
Гомотрансплантация -	бир турдаги донордан тўқима ёки аъзо қўчириб ўтказиш	From one donor to other transplantation
Донор	транспалнтация учун аъзо ёки унинг бир қисми олинадиган мавжудот.	Object of transplantation
КТ	компьютерная томография	Computer tomography
МРТ	магнитно-резонансная томография	Magnit –resonance tomography
H1	гематокрит	hematocrit

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1. Lane C. A. Nephrology: a specialty in need of resuscitation? / C. A. Lane, M. A. Brown // Kidney International. — 2015. — B. 76. — P. 594–596.
2. The critical pathway for deceased donation: reportable uniformity in approach to deceased donation / B. Domingues^{<Gil}, F. L. Delmonico, F. A. M. Shaheen [et al.] // Transplant. International.-2014. — № 4. — P. 373–378.
3. Wynn J. J. Increasing organ donation and transplantation: the U.S. experience over the past decade / J. J. Wynn, C. E. Alexander // Transplant. International. — 2014. — № 4. — P. 324–332
4. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной хирургии. Белов Ю.В., М., издательство Де Ново, 2014.

Интернет ресурслар:

1. Axborot resurs markazi <http://www.assc.uz/>
2. <http://www.xabar.uz>
3. www.ziyonet.uz
4. www.edu.uz
5. www.pedagog.uz
6. www.tdpu.uz
7. <http://nces.ed.gov/v./pub/search/index>.
8. [http://emedicine.com/ent/NASAL AND SINUS DISEASES.htm](http://emedicine.com/ent/NASAL%20AND%20SINUS%20DISEASES.htm)
9. [http://www.emedicine.com/ent/MEDICAL TOPICS.htm](http://www.emedicine.com/ent/MEDICAL%20TOPICS.htm)
10. www.tma.uz,
11. www.medline.ru,
12. www.rambler.ru/oncology
13. www.oncoweb.ru,
14. www.esmo.org