



Бош илмий-методик
марказ

ФАРҒОНА
ДАВЛАТУНИВЕРСИТЕТИ
ХУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ
КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ
ВА УЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ МИНТАҚАВИЙ
МАРКАЗИ



“ЗАМОНАВИЙ ГЕОМЕТРИЯ”

МОДУЛИ БЎЙИЧА
ЎҚУВ –УСЛУБИЙ МАЖМУА

А.Юсупова, ФарДУ
Математика
кафедраси доценти,
ф.м.ф.н.

2021

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил декабрдаги 648-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди ФарДУ Илмий кенгашининг 2020 йил «28» декабрдаги 2-сонли қарори билан тасдиқланган.

Тузувчи:

**А.Юсупова – ФарДУ Математика
кафедраси доценти, ф.м.ф.н.**

Тақризчилар:

**Э.Азизов – ФарДУ Математика
кафедраси доценти, ф.м.ф.н.**

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	12
III. НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	15
VI. КЕЙСЛАР БАНКИ	76
ГЛОССАРИЙ	82

Ў.ИШЧИ ДАСТУР

КИРИШ

Дастур Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорларида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиққан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш, соҳага оид илғор хорижий тажрибалар, янги билим ва малакаларни ўзлаштириш, шунингдек амалиётга жорий этиш кўникмаларини такомиллаштиришни мақсад қилади.

Мазкур дастур замонавий талаблар ва ривожланган хорижий давлатларнинг олий таълим соҳасида эришган ютуқлар ҳамда орттирилган тажрибалар асосида «Математика» қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналиши учун тайёрланган намунавий ўқув режа ҳамда дастур мазмунидан келиб чиққан ҳолда тузилган бўлиб, у қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришда хизмат қилади.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Замонавий геометрия” модулининг мақсади: педагог кадрларни инновацион ёндошувлар асосида ўқув-тарбиявий жараёнларни юксак илмий-методик даражада лойиҳалаштириш, соҳадаги илғор тажрибалар, замонавий билим ва малакаларни ўзлаштириш ва амалиётга жорий этишлари учун зарур бўладиган касбий билим, кўникма ва малакаларини такомиллаштириш, шунингдек уларнинг ижодий фаоллигини ривожлантиришдан иборат.

“Замонавий геометрия” модулининг вазифаларига қуйидагилар киради:

- “Математика” йўналишида педагог кадрларнинг касбий билим, кўникма, малакаларини такомиллаштириш ва ривожлантириш;

- педагогларнинг ижодий-инновацион фаоллик даражасини ошириш;

- мутахассислик фанларини ўқитиш жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва хорижий тилларни самарали татбиқ этилишини таъминлаш;

- мутахассислик фанлари соҳасидаги ўқитишнинг инновацион технологиялари ва илғор хорижий тажрибаларини ўзлаштириш;

“Математика” йўналишида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларини фан ва ишлаб чиқаришдаги инновациялар билан ўзаро интеграциясини таъминлаш.

Модул якунида тингловчиларнинг билим, кўникма ва малакалари ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар:

Математика фанлари бўйича тингловчилар қуйидаги янги билим, кўникма, малака ҳамда компетенцияларга эга бўлишлари талаб этилади:

Тингловчи:

- интеграл ва ўлчов тушунчаларини;
- геометриянинг чизиқли фазо ва чизиқли акслантиришлар ёрдамида баён этилиши, вектор алгебрасидан фойдаланишни;
- математик масалаларни математик тизимларда ечишни ва стандарт функциялардан фойдаланишни;
- математикани ўқитишда унинг татбиқлари билан тушунтиришни, ҳаётий ва соҳага оид мисолларни;
- математик фанларни ўқитишнинг замонавий усулларини *билиши* керак.

Тингловчи:

- ўлчовлар назариясидан математика, физика ва биология масалаларида кенг фойдаланиш;
- математик анализнинг биоматематика, механика, оммавий хизмат назарияси, иқтисодий соҳалар ва бошқа соҳаларда кенг қўллаш;
- математик фанларни ўқитишда инновацион таълим методлари ва воситаларини амалиётда қўллаш;
- талабанинг ўзлаштириш даражасини назорат қилиш ва баҳолашнинг назарий асослари ҳамда инновацион ёндашув услубларини тўғри қўллай олиш *кўникмаларига* эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

- ўлчовлар назарияси ва унинг татбиқини турли фазоларда қўллай олиш;
- геометриянинг чизиқли фазо ва чизиқли акслантиришлар ёрдамида баён этилиши, вектор алгебрасидан фойдаланиш;
- математикани ўқитиш инновацион жараёнини лойиҳалаштириш ва ташкиллаштиришнинг замонавий усулларини қўллаш *малакаларига* эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

- математикани ўқитишда фойдаланиладиган замонавий (matlab, mathcad, maple, GeoGebra ва бошқалар) математик пакетларини ўқув жараёнига татбиқ этиш;
- математиканинг хориж ва республика миқёсидаги долзарб муаммолари, ечимлари, тенденциялари асосида ўқув жараёнини ташкил этиш;
- математикани турли соҳаларга татбиқ этиш;
- олий таълим тизимида математик фанлар мазмунининг узвийлиги ва узлуксизлигини таҳлил қила олиш *компетицияларига* эга бўлиши лозим.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар илғор хорижий мамлакатларда биология ўқитишни ташкил қилишнинг хорижий тажрибаларни ўрганиш, амалда қўллаш ва баҳолашга доир касбий компетентликка эга бўладилар. Сўнгги йилларда математика соҳасидаги ютуқлар ва истиқболлар олий ўқув юртларидаги таълим жараёнининг мазмунини бойитишга хизмат қилади.

“Замонавий геометрия” модулининг соатлар бўйича тақсимооти

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юклараси, соат				Кўчма машғулот
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юклараси			
			Жами	жумладан		
			Назарий	Амалий машғулот		
1.	Чизиқли фазо.	4	4	2	2	
2.	Евклид фазоси.	4	4	2	2	
3.	Псевдоевклид фазо.	4	4	2	2	
4.	Гиперболик фазо.	4	4	2	2	
5.	Иккинчи тартибли сиртлар. Иккинчи тартибли сирт инвариантлари.	2	2		2	
6.	Кўпхилликлар. Кўпхиллик турлари. Кўпхиллик геометрияси.	2	2		2	
Жами:		20	20	8	12	0

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-Мавзу: Чизиқли фазо.

1. Чизиқли фазо ўлчами. Аффин фазо.
2. Аффин координаталар системаси.
3. Аффин алмаштиришлар ва текисликлар. Бичизиқли форма.

2-Мавзу: Евклид фазоси.

1. Евклид фазосида чизиқ ва сиртлар.
2. Сирт дифференциал геометрияси.
3. Сирт ички геометрияси. Сирт ташқи геометрияси.

3-Мавзу: Псевдоевклид фазо.

1. Сферик фазо.
2. Риман геометрияси.

4-Мавзу: Гиперболик фазо.

1. Ярим Евклид фазолар.
2. Ярим гиперболик фазолар.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР

1-Амалий машғулот. Чизикли фазо.

2-Амалий машғулот. Евклид фазоси.

3-Амалий машғулот. Псевдоевклид фазо.

4-Амалий машғулот. Гиперболик фазо.

5-Амалий машғулот. Иккинчи тартибли сиртлар. Иккинчи тартибли сирт инвариантлари.

6-Амалий машғулот. Кўпхилликлар. Кўпхиллик турлари. Кўпхиллик геометрияси.

АДАБИЁТЛАРРЎЙХАТИ

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-ЖИЛД / Ш.М. Мирзиёев. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 592 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-ЖИЛД / Ш.М. Мирзиёев. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 400 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-ЖИЛД / Ш.М. Мирзиёев. – Т.: “Ўзбекистон”, 2018. – 592 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз. – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 488 б.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 592 б.

II. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июнь “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли Фармони.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февраль “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрель “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли Қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрь “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 май “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сон Фармони.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июнь “2019-2023 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4358-сонли Қарори.

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 август “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли Фармони.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрь “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.

Ш. Махсус адабиётлар

16. Andrea Prosperetti, *Advanced Mathematics for Applications*, Cambridge University Press, 2011.

17. Bauer, H. *Measure and Integration Theory*, Berlin: de Gruyter, ISBN-13: 978-3110167191, 2001.

18. Bear, H.S. *A Primer of Lebesgue Integration*, San Diego: Academic Press, 2nd Edition, 2001.

19. Bobenko A.I. (Ed.) *Advances in Discrete Differential Geometry*//Springer, 2016. — 439 p. — (Mathematics). — ISBN: 3662504464

20. Bogachev, V. I. *Measure theory*, Berlin: Springer, 2006.

21. David Spencer “Gateway”, Students book, Macmillan 2012.

22. *English for Specific Purposes*. All Oxford editions. 2010. 204.

23. Evan M. Glazer, John W. McConnell *Real-Life Math: Everyday Use of Mathematical Concepts*//2013, ISBN-13: 978-0313319983

24. Georgii H.O. *Gibbs measures and phase transitions*. Berlin:de Gruyter, 657 p., 2011.

25. H.Q. Mitchell “Traveller” B1, B2, MM Publications. 2015. 183.

26. H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni “PIONEER”, B1, B2, MM Publications. 2015. 191.

27. I. M. Rikhsiboev and N. S. Mohamed, *Engineering Mathematics 2*, Malaysia, 2019.

28. Jim Libby, *Math for Real Life: Teaching Practical Uses for Algebra, Geometry and Trigonometry*// 2019, 234p. ISBN: 978-1476667492

29. Karl Berry, *The TEX Live Guide*—2020

30. Lindsay Clandfield and Kate Pickering “Global”, B2, Macmillan. 2013. 175.

31. Manfredo P. Do Carmo. *Differential geometry of Curves and surface* // Dover publications, Inc. Mineola, New York, 2016. – 529 pp.

32. *Maple 15 user manual*, Maplesoft, 2016, 462 p.

33. Margaret L. Lial, Thomas W. Hungerford, John P. Holcomb, Bernadette Mullins, *Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences* (11th Edition), Pearson 2018.

34. Rao, M. M. *Random and Vector Measures*, Series on Multivariate Analysis, 9, World Scientific, 2012.

35. Steve Taylor “Destination” Vocabulary and grammar”, Macmillan 2010.

36. Tao, Terence. An Introduction to Measure Theory. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2019.
37. Weaver, Nik Measure Theory and Functional Analysis. World Scientific, 2013, 423 p.
38. Авилова Л.В., Болотюк В.А., Болотюк Л.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра// 2013. Издание: 1-е изд. 421 с.
39. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия, М.: Наука, 1990. – 672 с.
40. Белогуров А.Ю. Модернизация процесса подготовки педагога в контексте инновационного развития общества: Монография. — М.: МАКС Пресс, 2016. — 116 с. ISBN 978-5-317-05412-0.
41. Гулобод Кудратуллоҳ кизи, Р.Ишмухамедов, М.Нормухаммедова. Анъанавий ва ноанъанавий таълим. – Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази” нашриёти, 2019. 312 б.
42. Ибраймов А.Е. Масофавий ўқитишнинг дидактик тизими. методик қўлланма/ тузувчи. А.Е.Ибраймов. – Тошкент: “Lesson press”, 2020. 112 бет.
43. Ишмухамедов Р.Ж., М.Мирсолиева. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. – Т.: «Fan va texnologiya», 2014. 60 б.
44. Кириянов Д. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 432 с.
45. Муслимов Н.Ава бошқалар. Инновацион таълим технологиялари. Ўқув-методик қўлланма. – Т.: “Sano-standart”, 2015. – 208 б.
46. Образование в цифровую эпоху: монография / Н. Ю. Игнатова; М-во образования и науки РФ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 128 с. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54216/1/978-5-9544-0083-0_2017.pdf
47. Олий таълим тизимини рақамли авлодга мослаштириш концепцияси. Европа Иттифоқи Эрасмус+ дастурининг кўмагида. https://hiedtec.ecs.uniruse.bg/pimages/34/3_UZBEKISTAN-CONCEPT-UZ.pdf
48. Современные образовательные технологии: педагогика и психология: монография. Книга 16 / О.К. Асекретов, Б.А. Борисов, Н.Ю. Бу-гакова и др. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 318 с. <http://science.vvsu.ru/files/5040BC65-273B-44BB-98C4-CB5092BE4460.pdf>
49. Усмонов Б.Ш., Ҳабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш.–Т.: “ТКТИ” нашриёти, 2019.


IV. Интернет сайтлар

50. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:
www.edu.uz.
51. Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz
52. www. Ziyonet. Uz
53. Открытое образование. <https://openedu.ru/>
54. <https://www.ucl.ac.uk/ioe/courses/graduate-taught/mathematics-education->
ma
55. <https://www.onlinestudies.com/Courses/Mathematics/Europe/>
56. <https://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=mathematics-&op=Search>
57. <https://www.msu.ru/en/projects/proekt-vernadskiy/news/math-teachers-advanced-training.html>
58. <https://english.spbu.ru/education/graduate/master-in-english/90-program-master/2455-advanced-mathematics>

II.МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

Давра столининг тузилмаси.

Ёзма давра суҳбатида стол-стуллар айлана шаклида жойлаштирилиб, ҳар бир таълим олувчига конверт қоғози берилади. Ҳар бир таълим олувчи конверт устига маълум бир мавзу бўйича ўз саволини беради ва “Жавоб варақаси”нинг бирига ўз жавобини ёзиб, конверт ичига солиб қўяди. Шундан сўнг конвертни соат йўналиши бўйича ёнидаги таълим олувчига узатади. Конвертни олган таълим олувчи ўз жавобини “Жавоблар варақаси”нинг бирига ёзиб, конверт ичига солиб қўяди ва ёнидаги таълим олувчига узатади. Барча конвертлар айлана бўйлаб ҳаракатланади. Якуний қисмда барча конвертлар йиғиб олиниб, таҳлил қилинади. Қуйида “Давра суҳбати” методининг тузилмаси келтирилган



“Давра суҳбати” методининг афзалликлари:

- ўтилган материалнинг яхши эсда қолишига ёрдам беради;
- барча таълим олувчилар иштирок этадилар;
- ҳар бир таълим олувчи ўзининг баҳоланиши масъулиятини ҳис этади; ўз фикрини эркин ифода этиш учун имконият яратилади**“Кейс-стади”**

методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натига (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари.

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

“Ассесмент” методи.

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўникмаларини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўникмалар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент”лардан маъруза машғулотларида талабаларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

1-МАВЗУ:ЧИЗИҚЛИ ФАЗО

РЕЖА:

1. Чизикли фазо ўлчами. Афин фазо.
2. Афин координаталар системаси.
3. Афин алмаштиришлар ва текисликлари. Бичизикли форма.

Таянч иборалар: Чизикли фазо, ўлчами, афин фазо, афин координаталар системаси, афин алмаштиришлар ва текисликлари, бичизикли форма.

Чизикли фазо ўлчами. Афин фазо.

Кўп ҳолларда шундай объектлар билан иш кўришга тўғри келадикки, бунда уларни қўшиш ва бирор сонга кўпайтириш амалларини бажариш лозим бўлиб қолади. Бир неча мисол келтирамиз.

Геометрияда бундай объектлар уч ўлчамли фазодаги векторлар, яъни йўналишли кесмалардир. Агар йўналишли икки кесмани параллел кўчириш йўли билан устма-уст тушириш мумкин бўлса, улар айна бир векторни аниқлайди деб ҳисобланади. Шунинг учун бу кесмаларнинг ҳаммасини бир нуқтадан бошлаб чиқариш қулай. Бу нуқтани биз координаталар боши деб атаймиз. Маълумки, векторларни қўшиш амали қуйидагичадир: x ва y векторларнинг йиғиндиси деб, томонлари x ва y бўлган параллелограммнинг диагонали ҳисобланади. Векторни сонга кўпайтириш амали ҳам маълум усул билан киритилади.

1. Алгебрада биз n та сондан иборат $x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \dots + \xi_n e_n$

кўринишдаги системалар (масалан: матрицанинг йўллари, чизикли форма коэффициентлари, тўплами ва ҳ.к.) билан иш кўришга тўғри келади. Бундай системаларни қўшиш ва сонга кўпайтириш амаллари одатда қуйидагича киритилади: $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ ва $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ системалар йиғиндиси деб, $x + y = (\xi_1 + \eta_1, \xi_2 + \eta_2, \dots, \xi_n + \eta_n)$ системага айтилади. $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ система билан λ соннинг кўпайтмаси деб, $\lambda x = (\lambda \xi_1, \lambda \xi_2, \dots, \lambda \xi_n)$ системага айтилади. Анализда функцияларни қўшиш ва уларни сонга кўпайтириш амаллари тўғрисида т таъриф берилади. Аниқлик учун бундан сўнг $[a, b]$ сегментда берилган ҳамма узлуксиз функциялар тўпламини текшираемиз.

Келтирилган мисолларда қўшиш ва сонга кўпайтиришдан иборат худди бир хил амаллар мутлақо ҳар хил объектлар устида бажарилади. Бундай мисолларнинг ҳаммасини бир нуқтаи назар билан ўрганиш учун, биз чизикли, яъни афин фазо тушунчасини киритаемиз.

1-таъриф. Агар куйидаги шартлар бажарилса, x, y, z, \dots элементларнинг V тўплами чизиқли (афин) фазо дейилади:

а) ҳар икки x ва y элементларга x ва y элементлар йиғиндиси деб аталадиган z элемент мос қилиб қўйилган; x ва y элементларнинг йиғиндиси $x+y$ билан белгиланади;

б) бирор майдоннинг ҳар бир x элементи ва ҳар бир λ сон билан x элемент кўпайтмаси деб аталган λx элемент мос қилиб қўйилган.

Бу амаллар куйидаги талабларни (аксиомаларни) қаноатлантириши керак. 1⁰. $x+y=y+x$ (коммутативлик), 2⁰. $(x+y)+z=x+(y+z)$ (ассоциативлик), 3⁰. Ҳар қандай x учун шундай 0 элемент мавжудки, $x+0=x$ бўлади. 0 элемент ноль элемент дейилади.

4⁰ Ҳар қандай x учун $-x$ билан белгиланадиган шундай элемент мавжудки, $x+(-x)=0$ бўлади.

$$1^0 \quad 1x=x,$$

$$2^0 \quad \alpha(\beta x) = \alpha\beta(x).$$

$$3^0 \quad (\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x,$$

$$4^0 \quad \alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y.$$

Биз қўшиш ҳамда сонга кўпайтириш амалларини қандай таърифланиши ҳақида гапирмаганимиз бежиз эмас. Биз бу амалларни фақат юқорида таърифланган аксиомаларга буйсунишларини талаб қиламиз ҳолос. Шунинг учун ҳар қачон юқорида қайд қилинган шартларни қаноатлантирувчи амаллар билан иш кўрар эканмиз, биз уларни қўшиш ва сонга кўпайтириш амаллари деб, элементлари устида бу амаллар бажарилган тўплаларни эса чизиқли фазо деб ҳисоблашга ҳақлимиз. Юқорида келтирилган 1-3 мисоллар бу аксиомаларга буйсунади.

Яна бир мисол кўриб чиқайлик;

1. Даражаси натурал n сондан ошмайдиган ва одатдагича қўшиш ва бирор сонга кўпайтириш амаллари бажариладиган ҳамма кўпхадлар тўплами чизиқли фазо ҳосил қилади.

Ёлғиз n -даражали кўпхадлар тўплами чизиқли фазо ташкил қилмайди, чунки n -даражали икки кўпхад йиғиндиси n дан пастрок бўлиб чиқиши ҳам мумкин; масалан, $(t^n+t) + (-t^n+t) = 2t$.

Чизиқли фазо элементларини биз *векторлар* деб атаймиз. Бу сўзнинг кўпинча тор маънода (1-мисолдаги каби) ишлатиши бизни чалғитмаслиги керак. Бу чизиқ билан боғлиқ бўлган геометрик тасавурлар бир қанча натижаларни ойдинлаштиришга, баъзи ҳолларда эса бу натижаларни олдиндан кўра билишга ёрдам беради.

Агар чизиқли фазо таърифида қатнашаётган λ, μ, \dots сонлар ҳақиқий бўлса, у

ҳолда фазохақиқий чизиқли фазо дейилади.

Биз λ, μ, \dots ларни ихтиёрий F майдон элементлари деб умумийроқ фарз этишимиз мумкин. Бу ҳолда V фазо F майдондаги чизиқли фазо дейилади. Қуйида баён этиладиган тушунча ва теоремаларнинг кўпчилиги ихтиёрий майдондаги чизиқли фазалар учун ҳам бевосита тўғри бўлади.

2. Афин координаталар системаси.

Бундан кейин векторларнинг чизиқли боғлиқлиги ва чизиқли эркилиги деган тушунчалар муҳим аҳамиятга эга бўлади.

2-таъриф. V -чизиқли фазо бўлсин. Агар камида биттаси нолдан фарқ қиладиган $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \theta$ сонлар мавжуд бўлиб, $\alpha x + \beta y + \gamma z + \dots + \theta v = 0$ (1) тенглик ўринли бўлса, бу ҳолда x, y, z, \dots, v векторлар чизиқли боғлиқ векторлар дейилади.

Чизиқли боғлиқ бўлмаган векторлар чизиқли эрки векторлар дейилади. Бошқача қилиб айтганда, $\alpha x + \beta y + \gamma z + \dots + \theta v = 0$ тенглик $\alpha = \beta = \gamma = \dots = \theta = 0$ бўлган ҳолдагина ўринли бўлса, x, y, z, \dots, v векторлар чизиқли эрки векторлар дейилади. x, y, z, \dots, v векторлар чизиқли боғлиқ, яъни улар (1) муносабат билан боғланган бўлсин ва ундаги коэффициентлардан камида биттаси, масалан, α нолдан фарқли деб фарз қилайлик. Бу ҳолда $\alpha x = -\beta y - \gamma z - \dots - \theta v$ бўлади.

Буни энди α га бўлиб ва деф фарз қилиб, $-\frac{\beta}{\alpha} = \lambda, -\frac{\gamma}{\alpha} = \mu, \dots, -\frac{\theta}{\alpha} = \zeta$ α тенгликни ҳосил қиламиз. $x = \lambda y + \mu z + \dots + \zeta v$ Агар x вектор y, z, \dots, v векторлар орқали (2) кўринишдаги тенглик билан ифода этилса, у ҳолда биз x вектор y, z, \dots, v векторларнинг чизиқли комбинацияси деб атаймиз.

Шундай қилиб, агар x, y, z, \dots, v векторлар чизиқли боғлиқ бўлса, у ҳолда улардан камида биттаси қолганларининг чизиқли комбинациясидан иборат бўлади. Тескарасини, яъни биттаси қолганларининг чизиқли комбинациясидан иборат бўлган векторлар чизиқли боғлиқ векторлар бўлишининг ҳам тўғрилигини кўрсатиш мумкин.

Энди фазонинг ўлчамлар сони (ўлчамлиги) тушунчасини киритишга ўтамиз.

Тўғри чизиқдаги векторлар тўпламида ҳар қандай иккита вектор пропорционал, яъни чизиқли боғлиқдир. Текисликда иккита чизиқли эрки векторни топиш мумкин, аммо ундаги ҳар қандай учта вектор чизиқли боғлиқдир.

Агар V – уч ўлчамли фазодаги векторлар тўплами бўлса, у ҳолда V да учта чизиқли эрки векторни топиш мумкин, аммо бундаги ҳар қандай тўртта вектор чизиқли боғлиқ бўлади.

Биз кўрамизки, тўғричизиқ, текислик ва уч ўлчамли фазодаги чизиқли эрки векторларнинг максимал сони геометриядаги тўғри чизиқ, текислик ҳамда фазонинг ўлчами сонига тўғри келади. Шунинг учун қуйидаги умумий таърифни қабул қилишимизтабиий.

3-таъриф. Агар V чизиқли фазода n та чизиқли эрки вектор мавжуд бўлиб, бундан

ортиқ чизикли эрки векторлар бўлмаса, V фазо n ўлчамли фазо дейилади $\dim V = n$ деб белгиланади. Агар V фазода чексиз кўп чизикли эрки векторлар топиш мумкин бўлса, у ҳолда V фазо чексиз ўлчамли фазо дейилади.

Чексиз ўлчамли фазолар математиканинг махсус бўлимларида текширилади. Биз бу курсда фақат чекли ўлчамли фазолар билан шуғулланамиз.

Тестлар

№	Тест топшириғи	Тўғри жавоб	Муқобил жавоб	Муқобил жавоб	Муқобил жавоб	Мавзу
1.	n ўлчамли V фазонинг тўплами V нинг базиси деб аталади. Нукталар ўрнини тўлдириг	n та чизикли эрки векторлари	n та векторлари	n та чизикли векторлари	чизикли эрки векторлари	1-мавзу
2.	x, y, z, \dots элементларнинг V тўплами чизикли (аффин) фазо бўлиши учун нечта шарт бажарилиши керак?	2	3	1	4	1-мавзу
3.	Чизикли фазо элементларини нима деб аталади?	векторлар	сонлар	тенгнамалар	илдизлар	1-мавзу
4.	Чизикли фазонинг ҳарбир элементи базис орқали..... чизикли ифодаланишини кўрсатинг. Нукталар ўрнини тўлдириг	ягона равишда	Чексиз кўп	Икки кўринишда	Уч кўринишда	1-мавзу
5.	Чизикли боғлиқ бўлмаган векторлар нима деб аталади?	чизикли эрки векторлар	эрки векторлар	чизикли векторлар	чизиксиз эрки векторлар	1-мавзу
6.	Базис ўзгарганда векторнинг координаталари	ўзгаради	ўзгармайди	домийлигини сақлайди	базис ўзгармайди	1-мавзу
7.	Уч ўлчамли фазода базис қандай ҳосил қилинади?	текисликда ётмаган ҳар қандай учта вектор	Бир текисликда ётган ҳар қандай учта вектор	текисликда ётмаган ҳар қандай иккита вектор	ҳар қандай учта вектор	1-мавзу
8.	Агар V фазода чексиз кўп чизикли эрки векторлар топиш мумкин бўлса, у ҳолда V фазо фазо дейилади. Нукталар ўрнини тўлдириг	Чексиз ўлчамли	Чекли ўлчамли	Ўлчамга эга бўлмаган	Фазо бўлмайди	1-мавзу
9.	x ва y векторларни қўшишда	уларнинг координаталари қўшилади.	Биринчи координаталари қўшилади, қолган координаталари ўзгаришсиз қолади	уларнинг координаталари ўзгармайди	x ва y векторларни қўшиш амали аниқланмаган	1-мавзу
10.	x векторни λ сонга кўпайтиришда	унинг координаталари шу сонга кўпайтирилади.	унинг координаталари 0 кўпайтирилади.	унинг координаталари бир сонга кўпайтирилади.	унинг координаталари шу сонга кўпайтирилмайди.	1-мавзу

Шаклан бир бирига яқин савол-жавоблар:

савол	жавоб
Агар V чизикли фазода n та чизикли эрки вектор мавжуд бўлиб, бундан ортиқ чизикли эрки векторлар бўлмаса, V фазо қандай фазо деб аталади?	V фазо n ўлчамли фазо дейилади
V фазо n ўлчами қандай белгиланади?	$\dim V$
Агар V фазода чексиз кўп чизикли эрки векторлар топиш мумкин бўлса, u холда V фазо қандай фазо деб аталади?	V фазо <i>чексиз ўлчамли</i> фазо дейилади.
Чизикли фазо элементларини нима деб аталади?	векторлар

Ўқув тестлар

Савол	Жавоб
Уч ўлчамли фазода базис қандай ҳосил қилинади?	Бир текисликда ётмаган ҳар қандай учта вектор
Даражаси натурал n сондан ошмайдиган ва одатдагича кўшиш ва бирор сонга кўпайтириш амаллари бажариладиган ҳамма кўпхадлар тўплами нима ҳосил қилади?	чизикли фазо ҳосил қилади
n ўлчамли V фазонинг n та чизикли эрки векторлари тўплами нима ҳосил қилади?	V нинг базисини ҳосил қилади
Агар V фазода чексиз кўп чизикли эрки векторлар топиш мумкин бўлса, u холда қандай фазо ҳосил қилинади?	Чексиз ўлчамли фазо ҳосил қилинади

Назорат саволлари:

1. Параллел тўғри чизиклар боғлами деб нимага аталади ?
2. Чизикли фазо таърифини айтинг.
3. Чизикли фазога мисоллар келтиринг
4. Тўғри чизиклар боғлами деб нимага аталади ?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Advanced Mathematics for Applications, Cambridge University Press, 2011.
2. Bauer, H. Measure and Integration Theory, Berlin: de Gruyter, ISBN-13: 978-3110167191, 2001.
3. Bear, H.S. A Primer of Lebesgue Integration, San Diego: Academic Press, 2nd Edition, 2001.
4. Bobenko A.I. (Ed.) Advances in Discrete Differential Geometry//Springer, 2016. — 439 p. — (Mathematics). — ISBN: 3662504464
5. Bogachev, V. I. Measure theory, Berlin: Springer, 2006.
6. David Spencer “Gateway”, Students book, Macmillan 2012.
7. English for Specific Purposes. All Oxford editions. 2010. 204.
8. Evan M. Glazer, John W. McConnell Real-Life Math: Everyday Use of Mathematical Concepts//2013, ISBN-13: 978-0313319983
9. Georgii H.O. Gibbs measures and phase transitions. Berlin: de Gruyter, 657 p., 2011.
10. Q. Mitchell “Traveller” B1, B2, MM Publications. 2015. 183.
11. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni “PIONEER”, B1, B2, MM Publications. 2015. 191.
12. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия, М.: Наука, 1990. – 672 peretti, Advanced Mathematics for Applications, Cambridge University Press, 2011.

2-МАВЗУ: ЕВКЛИД ФАЗОСИ.

РЕЖА:

1. Евклид фазосида чизик ва сиртлар.
2. Сирт дифференциал геометрияси.
3. Сирт ички геометрияси. Сирт ташқи геометрияси.

Таянч иборалар: Евклид фазоси, Ортогонал ва ортонормал системалар.

E -хақиқий сонлар устида вектор фазо бўлиб, унда қандайдир қонун ёки қоида бўйича \forall 2 векторнинг скаляр кўпайтириш деб аталувчи (x, y) сон аниқланган бўлиб, бу 4 та

1. $\forall x, y \in E$ учун $(x, y) = (y, x)$
2. $\forall x, y, z \in E$ учун $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
3. $\forall x \in E, \forall \lambda \in R, (\lambda x, y) = \lambda(x, y)$
4. $\forall x \neq 0 (x, x) > 0 (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta$

шартларни қаноатлантирса, у ҳолда бундай вектор фазони Евклид фазоси дейилади.

Масалан: $E = R^3$; $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$

$$(x, y) = (x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + x_3 \cdot y_3) \quad (1)$$

1) $(x, y) = (y, x)$

2) $(x + y, z) = (x_1 + y_1) \cdot z_1 + (x_2 + y_2) \cdot z_2 + (x_3 + y_3) \cdot z_3 =$
 $= (x_1 z_1 + x_2 z_2 + x_3 z_3) + (y_1 z_1 + y_2 z_2 + y_3 z_3) = (x, z) + (y, z)$

3) $(\lambda x, y) \stackrel{(1)}{=} \lambda x_1 y_1 + \lambda x_2 y_2 + \lambda x_3 y_3 = \lambda(x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3) = \lambda(x, y)$

4) $(x, x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0$

Теорема: Евклид фазосида қуйидаги Коши-Буняковский тенгсизлиги ўринли.

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad (2)$$

Исбот. $\forall \lambda \in R, \forall x \cdot y \in E, (\lambda x - y, \lambda x - y) > 0$

$$(\lambda x - y, \lambda x - y) > 0$$

$$(\lambda x, \lambda x) + (-y, \lambda x) + (\lambda x, -y) + (-y, -y) \geq 0$$

$$\lambda^2(x, x) - \lambda(y, x) - \lambda(x, y) + (y, y) > 0$$

$$\lambda^2(x, x) - 2\lambda(x, y) + (y, y) \geq 0$$

λ - нисбатан квадратик учхад $(x,x) \geq 0$ бўлгани учун

$$b^2 - ac \leq 0 \quad a = (x, x) \quad b = -(x, y), \quad c = (y, y)$$

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$$

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \sum_{k=1}^n y_k^2$$

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)} \quad (3)$$

Таъриф $\sqrt{(x, x)}$ скаляр кўпайтмадан чиққан x ни $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$,

$\|x\|$ — x элементнинг нормаси.

1. $\|x\| \geq 0$

2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda^2 (x, x)} = |\lambda| \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \|x\|$

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$$\begin{aligned} |x + y|^2 &= (x + y, x + y) = (x + y, x) + (x + y, y) = \\ &= (x, x) + (y, x) + (y, x) + (y, y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) = \end{aligned}$$

$$\|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \quad x - \text{элемент (вектори)}$$

Таъриф. Норма аниқланган E фазони нормаллашган фазо дейилади.

$(E, \|\cdot\|)$ - нормалашган.

Таъриф. $(x, y) = 0$ бўлса, ортогонал дейилади, яъни $x \perp y$

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)} \Rightarrow \frac{|(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1.$$

Таъриф. $\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}$.

Теорема: Агар $(x, y) = 0$ бўлса, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ бўлади ва аксинча $\frac{\pi}{2}$ бўлса $(x, y) = 0$.

Таъриф. Ушбу e_1, e_2, \dots, e_n векторлар системаси берилган . Агар $(e_i, e_j) = 0 \quad i \neq j$ бўлса берилган системани ортогонал векторлар системаси дейилади.

Таъриф. e_1, e_2, \dots, e_n векторлар системаси ортогонал системани ташкил этади, агар узунликлари 1 га тенг бўлса, ортогонал бўлса

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Теорема: e_1, \dots, e_n ўрта нормал система чизикли боғланмаган $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$

$$(e_k, \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = (e_k, 0) = 0$$

$$\lambda_1 (e_k, e_1) + \lambda_2 (e_k, e_2) + \dots + \lambda_n (e_k, e_n) = 0$$

$$\lambda_k (e_k, e_k) = 0 \quad \lambda_k = 0 \quad k = \overline{1, n}$$

Теорема: E^n фазода e_1, \dots, e_n ўрта нормал базисни ташкил этса $\Rightarrow (x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$ бўлади ҳақиқатдан ҳам

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \quad y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$$

$$\begin{aligned} (x, y) &= \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j y_j (e_i, e_j) = \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n \end{aligned}$$

Агар E да ўрта нормал базис бўлса, e_1, \dots, e_n $(x, e_k) = x_k$.

Теорема. Агар E^n да $f_1, \dots, f_n \forall$ базис бўлса

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j (f_i, f_j) = \langle (f_i, f_j) = a_{ij} \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

бўлади.

Айтайлик E Евклид фазо бўлиб, f_1, \dots, f_n (1) ундаги \forall базис бўлсин. бизнинг мақсадимиз E да аниқланган (1) ни ортогонал базис сўнгра эса ортонормал базисга айлантириш мумкинлигини кўриб чиқамиз. Ушбу жараёни алгебра ва сонлар назариясида ортогоналлаш жараёни дейилади.

У куйидагича

$$n=1, \quad f_1 \neq 0 \quad e_1 = \frac{f_1}{\sqrt{(f_1, f_1)}}$$

$$n=2 \quad f_1, f_2; \quad e_1 = \frac{f_1}{\sqrt{(f_1, f_1)}}; \quad q_2 = f_2 - \lambda f_1 \quad (q_2, e_1 = 0)$$

$$e_2 = \frac{q_2}{\sqrt{(q_1 q_2)}} \quad (f_2 + \lambda f_1, e_1) = 0 \quad \lambda = \frac{(f_2 f_1)}{(f_1 e_1)} f$$

$$(f_2 e_1) + (f_1 e_1) = 0$$

Фаразқилайлик. b_1, \dots, b_n (1) $b_1, \dots, b_m, c_{m+1}, \dots, c_n$ (2)

$$(b_{m+1}, b_i) = 0 \quad (i = \overline{1, m})$$

$$(c_{m+1} + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m; b_i) = 0 \quad (i = \overline{1, m})$$

$$(c_{m+1}, b_i) + \lambda_i (b_i, b_i) + \dots + \lambda_i (b_i, b_i) + \dots + \lambda_m (b_m, b_i) = 0$$

$$(c_{m+1}, b_i) + \lambda_i (b_i, b_i) = 0 \quad b_i \neq 0 \quad (b_i, b_i) \neq 0$$

$$\lambda_i = -\frac{(c_{m+1} b_i)}{(b_i, b_i)} \quad (5)$$

(5) бажарилса, \Rightarrow (4) тенгликўринлибўладиванатижада $b_1, b_2, \dots, b_m, b_{m+1}$
 $m+1 = n$ бўлса ортогоналлашжараёни тугайди.

Агарда $m+1 < n$ бўлса, мулохазани такрорлаймиз.

$$b_{m+2} = c_{m-2} + \lambda'_1 b_1 + \dots + \lambda'_{m+1} b_{m+1} \quad (6)$$

каби ажратиб, $(b_{m+2}, b_j) = 0$ (8) $j = \overline{1, m}$.

$$\lambda'_j = -\frac{(c_{m+2}, b_j)}{(b_j, b_j)} \quad (7)$$

Шундай қилиб, $b_1, \dots, b_m, \dots, b_{m+1}, b_{m+2}$ (7) ортогонал теоремани қурамыз. $m+2 = n$.

Шундай қилиб E_n фараз ортогонал жараён кетма-кет қўллаб b_1, \dots, b_n (8) ортогонал базисга эга бўламиз.

$$e_1 = \frac{b_1}{|b_1|} \dots e_n = \frac{b_n}{|b_n|} \quad (9)$$

$$(e_i, e_j) = \left(\frac{b_i}{|b_i|}, \frac{b_j}{|b_j|} \right) = \frac{(b_i, b_j)}{|b_j| \cdot |b_i|} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \quad (b_i, b_j) = (b_j)^2$$

1-теорема. E_n ўлчовли фазо бўлиб, (8) ортогонал чизиқли боғланмаган векторлар системаси чизиқли эрки

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0 \quad \lambda_i = 0 \quad i = \overline{1, n}$$

$$e_k (1 \leq k < n) \quad (e_k; \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = (e_k, \theta) = 0$$

$$\lambda_1(e_1, e_k) + \lambda_2(e_2, e_k) + \dots + \lambda_k(e_k, e_k) + \dots + \lambda_n(e_k, e_n) = 0$$

$$\lambda_e(e_k, e_k) = 0 \quad (e_k, e_k) = 1 \quad \lambda_k = 0 \quad k = \overline{1, n}$$

2-теорема: E ўлчовли Евклид фазоси (e_1, \dots, e_n) ортогонал базис бўлсин. $\Rightarrow x_k = (x, e_k)$

$$(x, e_k) = (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, e_k) = x_1(e, e_k) + \dots + x_k(e_k, e_k) + \dots +$$

$$+ x_n(e_n, e_k) = x_k(e_k, e_k) = x_k \cdot 1 = x_k$$

Таъриф. E фазо $R_1 \subset E$, $R_2 \subset E$ бўлсин $R_2 = \{y : \forall x \in R_1; (y, x) = 0\}$

Теорема: R_2, E аниқланган скаляр кўпайтмага нисбатан қисм фазо бўлади.

$$\forall y_1, y_2 \in R_2 \quad y_1 - y_2 \in R_2$$

$$\forall x \in R_1 \quad (y, x) = 0 \quad (y_2, x) = 0$$

$$(y_1 - y_2; x) = (y_1, x) - (y_2; x) = 0 - 0 = 0$$

$$y_1 - y_2 \in R_2$$

$$2) \forall \lambda \in R, \forall y \in R_2 \quad (\lambda y, x) = \lambda (y, x) = \lambda \cdot 0 = 0 \quad \lambda y \in R_2$$

Таъриф. R_2, E нинг қисм фазосини R_1 қисм фазога ортогонал қисм фазо дейилади.

$$E = R_1 (+) R_2 \quad \dim E = n \quad \dim R_1 = k \quad \dim R_2 = n - k$$

$$e_1 \dots e_n \quad (1) \Rightarrow \text{бундаги базисни } (q_1, \dots, q_{n-k}) \quad (2) \text{ билан белгилайлик.}$$

Ортогоналлаш жараёнига кўра (2) билан (1) ни ортогонал базисга келтириш мумкин.

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n -$$

$$x' (\in) R_1$$

$$x' = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k = R_1$$

$$x'' = (kx + 1) \cdot x_{k+1} e_{k+1} + \dots + x_n e_n = R_2$$

Масалан:

$$1 \quad x \quad x^2 \quad (1)$$

$$\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot x + \lambda_3 \cdot x^2 = 0 = 0 + 0x + 0x^2$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0 \quad q_1 = 1 \quad q_2 = q_1 + \lambda_1 x \quad (q_2, q_1) = 0$$

$$q_2 = 1 + (-2)x = 1 - 2x \quad q_3 = x^2 + \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2$$

$$(1 + \lambda_1 x, 1) = \int_0^1 (1 + \lambda_1 x) dx \neq 0$$

$$\left(x + \lambda, \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = 0 \quad 1 + \frac{1}{2} \lambda = 0 \quad \lambda = -2$$

$$q_2 = 1 + (-2)x = 1 - 2x$$

$$q_3 = x^2 + \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 \quad (q_3, q_1) = (x^2 + \lambda_1 + \lambda_2(1 - 2x), 1) = 0$$

$$(x^2 + \lambda_1 + \lambda_2(1-2x) \cdot 1 - 2x) = 0$$

$$(x^2, 1) + (\lambda_1, 1) + \lambda_2(1-2x, 1) = 0$$

$$\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 dx + \lambda_2 \int_0^1 (1-2x) dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \lambda_1 x \Big|_0^1 - \frac{\lambda_2}{2} \frac{(1-2x)^2}{2} \Big|_0^1$$

Бундан $\lambda_1 = -\frac{1}{3}$ топамиз:

$$(x^2, 1-2x) + \left(-\frac{1}{3}; 1-2x\right) + \lambda_2(1-2x, 2x) = 0$$

$$\int x^2(1-2x) dx - \frac{1}{3} \int (1-2x) dx + \lambda_2 \int_0^1 (1-2x) dx = 0$$

$$\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 - 2 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 - \frac{1}{3} x \Big|_0^1 + \frac{2}{3} \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{\lambda_2}{2} \frac{(1-2x)^2}{3} \Big|_0^1 = 0$$

$$-\frac{1}{6} + \frac{\lambda_2}{3} = 0 \quad \lambda_2 = \frac{1}{2} \quad q_3 = x^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2}(1-2x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$$

$1; 1-2x; x^2 - x + \frac{1}{6}$ ортогонал векторлар системаси

$$e_1 = 1 \quad e_2 = \frac{1-2x}{\sqrt{(1-2x)(1-2x)}}, \quad e_3 = \frac{x^2 - x + \frac{1}{6}}{\sqrt{\left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)\left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)}}$$

$$(1-2x, 1-2x) = \int_0^1 (1-2x)^2 dx = -\frac{1}{2} \frac{(1-2x)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$e_2 = \frac{1-2x}{\sqrt{\frac{1}{3}}} = \sqrt{3}(1-2x)$$

$$\left(x^2 - x + \frac{1}{6}, x^2 - x + \frac{1}{6}\right) = \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx =$$

$$= \left(\frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{3} + \frac{1}{36}x - 2\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{6}\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{180}$$

$$e_3 = \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) \quad e_1, e_2, e_3 - \text{ортогонал базис.}$$

Ўқиқ тестлар

Савол	Жавоб
e_1, e_2, \dots, e_n векторлар системаси берилган . Агар $(e_i, e_j) = 0 \quad i \neq j$ бўлса берилган системани қандай система деб аталади?	Ортогонал векторлар системаси дейилади.
Агар Евклид фазосида чексиз кўп чизиқли эркин векторлар топиш мумкин бўлса, у ҳолда бу фазо қандай фазо дейилади?	Чексиз ўлчамли фазо дейилади
Е-ҳақиқий сонлар устида вектор фазо евклид фазоси бўлиши учун унда қандайдир қонун ёки қоида бўйича ихтиёрий 2 векторнинг скаляр кўпайтириш деб аталувчи (x, y) сон аниқланган бўлиб, нечта хосса ўринли бўлиши керак?	4
Евклид фазосида қайси тенгсизлик ўринли?	Коши-Буняковский

Назорат саволлари:

1. Қандай жараён ортогоналлаш жараёни дейилади?
2. Ортогонал базис деганда нимани тушунаси?
3. Евклид фазосининг қисм фазоси ҳақида нима биласиз ?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нарманов А.Я. Дифференциал геометрия. Т. Университет, 2003
2. Coxeter H.S. Introduction to Geometry. Sydney-Toronto, 2001
3. Нарманов А.Я., Шарипов А.С., Аслонов Ж. Дифференциал геометрия ва топология фанидан дан машқ ва масалар тўплами. Т. Университет, 2014
4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М., изд. МГУ, 2004

РЕЖА:

1. Сферик фазо.
2. Риман геометрияси.

Таянч иборалар: Псевдоевклид фазо, Псевдоевклид фазода масофа

Маълумки, Евклид фазосида координаталар бошидан ихтиёрий M нуқтагача бўлган масофа

$$OM^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad (1)$$

формула билан аниқланар эди. Энди шу формулани ўзгартириб, масофани $OM^2 = x^2 + y^2 - z^2$ бўйича топишни кўриб чиқайлик.

OM масофа $x^2 + y^2 > z^2$ бўлганда ҳақиқий мусбат сон, $x^2 + y^2 < z^2$ бўлганда эса мавхум сонни аниқлайди. $x^2 + y^2 = z^2$ бўлганда эса масофа 0 га тенг бўлади (M нуқта O билан устма-уст тушмаса хам).

Бу формулани координаталар кўринишда қуйидагича ёзиш мумкин:

$$M_1M_2^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$



OM_1 ва OM_2 кесмалар орасидаги бурчакни эса

$$\cos\varphi = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 - z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 - z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 - z_2^2}}$$

Узунлик ва бурчаклар шу формулалар асосида аниқланган фазолар **псевдоевклид фазолар** деб аталади. Бу фазода Евклид фазосининг кўпгина аксиома ва хоссалари сақланиши билан бир қаторда айрим муносабатлар кескин фарқ қилади.

Псевдоевклид фазода масофани юқоридагича аниқланишидан кўринадики, унда уч хил тўғри чизиклар бўлиши мумкин: барча кесмалари мусбат ҳақиқий узунликка эга тўғри чизиклар; мавхум узунликдаги кесмаларга эга бўлган тўғри чизиклар ва барча кесмалари 0 узунликка эга бўлган тўғри чизиклар. Бу тўғри чизикларни фазовий ўхшаш, вақтли ўхшаш ва изотроп тўғри чизиклар деб юритилади.


Псевдоевклид фазодаги бу типдаги тўғри чизикларни чизмадаги кўриниши қуйидагича бўлади:



Юқоридаги формуладан $OM=0$ шартни қаноатлантирадиган барча M нуқталар $x^2+y^2-z^2=0$ тенглама билан аниқланадиган текисликда ётади.

Бу эса учи O нуқтада жойлашган конус сиртни ифодалайди.

Кўриниб турибдики, ҳақиқий узунликдаги тўғри чизиклар конусдан ташқарида, мавхумлари ичида ва O га тенглари эса конус сиртда ётади.



Назорат топшириқлари

1. Конус сирт тенграмаси қандай кўринишга эга?
2. Псевдоевклид фазода масофа қандай аниқланади?

3. Қандай фазолар псевдоевклид фазолар деб аталади?
4. Псевдоевклид фазода Евклид фазосининг аксиома ва хоссалари сақланадими?

Ёпиқ тестлар

Савол	Жавоб
$x^2+y^2 > z^2$ бўлганда ОМ масофа қандай аниқланади?	ҳақиқий мусбат сонни аниқлайди.
$x^2+y^2 = z^2$ бўлганда ОМ масофа қандай аниқланади ?	масофа 0га тенг бўлади (М нукта 0 билан устма-уст тушмаса ҳам).
$x^2+y^2 < z^2$ бўлганда ОМ масофа қандай аниқланади?	мавхум сонни аниқлайди

Адабиётлар

- 1.Georgii H.O. Gibbs measures and phase transitions. Berlin:de Gruyter, 657 p., 2011.
- 2.H.Q. Mitchell “Traveller” B1, B2, MM Publiciations. 2015. 183.
- 3.H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni “PIONEER”, B1, B2, MM Publiciations. 2015. 191.
4. M. Rikhsiboev and N. S. Mohamed, Engineering Mathematics 2, Malaysia, 2019.
- 5.Jim Libby, Math for Real Life: Teaching Practical Uses for Algebra, Geometry and Trigonometry// 2019, 234p. ISBN: 978-1476667492
- 6.Karl Berry, The TEX Live Guide—2020
- 7.Lindsay Clandfield and Kate Pickering “Global”, B2, Macmillan. 2013. 175.
- 8.Авилова Л.В., Болотюк В.А., Болотюк Л.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра// 2013. Издание: 1-е изд. 421 с.
- 9.Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия, М.: Наука, 1990. – 672
- 10.Нарманов А.Я. Аналитикгеометрия. Т., “Ўзбекистонфайласуфларимиллий жамияти”, 2008 й.

РЕЖА:

1. Ярим Евклид фазолар.
2. Ярим гиперболик фазолар.

Таянч иборалар: эллиптик фазо, гиперболик фазо

n ўлчовли эллиптик фазо деб, R_{n+1} фазонинг сферасидаги диаметриал карама-қарши бўлган нуқталар тўпламига айтилади (изометрик жуфт).

Бу фазони S_n билан белгиланади.

S_n фазони ноевклид Риман фазо деб ҳам аталади.

R_{n+1} фазо сфераларига уринмалар R_n фазони ташкил этганлигидан, чексиз кичик орикларда S_n геометрияси R_n фазо геометриясига яқин бўлади.

S_n фазонинг m ўлчовли текислиги S_m фазони ташкил этади.

Эллиптик фазода масофа масаласи қандай ўрнатилган?

Агар S_n фазонинг X нуқтасини ифодаловчи векторлардан бири \bar{x} , иккинчиси ҳам \bar{x} бўлса, у ғолда бу векторлар $\bar{x}^2 = \bar{p}$ муносабат билан боъланган бўлади.

\bar{x} билан аниқланган S_n фазонинг X нуқтасини $X(\bar{x})$ билан боъланади.

Бунда, $S-S_{\text{Нотоп}}$ фазодаги $X(\bar{x})$ ва $Y()$ нуқталар орасидаги масофа, p эса эгрилик радиусидир.

S_n фазо координаталари сифатида R_{n+1} фазонинг \bar{x} векторининг x^2 координаталарини қараш мумкин.

Энди гиперболик фазонинг вектор аксиомаси асосида қурилишини кўриб чиқайлик

Гиперболик фазони таърифлаш учун E_n афин фазонинг I+IV группа аксиомаларидан ташқари қуйидаги V группа аксиомалари бажарилиши керак:

V.1⁰. Ҳар иккита \bar{a} ва \bar{b} векторларнинг скаляр кўпайтмаси деб аталувчи $K = \bar{a} E \bar{b}$ сон мос қуйилган бўлсин.

V.2⁰. Скаляр кўпайтма коммутатив, яъни $\bar{a} E \bar{b} = \bar{b} E \bar{a}$

V.3⁰. Скаляр кўпайтма векторларни қўшишга нисбатан дистрибутив яъни $\bar{a} E (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} E \bar{b} + \bar{a} E \bar{c}$

V.4⁰. Ҳақиқий кўпайтувчини скаляр кўпайтма ташқарисига чиқариш мумкин: $(k \bar{a}) E \bar{b} = k \bar{a} E \bar{b}$

V.5⁰. Шундай \bar{a}_i кўринишдаги i та векторлар мавжудки, улар учун

$$\bar{a}_a E \bar{a}_a > 0 \quad (a \leq 1)$$

$$\bar{a}_n E \bar{a}_n < 0 \quad (n > 1), \quad \bar{a}_i E \bar{a}_j, \quad i \neq j$$

Бундай шартлар асосида қурилган I индекслипсевдоевклид фазони R_n кўринишда белгилаймиз.

1. Бизга маълумки $F(x, y) = 0$ тенглама текисликда бирор тўғри чизиқни аниқлайди, яъни ОХУ текисликдаги координаталари x ва y бўлган барча нуқталар тўплами бу тенгламани қаноатлантиради. Шунингдек, фазода ҳам $F(x, y, z) = 0$ (1)

Тенглама ОХУЗ да бирор сиртни, яъни координаталари x, y, z бўлган ва (1) тенгламани қаноатлантирадиган нуқталар тўпланини аниқлайди. (1) тенглама сиртнинг тенгламаси, x, y, z лар эса унинг ўзгарувчи координаталари дейилади.

Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенгламаси қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$a_1x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{2x}y+2a_{13}xz+2a_{23}yz+2a_{14}x+2a_{24}y+2a_{34}z+a_{44}=0$$

бу тенгламадаги $a_1, a_{22}, a_{33}, a_2, a_{13}, a_{23}$ коэффициентларнинг камида биттаси нолдан фаркли бўлиши керак. Айрим ҳолларда сирт тенгламаси билан эмас, балки у ёки бу хоссага эга бўлган нукталарнинг геометрик ўрни билан берилиши мумкин. бу ҳолда сиртнинг геометрик хоссаларидан фойдаланиб унинг тенгламаси тузилади.

13⁰. Сферанинг OXYZ тўғри бурчакли Декарт координаталар системасидаги тенгламасини тузамиз.

Маркази $O'(a,b,c)$ нуктада ва радиуси R бўлган сфера берилган бўлсин. Агар $\mu(x,y,z)$ нукта сферанинг ихтиёрий нуктаси бўлса, у ҳолда $O'(a,b,c)$ ва $\mu(x,y,z)$ нукталар орасидаги масофани топиш формуласидан фойдалансак, сфера тенгламаси қуйидагича бўлади:

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2 \quad (1)$$

(13)–маркази $O'(a,b,c)$ бўлган нуктада ётувчи ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенгламаси дейилади. Агар (13) да $a=b=c=0$ бўлса, маркази координаталар бошида ётувчи ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенгламасига эга бўламиз:

$$x^2+y^2+z^2=R^2 \quad (2)$$

(13) ни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+a^2+b^2+c^2-R^2=0 \quad (3)$$

Сфератенгламасииккинчитартиблисиртбўлишиникўрсатайлик. Бунинг учун сиртнинг (2) тенгламасида $a_2=a_{13}=a_{23}=0$ ва $a_1=a_{22}=a_{33}$ деб олинса, (2) тенглама сферанинг тенгламаси эканини текшираимиз. Бунинг учун $a_1 \neq 0$ деб (4) нинг ҳамма ҳадларини a_1 га бўламиз ва қуйидаги белгилашларни киритаимиз:

$$A = \frac{2a_{14}}{a_{11}}, B = \frac{2a_{24}}{a_{11}}, C = \frac{2a_{34}}{a_{11}}, D = \frac{a_{44}}{aa_{11}}$$

Натижада

$$x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$$

кўринишдаги тенгламага эга бўламиз. Охириги тенгламани ушбу кўринишда ёзиб оламиз

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(A^2 + B^2 + C^2 - 4D)$$

$$\text{Ёки} \left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}\right)^2 \quad (5)$$

(5) тенгламадан кўринадикки, $A^2+B^2+C^2-4D>0$ бўлганда (4) тенглама маонога эга бўлади. Демак, $A^2+B^2+C^2-4D>0$ бўлса, (5) тенглама маркази

$$\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$$

нуктада ва радиуси


$$R = \frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}$$

бўлган сферани ифодалайди. Агар $A^2+B^2+C^2-4D=0$ бўлса, (5) тенглама

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = 0$$

кўринишда бўлиб, у фақат битта $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$ нуктани ифодалайди.


2⁰. Бирор П текисликда ётувчи L чизикнинг ҳар бир нуктасидан ўтувчи ва берилган l тўғри чизикка параллел бўлган барча тўғри чизиклардан ташкил топган сирт **цилиндрик сирт** дейилади. бунда L чизик цилиндрик сиртнинг йўналтирувчиси, l тўғри чизикка параллел ва L чизикни кесувчи чизиклар унинг ясовчиси дейилади (1–чизма).



Йўналтирувчилари координата текисликларидан бирида ётувчи ясовчилари эса шу текисликка перпендикуляр бўлиб, координаталар ўқига параллел бўлган цилиндрик сиртларни кўрайлик.

$$OX \text{ текисликда тенгламаси } F(x,y)=0 \quad (6)$$

бўлган L чизик ва ясовчилари OZ ўққа параллел бўлган цилиндрик сиртни ясаймиз (2–чизма). (6) тенглама OXYZ координаталар системасида цилиндрик сирт эканини кўрсатайлик.



$M(x,y,z)$ –цилиндрик сиртнинг ихтиёрий тайинланган нуктаси бўлсин. M нукта орқали ўтувчи ясовчининг L йўналтирувчиси билан кесишган нуктасини N билан белгилаймиз. N нукта M нуктанинг OXY текислигидаги

проекциясидир. Шунинг учун M ва N нукталар битта x абцисса ва битта y ординатага эга. N нукта L чизикда ётгани учун у эгри чизикнинг (6) тенгламасини қаноатлантиради.

Демак, бу тенгламани $M(x,y,z)$ нуктанинг координаталари ҳам қаноатлантиради. OXYZ фазода L йўналтирувчи куйидаги иккита тенглама системаси билан аниқланади:

$$\begin{cases} F(x,y) = 0 \\ Z = 0 \end{cases}$$

Худди шунга ўхшаш

$$\begin{cases} F(x,z) = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{ва} \quad \begin{cases} F(y,z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

тенгламалар цилиндрик сиртларнинг L йўналтирувчи чизикларини мос равишда OXZ ва OYZ текисликдаги ҳолатини аниқлашни кўрсатиши мумкин.

Хусусий ҳолларда цилиндрик сиртларнинг йўналтирувчилари эллипс, гиперболо, парабола, иккита кесишувчи тўғри чизик, иккита ўзаро параллел (устма-уст тушмаган) тўғри чизиклардан иборат бўлиши мумкин.

Бундай сиртларни мос равишда эллиптик цилиндр, параболик цилиндр, гиперболик цилиндр, иккита кесишувчи текислик, иккита параллел текислик деб юритилади ва уларнинг тенгламалари қуйидаги кўринишда бўлади:


Эллиптик цилиндр:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3\text{-чизма})$$

Гиперболик цилиндр:
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4\text{-чизма})$$

Параболик цилиндр:
$$y^2 = -2px \quad (5\text{-чизма})$$

Икки кесишувчи текислик:
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \quad (6\text{-чизма})$$

Икки параллел текислик:
$$x^2 - a^2 = 0 \quad (a \neq 0) \quad (7\text{-чизма})$$



1⁰. Бирор Q текисликда L иккинчи тартибли чизик ва бў текисликка тегишли бўлмаган M₀ нукта берилган бўлсин.

Таъриф. Фазодаги M₀ нуктадан ўтиб, L ни кесиб ўтувчи барча тўғри чизиклар тўплами иккинчи тартибли конус сирт (ёки конус) дейилади. M₀ нукта конус учи, L чизик конус йўналтирувчиси, конусни ҳосил қилувчи чизиклар эса унинг ясовчилари дейилади.

Конус ясовчилари бўлган тўғри чизиклар маркази конус ичида бўлган тўғри чизиклар боғламига тегишли бўлади. конус тенгламасини келтириб чиқарайлик. Q текислик ва ундаги L чизик OXY текисликда ётган бўлсин. M₀(x₀, y₀, z₀) нукта эса OXY текисликдаги ётмаган ихтиёрий нукта бўлсин. конуснинг ихтиёрий M(x, y, z) нуктасини олайлик, у ҳолда M₀M тўғри чизик конуснинг ясовчиси бўлиб, L чизик билан M(x₁, y₁, z₁) нуктада кесишади.

M₀, M₁, M нукталар бир тўғри чизикда ётгани учун $\overrightarrow{M_0M_1} = \lambda \overrightarrow{M_0M}$ тенглик ўринли.

Бу тенгликдан

$$x_1 - x_0 = \lambda(x - x_0) \Rightarrow x_1 = x_0 + \lambda(x - x_0)$$

$$y_1 - y_0 = \lambda(y - y_0) \Rightarrow y_1 = y_0 + \lambda(y - y_0)$$

$$z_1 - z_0 = \lambda(z - z_0) \Rightarrow z_1 = z_0 + \lambda(z - z_0)$$

Охириги тенгликдан λ ни топиб, олдинги икки тенгликка қўямиз:

$$x_1 = x_0 + \frac{x - x_0}{z_0 - z} z_0, \quad y_1 = y_0 + \frac{y - y_0}{z_0 - z} z_0 \quad (7)$$

$$M_1 \in L \Rightarrow F(x_1, y_1) = 0$$

ёки

$$F\left(\frac{x - x_0}{z_0 - z} z_0, y_0 + \frac{y - y_0}{z_0 - z} z_0\right) = 0 \quad (8)$$

(8) ифода конус тенгламаси дейилади. Иккинчи тенглама конуснинг Декарт координаталар системасидаги энг содда тенгламаси

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (9)$$

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

кўринишда бўлади.

2^o. Q текисликда бирор L чизик ва l тўғри чизик берилган бўлсин.


Таъриф. L чизикнинг l тўғри чизик атрофида айланишдан ҳосил бўлган Ф фигура айланма сирт дейилади.

бунда L айланма сиртнинг меридиани, l айланиш ўқи дейилади.

Айланма сиртнинг тенгламасини келтириб чиқарайлик.

Декарт координаталар системасини шундай танлаймизки, бунда Q—(OYZ) текислик, l—(OZ) ўқ ҳамда

L:F(x,z)=0 бўлсин.



L чизикнинг (OZ) ўқ атрофида айланишидан қандайдир Ф сирт ҳосил бўлсин (9-чизма). M(x,y,z) шу сиртга тегишли ихтиёрий нукта бўлсин. M нуктадан OZ ўққа перпендикуляр ўтказсак, кесимда маркази 0∈(OZ) нуктада бўлган бирор айлана ҳосил қилинадики, у айлана L чизик билан M₁(0,y₁,z₁) нуктада кесишсин. Кесим айланадан иборат бўлгани учун:

$$\rho(0,M)=\rho(0,M_1) \quad (10)$$

Бу масофалар икки нукта орасидаги масофани топиш формуласига кўра қуйидагича бўлади:

$$\rho(0,M)=\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-z)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\rho(0,M_1)=\sqrt{(0-0)^2 + (y_1-0)^2 + (z-z)^2} = \sqrt{y_1^2} = |y_1|.$$

Бу қийматларни (10) тенгликка қўямиз:

$$|y_1| = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow y_1 = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$$

$M \in L$ бўлгани учун:

$$F(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0 \quad (11)$$

(11) тенглама L чизикни OZ ўқ атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган сиртнинг тенгламасидир.

Агар L чизик мос равишда OX ва OY ўқлар атрофида айлантурсак, ҳосил бўлган сиртларнинг тенгламалари мос равишда

$$F(x, \pm \sqrt{y^2 + z^2}) = 0 \text{ ва } F(y, \pm \sqrt{x^2 + z^2}) = 0 \quad (12)$$

кўринишларда бўлади.

Ўпик тестлар

Савол	Жавоб
Эллиптик цилиндр тенгламаси	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Гиперболик цилиндр тенгламаси	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Параболик цилиндр тенгламаси	$y^2 = -2px$
Эллипсоид тенгламаси	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Назорат саволлари

1. Қандай сирт цилиндрик сиртдейлади ?
2. Эллиптик цилиндр тенгламасини ёзинг
3. Гиперболик цилиндр тенгламасини ёзинг
4. Параболик цилиндр тенгламасини ёзинг
5. Икки кесишувчи текислик тенгламасини ёзинг
6. Икки параллел текислик тенгламасини ёзинг

Адабиётлар

1. Georgii H.O. Gibbs measures and phase transitions. Berlin: de Gruyter, 657 p., 2011.
2. H.Q. Mitchell “Traveller” B1, B2, MM Publications. 2015. 183.
3. H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni “PIONEER”, B1, B2, MM Publications. 2015. 191.
4. M. Rikhsiboev and N. S. Mohamed, Engineering Mathematics 2, Malaysia, 2019.
5. Jim Libby, Math for Real Life: Teaching Practical Uses for Algebra, Geometry and Trigonometry// 2019, 234p. ISBN: 978-1476667492
6. Karl Berry, The TEX Live Guide—2020
7. Lindsay Clandfield and Kate Pickering “Global”, B2, Macmillan. 2013. 175.

1-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУ: ЧИЗИҚЛИ ФАЗО

1-таъриф. Агар қуйидаги шартлар бажарилса, x, y, z, \dots элементларнинг V тўплами чизиқли (афин) фазо дейилади:

а) ҳар икки x ва y элементларга x ва y элементлар йиғиндиси деб аталадиган z элемент мос қилиб қўйилган; x ва y элементларнинг йиғиндиси $x+y$ билан белгиланади;

б) бирор майдоннинг ҳар бир x элементи ва ҳар бир λ сон билан x элемент кўпайтмаси деб аталган λx элемент мос қилиб қўйилган.

Бу амаллар қуйидаги талабларни (аксиомаларни) қаноатлантириши керак.

$$1^0. x+y=y+x \quad (\text{коммутативлик}),$$

$$2^0. (x+y)+z=x+(y+z) \text{ (ассоциативлик),}$$

3⁰. Ҳар қандай x учун шундай 0 элемент мавжудки, $x+0=x$ бўлади. 0 элемент ноль элемент дейилади.

4⁰. Ҳар қандай x учун $-x$ билан белгиланадиган шундай элемент мавжудки, $x+(-x)=0$ бўлади.

$$1^0. 1x=x,$$

$$2^0. \alpha(\beta x) = \alpha\beta(x).$$

$$3^0. (\alpha+\beta)x = \alpha x + \beta x,$$

$$4^0. \alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y.$$

Биз қўшиш ҳамда сонга кўпайтириш амалларини қандай таърифланиши ҳақида гапирмаганимиз бежиз эмас. Биз бу амалларни фақат юқорида таърифланган аксиомаларга буйсунишларини талаб қиламиз ҳолос. Шунинг учунҳар қачон юқорида қайд қилинган шартларни қаноатлантирувчи амаллар билан иш кўрар эканмиз, биз уларни қўшиш ва сонга кўпайтириш амаллари деб, элементлари устида бу амаллар бажарилган тўпламни эса чизиқли фазо деб хисоблашга ҳақлимиз. Юқорида келтирилган 1-3 мисоллар бу аксиомаларгабўйсунди.

Яна бир мисол кўриб чиқайлик;

1. Даражаси натурал n сондан ошмайдиган ва одатдагича қўшиш ва бирор сонга кўпайтириш амаллари бажариладиган ҳамма кўпхадлар тўплами чизиқли фазо ҳосил қилади.

Ёлғиз n -даражали кўпхадлар тўплами чизиқли фазо ташкил қилмайди, чунки n -даражали икки кўпхад йиғиндиси n дан пастроқ бўлиб чиқиши ҳам мумкин; масалан,

$$(t^n + t) + (-t^n + t) = 2t .$$

Чизиқли фазо элементларини биз *векторлар* деб атаймиз. Бу сўзнинг кўпинча тор маънода (1-мисолдаги каби) ишлатиши бизни чалғитмаслиги керак. Бу чизиқ билан боғлиқ бўлган геометрик тасаввурлар бир қанча натижаларни ойдинлаштиришга, баъзи ҳолларда эса бу натижаларни олдиндан кўра билишга ёрдам беради.

Агар чизиқли фазо таърифида қатнашаётган λ, μ, \dots сонлар хақиқий бўлса, у ҳолда фазо *хақиқий чизиқли фазо* дейилади. Биз λ, μ, \dots ларни ихтиёрий F майдон элементлари деб умумийроқ фараз этишимиз мумкин. Бу ҳолда V фазо F майдондаги *чизиқли фазо* дейилади. Қуйида баён этиладиган тушунча ва теоремаларнинг кўпчилиги ихтиёрий майдондаги чизиқли фазалар учун ҳам бевосита тўғри бўлади.

2. Афин координаталар системаси.

Бундан кейин векторларнинг чизиқли боғлиқлиги ва чизиқли эркилиги деган тушунчалар муҳим аҳамиятга эга бўлади.

2-таъриф. V –чизикли фазо бўлсин. Агар камида биттаси нолдан

фарқ қиладиган $\alpha, \beta, \gamma, \dots, \theta$ сонлар мавжуд бўлиб, $\alpha x + \beta y + \gamma z + \dots + \theta v = 0$ (1) тенглик ўринли бўлса, бу ҳолда x, y, z, \dots, v векторлар чизикли боғлиқ векторлар дейилади. Чизикли боғлиқ бўлмаган векторлар чизикли эрки векторлар дейилади. Бошқача қилиб айтганда, $\alpha x + \beta y + \gamma z + \dots + \theta v = 0$ тенглик $\alpha = \beta = \gamma = \dots = \theta = 0$ бўлган ҳолдагина ўринли бўлса, x, y, z, \dots, v векторлар чизикли эрки векторлар дейилади.

x, y, z, \dots, v векторлар чизикли боғлиқ, яъни улар (1) муносабат билан боғланган бўлсин ва ундаги коэффициентлардан камида биттаси, масалан, α нолдан фарқли деб фараз қилайлик. Бу ҳолда

$$\alpha x = -\beta y - \gamma z - \dots - \theta v$$

бўлади. Буни энди α га бўлиб вадеб фараз қилиб, $-\frac{\beta}{\alpha} = \lambda, -\frac{\gamma}{\alpha} = \mu, \dots, -\frac{\theta}{\alpha} = \zeta$

тенгликни ҳосил қиламиз. $x = \lambda y + \mu z + \dots + \zeta v$

Агар x вектор y, z, \dots, v векторлар орқали (2) кўринишдаги тенглик билан ифода этилса, у ҳолда биз x вектор y, z, \dots, v векторларнинг чизикли комбинацияси деб атаймиз.

Шундай қилиб, агар x, y, z, \dots, v векторлар чизикли боғлиқ бўлса, у ҳолда улардан камида биттаси қолганларининг чизикли комбинациясидан иборат бўлади. Тескарисини, яъни биттаси қолганларининг чизикли комбинациясидан иборат бўлган векторлар чизикли боғлиқ векторлар бўлишининг ҳам тўғрилигини кўрсатиш мумкин.

Энди фазонинг ўлчамлар сони (ўлчамлиги) тушунчасини киритишга ўтамиз.

Тўғри чизикдаги векторлар тўпламида ҳар қандай иккита вектор пропорционал, яъни чизикли боғлиқдир. Текисликда иккита чизикли эрки векторни топиш мумкин, аммо ундаги ҳар қандай учта вектор чизикли боғлиқдир.

Агар V – уч ўлчамли фазодаги векторлар тўплами бўлса, у ҳолда V да учта чизикли эрки векторни топиш мумкин, аммо бундаги ҳар қандай тўртта вектор чизикли боғлиқ бўлади.

Биз кўрамизки, тўғри чизик, текислик ва уч ўлчамли фазодаги чизикли эрки векторларнинг максимал сони геометриядаги тўғри чизик, текислик ҳамда фазонинг ўлчами сонига тўғри келади. Шунинг учун қуйидаги умумий таърифни қабул қилишимизтабиий.

3-таъриф. Агар V чизикли фазода n та чизикли эрки вектор мавжуд бўлиб, бундан ортиқ чизикли эрки векторлар бўлмаса, V фазо n ўлчамли фазо дейилади $\dim V = n$ деб белгиланади.

Агар V фазода чексиз кўп чизикли эрки векторлар топиш мумкин бўлса, у ҳолда V фазо *чексиз ўлчамли* фазо дейилади.

Чексиз ўлчамли фазолар математиканинг махсус бўлимларида текширилади. Биз бу курсда фақат чекли ўлчамли фазолар билан шуғулланамиз.

Топшириқлар

1. Чизикли фазонинг ҳар бир элементи базис орқали ягона равишда ифодаланишини кўрсатинг.

2. Базис ўзгарганда вектор координаталари ўзгаришини кўрсатинг.

3. Даражаси натурал n сондан ошмайдиган ва одатдагича кўшиш ва бирор сонга кўпайтириш амаллари бажариладиган ҳамма кўпхадлар тўплами чизикли фазо ҳосил қилишини исботланг.

Ўпик тестлар

Савол	Жавоб
Уч ўлчамли фазода базис қандай ҳосил қилинади?	Бир текисликда ётмаган ҳар қандай учта вектор
Даражаси натурал n сондан ошмайдиган ва одатдагича кўшиш ва бирор сонга кўпайтириш амаллари бажариладиган ҳамма кўпхадлар тўплами нима ҳосил қилади?	чизикли фазо ҳосил қилади
n ўлчамли V фазонинг n та чизикли эркин векторлари тўплами нима ҳосил қилади?	V нинг базисини ҳосил қилади
Агар V фазода чексиз кўп чизикли эркин векторлар топиш мумкин бўлса, у ҳолда қандай фазо ҳосил қилинади?	Чексиз ўлчамли фазо ҳосил қилинади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нарманов А.Я. Аналитикгеометрия. Т., “Ўзбекистонфайласуфларимиллий жамияти”, 2008 й.

2. Izu Vaisman. Analytical geometry. World scientific. 2007.

3. Baxvalov S.V., Modenov P.S., Parxomenko A.S. Analitik geometriyadan masalalar to'plami. T, Universitet, 2006.

2-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУ: ЕВКЛИД ФАЗОСИ.

Е-хақиқий сонлар устида вектор фазо бўлиб, унда қандайдир қонун ёки қоида бўйича \forall 2 векторнинг скаляр кўпайтириш деб аталувчи (x,y) сон аниқланган бўлиб, бу 4 та

1. $\forall x, y \in E$ учун $(x,y)=(y,x)$

2. $\forall x,y,z \in E$ учун $(x+y,z)=(x,z)+(y,z)$

3. $\forall x \in E, \forall \lambda \in R, (\lambda x,y)=\lambda(x,y)$

4. $\forall x \neq 0 (x-x) > 0 (x,x) = 0 \Leftrightarrow x = \theta$

шартларни қаноатлантирса, у ҳолда бундай вектор фазони Евклид фазоси дейилади.

Масалан: $E = R^3; \quad x = (x_1, x_2, x_3), \quad y = (y_1, y_2, y_3)$

$$(x, y) = (x_1 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + x_3 \cdot y_3) \quad (1)$$

3) $(x,y)=(y,x)$

4) $(x + y, z) = (x_1 + y_1) \cdot z_1 + (x_2 + y_2) \cdot z_2 + (x_3 + y_3) \cdot z_3 =$
 $= (x_1 z_1 + x_2 z_2 + x_3 z_3) + (y_1 z_1 + y_2 z_2 + y_3 z_3) = (x, z) + (y, z)$

(1)

3) $(\lambda x, y) = \lambda x_1 y_1 + \lambda x_2 y_2 + \lambda x_3 y_3 = \lambda(x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3) = \lambda(x, y)$

4) $(x, x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0$

Теорема: Евклид фазосида қуйидаги Коши-Буняковский тенгсизлиги ўринли.

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y) \quad (2)$$

Исбот. $\forall \lambda \in R, \forall x \cdot y \in E, (\lambda x - y, \lambda x - y) > 0$

$$(\lambda x - y, \lambda x - y) > 0$$

$$(\lambda x, \lambda x) + (-y, \lambda x) + (\lambda x, -y) + (-y, -y) \geq 0$$

$$\lambda^2(x, x) - \lambda(y, x) - \lambda(x, y) + (y, y) > 0$$

$$\lambda^2(x, x) - 2\lambda(x, y) + (y, y) \geq 0$$

λ - нисбатан квадратик учхад $(x, x) \geq 0$ бўлгани учун

$$b^2 - ac \leq 0 \quad a = (x, x) \quad b = -(x, y), \quad c = (y, y)$$

$$(x, y)^2 \leq (x, x)(y, y)$$

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \sum_{k=1}^n y_k^2$$

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)} \quad (3)$$

Таъриф $\sqrt{(x, x)}$ скаляр кўпайтмадан чиққан x ни $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$,

$\|x\|$ — x элементнинг нормаси.

1. $\|x\| \geq 0$

$$2. \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda^2 (x, x)} = |\lambda| \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \|x\|$$

$$3. \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x + y, x) + (x + y, y) = \\ &= (x, x) + (y, x) + (y, x) + (y, y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y) = \\ \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| \cos \varphi + \|y\|^2 &= (\|x\| + \|y\|)^2 \\ \|x + y\|^2 &\leq (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \quad x - \text{элемент (вектори)}$$

Таъриф. Норма аниқланган E фазони нормаллашган фазо дейилади.

$(E, \|\cdot\|)$ - нормаллашган.

Таъриф. $(x, y) = 0$ бўлса, ортогонал дейилади, яъни $x \perp y$

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)} \Rightarrow \frac{|(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1.$$

$$\text{Таъриф. } \cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}.$$

Теорема: Агар $(x, y) = 0$ бўлса, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ бўлади ва аксинча $\frac{\pi}{2}$ бўлса $(x, y) = 0$.

Таъриф. Ушбу e_1, e_2, \dots, e_n векторлар системаси берилган . Агар $(e_i, e_j) = 0 \quad i \neq j$ бўлса берилган системани ортогонал векторлар системаси дейилади.

Таъриф. e_1, e_2, \dots, e_n векторлар системаси ортогонал системани ташкил этади, агар узунликлари 1 га тенг бўлса, ортогонал бўлса

$$(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Теорема: e_1, \dots, e_n ўрта нормал система чизиқли боғланмаган $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$

$$(e_k, \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = (e_k, 0) = 0$$

$$\lambda_1 (e_k, e_1) + \lambda_2 (e_k, e_2) + \dots + \lambda_n (e_k, e_n) = 0$$

$$\lambda_k (e_k, e_k) = 0 \quad \lambda_k = 0 \quad k = \overline{1, n}$$

Теорема: E^n фазода e_1, \dots, e_n ўрта нормал базисни ташкил этса $\Rightarrow (x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

бўлади ҳақиқатдан ҳам

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \quad y = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$$

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j y_j (e_i, e_j) =$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Агар E да ўрта нормал базис бўлса, e_1, \dots, e_n $(x, e_k) = x_k$.

Теорема. Агар E^n да $f_1, \dots, f_n \forall$ базис бўлса

$$(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j (f_i, f_j) = \langle (f_i, f_j) = a_{ij} \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

бўлади.

Айтайлик E Евклид фазо бўлиб, f_1, \dots, f_n (1) ундаги \forall базис бўлсин. бизнинг мақсадимиз E да аниқланган (1) ни ортогонал базис сўнгра эса ортонормал базисга айлантириш мумкинлигини кўриб чиқамиз. Ушбу жараёни алгебра ва сонлар назариясида ортогоналлаш жараёни дейилади.

У куйидагича

$$n=1, \quad f_1 \quad f_1 \neq 0 \quad e_1 = \frac{f_1}{\sqrt{(f_1, f_1)}}$$

$$n=2 \quad f_1 \quad f_2; \quad e_1 = \frac{f_1}{\sqrt{(f_1, f_1)}}; \quad q_2 = f_2 - \lambda f_1 \quad (q_2, e_1 = 0)$$

$$e_2 = \frac{q_2}{\sqrt{(q_2, q_2)}} \quad (f_2 + \lambda f_1, e_1) = 0 \quad \lambda = \frac{(f_2, f_1)}{(f_1, f_1)}$$

$$(f_2, e_1) + (f_1, e_1) = 0$$

Фаразқилайлик. b_1, \dots, b_n (1) $b_1, \dots, b_m, c_{m+1}, \dots, c_n$ (2)

$$(b_{m+1}, b_i) = 0 \quad (i = \overline{1, m})$$

$$(c_{m+1} + \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_m b_m; b_i) = 0 \quad (i = \overline{1, m})$$

$$(c_{m+1}, b_i) + \lambda_1 (b_1, b_i) + \dots + \lambda_i (b_i, b_i) + \dots + \lambda_m (b_m, b_i) = 0$$

$$(c_{m+1}, b_i) + \lambda_i (b_i, b_i) = 0 \quad b_i \neq 0 \quad (b_i, b_i) \neq 0$$

$$\lambda_i = -\frac{(c_{m+1}, b_i)}{(b_i, b_i)} \quad (5)$$

$$(5) \text{ бажарилса, } \Rightarrow (4) \text{ тенгликўринлибўладиванатижада } b_1, b_2, \dots, b_m, b_{m+1} \quad (6)$$

$m+1=n$ бўлса ортогоналлашжараёни тугайди.

Агарда $m+1 < n$ бўлса, мулоҳазани такрорлаймиз.

$$b_{m+2} = c_{m-2} + \lambda'_1 b_1 + \dots + \lambda'_{m+1} b_{m+1} \quad (6)$$

каби ажратиб, $(b_{m+2}, b_j) = 0$ (8) $j = \overline{1, m}$.

$$\lambda' = -\frac{(c_{m+2}, b_j)}{(b_j, b_j)} \quad (7)$$

Шундай қилиб, $b_1, \dots, b_m, \dots, b_{m+1}, b_{m+2}$ (7) ортогонал теоремани қурамиз. $m+2=n$.

Шундай қилиб E ғараз ортогонал жараён кетма-кет қўллаб b_1, \dots, b_n (8) ортогонал базисга эга бўламиз.

$$e_1 = \frac{b_1}{|b_1|} \dots e_n = \frac{b_n}{|b_n|} \quad (9)$$

$$(e_i, e_j) = \left(\frac{b_i}{|b_i|}, \frac{b_j}{|b_j|} \right) = \frac{(b_i, b_j)}{|b_i| \cdot |b_j|} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \quad (b_i, b_j) = (b_j)^2$$

1-теорема. E_n ўлчовли фазо бўлиб, (8) ортогонал чизикли боғланмаган векторлар системаси чизикли эрки

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0 \quad \lambda_i = 0 \quad i = \overline{1, n}$$

$$e_k (1 \leq k < n) \quad (e_k; \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n) = (e_k, \theta) = 0$$

$$\lambda_1 (e_1, e_k) + \lambda_2 (e_2, e_k) + \dots + \lambda_k (e_k, e_k) + \dots + \lambda_n (e_n, e_k) = 0$$

$$\lambda_e (e_k, e_k) = 0 \quad (e_k, e_k) = 1 \quad \lambda_k = 0 \quad k = \overline{1, n}$$

2-теорема: E ўлчовли Евклид фазоси (e_1, \dots, e_n) ортогонал базис бўлсин. $\Rightarrow x_k = (x_1 e_k)$

$$(x, e_k) = (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, e_k) = x_1 (e_1, e_k) + \dots + x_k (e_k, e_k) + \dots +$$

$$+ x_n (e_n, e_k) = x_k (e_k, e_k) = x_k \cdot 1 = x_k$$

Таъриф. E фазо $R_1 \subset E$, $R_2 \subset E$ бўлсин $R_2 = \{y : \forall x \in R; (y, x) = 0\}$

Теорема: R_2, E аниқланган скаляр кўпайтмага нисбатан қисм фазо бўлади.

$$\begin{aligned} \forall y_1, y_2 \in R_2 \quad y_1 - y_2 \in R_2 \\ \forall x \in R_1 \quad (y, x) = 0 \quad (y_2, x) = 0 \\ (y_1 - y_2; x) = (y_1, x) - (y_2; x) = 0 - 0 = 0 \\ y_1 - y_2 \in R_2 \end{aligned}$$

$$2) \quad \forall \lambda \in R, \quad \forall y \in R_2 \quad (xy, x) = \lambda \quad (y, x) = \lambda, \quad 0 = 0 \quad \lambda y \in R_2$$

Таъриф. R_2 -E нинг қисм фазосини R_1 қисм фазога ортогонал қисм фазо дейилади.

$$E = R_1(+) R_2 \quad \dim E = n \quad \dim R_1 = k \quad \dim R_2 = n - k$$

$e_1 \dots e_n$ (1) \Rightarrow бундаги базисни (q_1, \dots, q_{n-k}) (2) билан белгилайлик.

Ортогоналлаш жараёнига кўра (2) билан (1) ни ортогонал базисга келтириш мумкин.

$$x = \underbrace{x_1 e_1 + \dots + x_n e_k}_{x'(\in) x''} + \dots + x_n e_n -$$

$$x' = x_1 e_1 + \dots + x_k e_k = R_1$$

$$x'' = (kx + 1) \cdot x_{k+1} e_n + \dots + x_k e_n = R_2$$

Масалан:

$$2) \quad x \quad x^2 \quad (1)$$

$$\lambda_1 \cdot 1 + \lambda_2 \cdot x + \lambda_3 \cdot x^2 = 0 = 0 + 0x + 0x^2$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0 \quad q_1 = 1 \quad q_2 = q_1 + \lambda_1 x \quad (q_2, q_1) = 0$$

$$q_2 = 1 + (-2)x = 1 - 2x \quad q_3 = x^2 + \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2$$

$$(1 + \lambda_1 x, 1) = \int_0^1 (1 + \lambda x) dx \neq 0$$

$$\left(x + \lambda, \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = 0 \quad 1 + \frac{1}{2} \lambda = 0 \quad \lambda_1 = -2$$

$$q_2 = 1 + (-2)x = 1 - 2x$$

$$q_3 = x^2 + \lambda_1 q_1 + \lambda_2 q_2 \quad (q_3, q_1) = (x^2 + \lambda_1 + \lambda_2(1 - 2x) \cdot 1) = 0$$

$$(x^2 + \lambda_1 + \lambda_2(1 - 2x) \cdot 1 - 2x) = 0$$

$$(x^2, 1) + (\lambda_1, 1) + \lambda_2(1 - 2x, 1) = 0$$

$$\int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 dx + \lambda_2 \int_0^1 (1 - 2x) dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \lambda_1 x \Big|_0^1 - \frac{\lambda_2}{2} \frac{(1 - 2x)^2}{2} \Big|_0^1$$

Бундан $\lambda_1 = -\frac{1}{3}$ топамиз:

$$(x^2, 1-2x) + \left(-\frac{1}{3}; 1-2x\right) + \lambda_2(1-2x, 2x) = 0$$

$$\int x^2(1-2x)dx - \frac{1}{3}\int(1-2x)dx + \lambda_2 \int_0^1(1-2x)dx = 0$$

$$\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 - 2\frac{x^4}{4} \Big|_0^1 - \frac{1}{3}x \Big|_0^1 + \frac{2}{3}\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{\lambda_2}{2} \frac{(1-2x)}{3} \Big|_0^1 = 0$$

$$-\frac{1}{6} + \frac{\lambda_2}{3} = 0 \quad \lambda_2 = \frac{1}{2} \quad q_3 = x^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2}(1-2x) = x^2 - x + \frac{1}{6}$$

$1; 1-2x; x^2 - x + \frac{1}{6}$ ортогонал векторлар системаси

$$e_1 = 1 \quad e_2 = \frac{1-2x}{\sqrt{(1-2x)(1-2x)}}, \quad e_3 = \frac{x^2 - x + \frac{1}{6}}{\sqrt{\left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)\left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)}}$$

$$(1-2x, 1-2x) = \int_0^1(1-2x)^2 dx = -\frac{1}{2} \frac{(1-2x)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$e_2 = \frac{1-2x}{\sqrt{\frac{1}{3}}} = \sqrt{3}(1-2x)$$

$$\begin{aligned} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}, x^2 - x + \frac{1}{6}\right) &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx = \\ &= \left(\frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{3} + \frac{1}{36}x - 2\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{6}\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{180} \end{aligned}$$

$$e_3 = \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) \quad e_1, e_2, e_3 - \text{ортогонал базис.}$$

Назорат саволлари:

4. Қандай жараён ортогоналлаш жараёни дейилади?
5. Ортогонал базис деганда ниманитушунаси?
6. Евклид фазосининг қисм фазоси ҳақида нима биласиз ?

Ўйиқ тестлар

Савол	Жавоб
-------	-------

e_1, e_2, \dots, e_n векторлар системаси берилган . Агар $(e_i, e_j) = 0 \quad i \neq j$ бўлса берилган системани қандай система деб аталади?	Ортогонал векторлар системаси дейилади.
Агар Евклид фазосида чексиз кўп чизиқли эркин векторлар топиш мумкин бўлса, у ҳолда бу фазо қандай фазо дейилади?	Чексиз ўлчамли фазо дейилади
Е-ҳақиқий сонлар устида вектор фазо евклид фазоси бўлиши учун унда қандайдир қонун ёки қоида бўйича ихтиёрий 2 векторнинг скаляр кўпайтириш деб аталувчи (x, y) сон аниқланган бўлиб, нечта хосса ўринли бўлиши керак?	4
Евклид фазосида қайси тенгсизлик ўринли?	Коши-Буняковский

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нарманов А.Я. Дифференциал геометрия. Т. Университет, 2003
2. Coxeter H.S. Introduction to Geometry. Sydney-Toronto, 2001
3. Нарманов А.Я., Шарипов А.С., Аслонов Ж. Дифференциал геометрия ва топология фанидан дан машқ ва масалар тўплами. Т. Университет, 2014
4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М., изд. МГУ, 2004

3-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУ: ПСЕВДОЕВКЛИД ФАЗО.

Маълумки, Евклид фазосида координаталар бошидан ихтиёрий M нуқтагача бўлган масофа

$$OM^2 = x^2 + y^2 + z^2 \quad (1)$$

формула билан аниқланар эди. Энди шу формулани ўзгартириб, масофани $OM^2 = x^2 + y^2 - z^2$ бўйича топишни кўриб чиқайлик.

OM масофа $x^2 + y^2 > z^2$ бўлганда ҳақиқий мусбат сон, $x^2 + y^2 < z^2$ бўлганда эса мавҳум сонни аниқлайди. $x^2 + y^2 = z^2$ бўлганда эса масофа 0га тенг бўлади (M нуқта O билан устма-уст тушмасам).

Бу формулани координаталар кўринишда қуйидагича ёзиш мумкин:

$$M_1 M_2^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

OM_1 ва OM_2 кесмалар орасидаги бурчакни эса


$$\cos\varphi = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 - z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 - z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 - z_2^2}}$$




Узунлик ва бурчаклар шу формулалар асосида аниқланган фазолар *псевдоевклид фазолар* деб аталади. Бу фазода Евклид фазосининг кўпгина аксиома ва хоссалари сақланиши билан бир қаторда айрим муносабатлар кескин фарқ қилади.

Псевдоевклид фазода масофани юқоридагича аниқланишидан кўринадики, унда уч хил тўғри чизиклар бўлиши мумкин: барча кесмалари мусбат ҳақиқий узунликка эга тўғри чизиклар; мавҳум узунликдаги кесмаларга эга бўлган тўғри чизиклар ва барча кесмалари 0 узунликка эга бўлган тўғри чизиклар. Бу тўғри чизикларни фазовий ўхшаш, вақтли ўхшаш ва изотроп тўғри чизиклар деб юритилади.

ТОПШИРИҚ

Псевдоевклид фазодаги бу типдаги тўғри чизикларни чизмадаги аналитик кўринишини топинг:





Ёшиқ тестлар

Савол	Жавоб
$x^2+y^2>z^2$ бўлганда OM масофа қандай аниқланади?	ҳақиқий мусбат сонни аниқлайди.
$x^2+y^2=z^2$ бўлганда OM масофа қандай аниқланади?	масофа O га тенг бўлади (M нукта O билан устма-уст тушмаса ҳам).
$x^2+y^2<z^2$ бўлганда OM масофа қандай аниқланади?	мавхум сонни аниқлайди

Адабиётлар

1. Нарманов А.Я. Дифференциал геометрия. Т. Университет, 2003
2. Coxeter H.S. Introduction to Geometry. Sydney-Toronto, 2001
3. Нарманов А.Я., Шарипов А.С., Аслонов Ж. Дифференциал геометрия ва топология фанидан дан машқ ва масалар тўплами. Т. Университет, 2014
4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М., изд. МГУ, 2004

4-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУ: ГИПЕРБОЛИК ФАЗО.

n ўлчовли эллиптик фазо деб, R_{n+1} фазонинг сферасидаги диаметриал карама-қарши бўлган нукталар тўпламига айтилади (изометрик жуфт).

Бу фазони S_n билан белгиланади.

S_n фазони ноевклид Риман фазо деб ҳам аталади.

R_{n+1} фазо сфераларига уринмалар R_n фазони ташкил этганлигидан, чексиз кичик орикларда S_n геометрияси R_n фазо геометриясига яқин бўлади.

S_n фазонинг m ўлчовли текислиги S_m фазони ташкил этади.

Эллиптик фазода масофа масаласи қандай ўрнатилган?

Агар S_n фазонинг X нуктасини ифодаловчи векторлардан бири \bar{x} , иккинчиси ҳам \bar{x} бўлса, u ўлда бу векторлар $\bar{x}^2 = \bar{p}$ муносабат билан боьланган бўлади.

\bar{x} билан аниқланган S_n фазонинг X нуктасини $X(\bar{x})$ билан боғланади.

Бунда, $S-S_{Norton}$ фазодаги $X(\bar{x})$ ва $Y()$ нукталар орасидаги масофа, p эса эгрилик радиусидир.

S_n фазо координаталари сифатида R_{n+1} фазонинг \bar{x} векторининг x^2 координаталарини қараш мумкин.

Энди гиперболик фазонинг вектор аксиомаси асосида қурилишини кўриб чиқайлик

Гиперболик фазони таърифлаш учун E_n афин фазонинг I-IV группа аксиомаларидан ташқари қуйидаги V группа аксиомалари бажарилиши керак:

V.1⁰. Ҳар иккита \bar{a} ва \bar{b} векторларнинг скаляр кўпайтмаси деб аталувчи $K = \bar{a} E \bar{b}$ сон мос қуйилган бўлсин.

V.2⁰. Скаляр кўпайтма коммутатив, яони $\bar{a} E \bar{b} = \bar{b} E \bar{a}$

V.3⁰. Скаляр кўпайтма векторларни кўшишга нисбатан дистрибутив яъни $\bar{a} E (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} E \bar{b} + \bar{a} E \bar{c}$

V.4⁰. Ҳақиқий кўпайтувчини скаляр кўпайтма ташқарисига чиқариш мумкин: $(k \bar{a}) E \bar{b} = k \bar{a} E \bar{b}$

V.5⁰. Шундай \bar{a}_i кўринишдаги i та векторлар мавжудки, улар учун $\bar{a}_a E \bar{a}_a > 0 \quad (a < 1)$

$\bar{a}_n E \bar{a}_n < 0 \quad (u > 1), \bar{a}_i E \bar{b}_j, i \neq j$

Бундай шартларасида курилган l индекслипсевдоевклид фазони R_n кўринишда белгилаймиз.

1. Бизга маълумки $F(x,y)=0$ тенглама текисликда бирор тўғри чизикни аниқлайди, яъни ОХУ текисликдаги координаталари x ва y бўлган барча нуқталар тўплами бу тенгламани қаноатлантиради. Шунингдек, фазода ҳам

$$F(x,y,z)=0 \quad (1)$$

Тенглама ОХУЗ да бирор сиртни, яъни координаталари x,y,z бўлган ва (1) тенгламани қаноатлантирадиган нуқталар тўпламини аниқлайди. (1) тенглама сиртнинг тенграмаси, x,y,z лар эса унинг ўзгарувчи координаталари дейилади.

Иккинчи тартибли сиртнинг умумий тенграмаси қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$a_1 + x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_2xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$$

бу тенгламадаги $a_1, a_{22}, a_{33}, a_2, a_{13}, a_{23}$ коэффициентларнинг камида биттаси нолдан фарқли бўлиши керак. Айрим ҳолларда сирт тенграмаси билан эмас, балки у ёки бу хоссага эга бўлган нуқталарнинг геометрик ўрни билан берилиши мумкин. бу ҳолда сиртнинг геометрик хоссаларидан фойдаланиб унинг тенграмаси тузилади.

13⁰. Сферанинг ОХУЗ тўғри бурчакли Декарт координаталар системасидаги тенграмасини тузамиз.

Маркази $O'(a,b,c)$ нуқтада ва радиуси R бўлган сфера берилган бўлсин. Агар $\mu(x,y,z)$ нуқта сферанинг ихтиёрий нуқтаси бўлса, у ҳолда $O'(a,b,c)$ ва $\mu(x,y,z)$ нуқталар орасидаги масофани топиш формуласидан фойдалансак, сфера тенграмаси қуйидагича бўлади:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad (1)$$

(13)–маркази $O'(a,b,c)$ бўлган нуқтада ётувчи ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенграмаси дейилади. Агар (13) да $a=b=c=0$ бўлса, маркази координаталар бошида ётувчи ва радиуси R га тенг бўлган сфера тенграмасига эга бўламиз:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad (2)$$

(13) ни қуйидаги кўринишда ёзиш мумкин:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2 - R^2 = 0 \quad (3)$$

Сфератенграмаси иккинчи тартибли сирт бўлишини кўрсатайлик. Бунинг учун сиртнинг (2) тенграмасида

$a_2=a_{13}=a_{23}=0$ ва $a_1=a_{22}=a_{33}$ деб олинса, (2) тенглама сферанинг тенгламаси эканини текшираимиз. Бунинг учун $a_1 \neq 0$ деб (4) нинг ҳамма ҳадларини a_1 га бўламиз ва қуйидаги белгилашларни киритаимиз:

$$A = \frac{2a_{14}}{a_{11}}, B = \frac{2a_{24}}{a_{11}}, C = \frac{2a_{34}}{a_{11}}, D = \frac{a_{44}}{aa_{11}}$$

Натижада $x^2+y^2+z^2+Ax+By+Cz+D=0$ кўринишдаги тенгламага эга бўламиз. Охириги тенгламани ушбу кўринишда ёзиб оламиз

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(A^2 + B^2 + C^2 - 4D)$$

ёки

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}\right)^2 \quad (5)$$

(5) тенгламадан кўринадикки, $A^2+B^2+C^2-4D > 0$ бўлганда (4) тенглама маонога эга бўлади. Демак, $A^2+B^2+C^2-4D > 0$ бўлса, (5) тенглама маркази

$$\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$$


нуктада ва радиуси $R = \frac{1}{2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - 4D}$

бўлган сферани ифодалайди. Агар $A^2+B^2+C^2-4D=0$ бўлса, (5) тенглама

$$\left(x + \frac{A}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{B}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{C}{2}\right)^2 = 0$$

кўринишда бўлиб, у фақат битта $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}, -\frac{C}{2}\right)$ нуктани ифодалайди.

2⁰. Бирор П текисликда ётувчи L чизикнинг ҳар бир нуктасидан ўтувчи ва берилган l тўғри чизикка параллел бўлган барча тўғри чизиклардан ташкил топган сирт **цилиндрик сирт** дейилади. бунда L чизик цилиндрик сиртнинг йўналтирувчиси, l тўғри чизикка параллел ва L чизикни кесувчи чизиклар унинг ясовчиси дейилади (1–чизма).



Йўналтирувчилари координата текисликларидан бирида ётувчи ясовчилари эса шу текисликка перпендикуляр бўлиб, координаталар ўқиға параллел бўлган цилиндрик сиртларни кўрайлик.


OX текисликда тенгламаси

$$F(x,y)=0 \quad (6)$$

бўлган L чизик ва ясовчилари OZ

ўқға параллел бўлган цилиндрик сиртни ясаймиз (2–чизма). (6) тенглама OXYZ координаталар системасида цилиндрик сирт эканини кўрсатайлик.

$M(x,y,z)$ –цилиндр сиртнинг ихтиёрий тайинланган



нуктаси бўлсин. M нукта орқали ўтувчи ясовчининг L йўналтирувчиси билан кесишган нуктасини N билан белгилаймиз. N нукта M нуктанинг OXY текислигидаги проекциясидир. Шунинг учун M ва N нукталар битта x абцисса ва битта y ординатага эга. N нукта L чизикда ётгани учун y эгри чизикнинг (6) тенгламасини қаноатлантиради.

Демак, бу тенгламани $M(x,y,z)$ нуктанинг координаталари ҳам қаноатлантиради. $OXYZ$ фазода L йўналтирувчи қуйидаги иккита тенглама системаси билан аниқланади:

$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ Z = 0 \end{cases}$$

Худди шунга ўхшаш

$$\begin{cases} F(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{ва} \quad \begin{cases} F(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

тенгламалар цилиндр сиртларнинг L йўналтирувчи чизикларини мос равишда OXZ ва OYZ текисликдаги ҳолатини аниқлашни кўрсатиш мумкин.

Хусусий ҳолларда цилиндр сиртларнинг йўналтирувчилари эллипс, гипербола, парабола, иккита кесишувчи тўғри чизик, иккита ўзаро параллел (устма-уст тушмаган) тўғри чизиклардан иборат бўлиши мумкин. Бундай сиртларни мос равишда эллиптик цилиндр, параболик цилиндр, гиперболик цилиндр, иккита кесишувчи текислик, иккита параллел текислик деб юритилади ва уларнинг тенгламалари қуйидаги кўринишда бўлади:



Эллиптик цилиндр: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (3-чизма)

Гиперболик цилиндр: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (4-чизма)

Параболик цилиндр: $y^2 = -2px$ (5-чизма)

Икки кесишувчи текислик: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ (6-чизма)

Икки параллел текислик: $x^2 - a^2 = 0$ ($a \neq 0$) (7-чизма)



3.1⁰. Бирор Q текисликда L иккинчи тартибли чизик ва бў текисликка тегишли бўлмаган M_0 нукта берилган бўлсин.

Таъриф. Фазодаги M_0 нуктадан ўтиб, L ни кесиб ўтувчи барча тўғри чизиклар тўплами иккинчи тартибли конус сирт (ёки конус) дейилади. M_0 нукта конус учи, L чизик конус йўналтирувчиси, конусни ҳосил қилувчи чизиклар эса унинг ясовчилари дейилади.

Конус ясовчилари бўлган тўғри чизиклар маркази конус ичида бўлган тўғри чизиклар боғламига тегишли бўлади. конус тенгламасини келтириб чиқарайлик. Q текислик ва ундаги L чизик OXU текисликда ётган бўлсин.

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта эса OXU текисликдаги ётмаган ихтиёрий нукта бўлсин. конуснинг ихтиёрий $M(x, y, z)$ нуктасини олайлик, у ҳолда M_0M тўғри чизик конуснинг ясовчиси бўлиб, L чизик билан $M(x_1, y_1, z_1)$ нуктада кесишади.

M_0, M_1, M нукталар бир тўғри чизикда ётгани учун $\overrightarrow{M_0M_1} = \lambda \overrightarrow{M_0M}$ тенглик ўринли. Бу тенгликдан

$$x_1 - x_0 = \lambda(x - x_0) \Rightarrow x_1 = x_0 + \lambda(x - x_0)$$

$$y_1 - y_0 = \lambda(y - y_0) \Rightarrow y_1 = y_0 + \lambda(y - y_0)$$

$$z_1 - z_0 = \lambda(z - z_0) \Rightarrow z_1 = z_0 + \lambda(z - z_0)$$

Охирги тенгликдан λ ни топиб, олдинги икки тенгликка кўямиз:

$$x_1 = x_0 + \frac{x - x_0}{z_0 - z} z_0, \quad y_1 = y_0 + \frac{y - y_0}{z_0 - z} z_0 \quad (7)$$

$$M_1 \in L \Rightarrow F(x_1, y_1) = 0$$

ёки

$$F\left(\frac{x - x_0}{z_0 - z} z_0, y_0 + \frac{y - y_0}{z_0 - z} z_0\right) = 0 \quad (8)$$

(8) ифода конус тенгламаси дейилади. Иккинчи тенглама конуснинг Декарт координаталар системасидаги энг содда тенгламаси

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (9)$$

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$$

кўринишда бўлади.

2⁰. Q текисликда бирор L чизик ва l тўғри чизик берилган бўлсин.


Таъриф. L чизикнинг l тўғри чизик атрофида айланишдан ҳосил бўлган Ф фигура айланма сирт дейилади.

бунда L айланма сиртнинг меридиани, l айланиш ўқи дейилади.

Айланма сиртнинг тенгламасини келтириб чиқарайлик.

Декарт координаталар системасини шундай танлаймизки, бунда Q-(OYZ) текислик, l-(OZ) ўқ ҳамда

L:F(x,z)=0 бўлсин.



L чизикнинг (OZ) ўқ атрофида айланишидан қандайдир Ф сирт ҳосил бўлсин (9-чизма). M(x,y,z) шу сиртга тегишли ихтиёрий нукта бўлсин. M нуктадан OZ ўққа перпендикуляр ўтказсак, кесимда маркази $0 \in (OZ)$ нуктада бўлган бирор айлана ҳосил қилинадики, u айлана L чизик билан $M_1(0, y_1, z_1)$ нуктада кесишсин. Кесим айланадан иборат бўлгани учун:

$$\rho(0, M) = \rho(0, M_1) \quad (10)$$

Бу масофалар икки нуқта орасидаги масофани топиш формуласига кўра қуйидагича бўлади:

$$\rho(0,M)=\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2+(z-z)^2}=\sqrt{x^2+y^2}$$

$$\rho(0,M_1)=\sqrt{(0-0)^2+(y_1-0)^2+(z-z)^2}=\sqrt{y_1^2}=|y_1|.$$

Бу қийматларни (10) тенгликка қўямиз:

$$|y_1|=\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow y_1=\pm\sqrt{x^2+y^2}$$

$M\in L$ бўлгани учун:

$$F(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0 \quad (11)$$

(11) тенглама L чизиқни OZ ўқ атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган сиртнинг тенгласидир.

Агар L чизиқ мос равишда OX ва OY ўқлар атрофида айлантирсак, ҳосил бўлган сиртларнинг тенгламалари мос равишда

$$F(x,\pm\sqrt{y^2+z^2})=0 \text{ ва } F(y,\pm\sqrt{x^2+z^2})=0 \quad (12)$$

кўринишларда бўлади.

Торшириқ

1. Гиперболик фазоларга мисоллар келтиринг

Ўпиқ тестлар

Савол	Жавоб
Эллиптик цилиндр тенгласи	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Гиперболик цилиндр тенгласи	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Параболик цилиндр тенгласи	$y^2 = -2px$
Эллипсоид тенгласи	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Адабиётлар

1. Нарманов А.Я. Дифференциал геометрия. Т. Университет, 2003
2. Coxeter H.S. Introduction to Geometry. Sydney-Toronto, 2001
3. Нарманов А.Я., Шарипов А.С., Аслонов Ж. Дифференциал геометрия ва топология фанидан дан машқ ва масалар тўплами. Т. Университет, 2014
4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М., изд. МГУ, 2004

5-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУ: Иккинчи тартибли сиртлар. Иккинчи тартибли сирт инвариантлари.

1. Сиртлар назарияси. Йўналиш бўйича эгриликлар.

Текисликдаги очик доирага гомеоморф тўпламни *элементар соҳа* деб атаймиз.

1-таъриф. Фазодаги \hat{O} тўпلام элементар соҳанинг топологик акслантиришдаги образи бўлса, у элементар сирт деб аталади.

Демак, \hat{O} тўпلام элементар сирт бўлса, $f: G \rightarrow \hat{O}$ - топологик акслантириш мавжуд бўлиши керак. Бу ерда $G \subset R^2$ элементар соҳа, \hat{O} эса R^3 дан келтирилган топология ёрдамида топологик фазога айланттирилган. Агар \hat{O} элементар сирт бўлса, (f, G) жуфтлик \hat{O} сиртни параметрлаш усули дейилади.

Албатта G_1 бошқа элементар соҳа бўлса, G ва G_1 соҳалар ўзаро гомеоморф бўлади ва агар $g: G_1 \rightarrow G$ гомеоморфизм берилган бўлса, $f \cdot g: G_1 \rightarrow \hat{O}$ гомеоморфизм \hat{O} сиртни параметрлашнинг бошқа усулидир.

Демак, элементар сирт учун чексиз кўп параметрлаш усуллари мавжуддир. Бирортатўпلامнинг элементар сирт эканлигини кўрсатиш учун, унинг учун бирорта параметрлаш усулини кўрсатиш керак.

Агар \hat{O} сирт (f, G) параметрлаш усули билан берилиб, $(u, v) \in G$ учун $\phi(u, v)$ нуктанинг координатлари $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ кўринишда белгиласак

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \quad (1)$$

система \hat{O} сиртнинг параметрик тенгламалар системаси дейилади.

2-таъриф. Фазодаги боғланишли \hat{O} тўпلام ўзига тегишли ҳар бир нуктанинг бирорта атрофида элементар сиртга айланса, \hat{O} сода сирт дейилади.

Иккинчи таърифга изоҳ берамиз. Демак, \hat{O} сода сирт бўлиши учун унга тегишли ҳар бир $p \in \hat{O}$ нукта учун шундай $U(p)$ атроф (R^3 фазода) мавжуд бўлиб, кесимма $U(p) \cap \hat{O}$ элементар сирт бўлиши керак.

Кейинчалик курс давомидасиртдеганда элементар ёкисоддасирт нитушуна миз.

Мисоллар.


1) Ҳар қандай текислик элементар сиртдир, чунки текислик доирага гомеоморфдир.

Агар $M(x_0, y_0, z_0)$ текислик нуктаси, \vec{a} ва \vec{b} векторлар текисликка параллел бўлса, уни

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}u + \vec{b}v, \quad -\infty < u < +\infty, \quad -\infty < v < \infty$$

кўринишида параметрлаш мумкин. Бу ерда $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$ вектор M нуктанинг радиус векторидир.


2) элементар G соҳада аниқланган $z = f(x, y)$ – узлуксиз функциянинг графиги элементар сиртдир. Сабаби, $(x, y, f(x, y)) \rightarrow (x, y)$ – акслантириш (проектсия) гомеоморфизмдир.



Чизма-1


3) Икки ўлчамли сфера S^2 элементар бўлмаган содасиртдир. Радиуси R га тенг S^2 сферанинг марказига координаталар бошини жойлаштирсак, уни $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}$ тўплами сифатида қарашимиз мумкин.

Бусферанинг сиртэканлигини исботлаш учунунгатегишли бирорта P нуктани олайлик. Бу P нуктадан фаркли S нуктани жанубий қутб сифатида, унга диаметр қарама-қарши бўлган N нуктани шимолий қутб ҳисоблаб, z ўқини координата бошидан N нукта орқали ўтказамиз, Ox текислигига O нуктадан ўтувчи ON га перпендикуляр текисликдир. Бутекислик ва сфера кесишишидан ҳосил бўлган аylanани **экватор** деб атаймиз. Энди u билан OQ нур ва Ox ўқи орасидаги бурчакни, v билан OP ва OQ нурлар орасидаги бурчакни белгилаймиз. Бу ерда Q нукта NPS меридианнинг экватор билан кесишиш нуктасидир, $0 < u < 2\pi$, $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2}$. Шунда S^2 сферанинг NS меридиан чиқариб ташланган қисми $\phi: P \rightarrow (u, v)$ акслантириш ёрдамида $[0; 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ элементар соҳага гомеоморф акслантирилади ва $x = R \cos u \cos v$, $y = R \sin u \cos v$, $z = R \sin v$ тенгламалар ёрдамида параметрланади.



Чизма-2

4) Доиравий цилиндрни $x = R \cos u$, $y = R \sin u$, $z = v$ тенглалар системаси ёрдамида параметрлаш мумкин. Буерда $-\infty < u < +\infty$, $-\infty < v < +\infty$. Албаттасилиндрхамэлементарсиртэмас (3 -чизма).



3 -чизма

Агар биз $\vec{r}(u, v) = \{x(u; v); y(u; v); z(u; v)\}$ вектор функцияни киритсак (1)

тенглалар системасини битта

$$\vec{r} = \vec{r}(u; v), (u, v) \in G \quad (2)$$

вектор тенглама ёрдамида ёзаоламиз.

Бу тенглама \hat{O} сиртнинг **вектор**

қўринишдаги тенглмаси дейилади. Табиийки, \hat{O} сиртэлементар сирт бўлмаса, (1) ва (2) тенглаларуни бироргануқта атрофида аниқлайди. Агар \hat{O} элементар сирт бўлса, унитўлик (1) ёки (2) тенглалар ёрдамида аниқлаш мумкин.

2. Сиртнинг ошкормас қўринишда берилиши.

Бизга $G \subset R^3$ очик тўплам ва G да аниқланган силлик $F(x; y; z)$ функция берилган

бўлсин.

Шунда $\hat{O} = \{(x; y; z) \in G : F(x; y; z) = 0\}$ тўплам F функциянинг *сатҳ тўплами* ёки *сирти* дейилади. Агар $\text{grad}F \neq 0$ бўлса, \hat{O} ҳақиқатдан ҳам содда сирт бўлади. Ҳақиқатдан, агар $p = (x_0; y_0; z_0) \in \hat{O}$ нуқтада $F_z \neq 0$ бўлса, ошқормас функция ҳақидаги теоремага кўра, шундай $\delta > 0, \varepsilon > 0$ сонлари ва $G_0 = \{(x; y) : |x_0 - x| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$ соҳада аниқланган $z = f(x; y)$ функция мавжуд бўлиб, $(x; y) \in G_0$ бўлганда $F(x; y, f(x; y)) = 0$ тенглик ва $z_0 = f(x_0; y_0), |z_0 - f(x; y)| < \varepsilon$ муносабатлар бажарилиб,

$$\tilde{I} = \{(x; y; z) : |x_0 - x| < \delta, |y_0 - y| < \delta, |z_0 - z| < \varepsilon\}$$

Параллелипеднинг \hat{O} Биланкесишмаси $z = f(x; y)$ функциянинг графигидани боратдир. Демак, \hat{O} ўзигатегишли ҳар қандай нуқтанинг етарли кичик атрофида элементар сирт бўлади.

Бизнинг курсимизда асосий метод математик анализ бўлганлиги учун, биз сиртлардан кўшимча шартларни талаб қиламиз.

Таъриф. Берилган \hat{O} сирт учун унга тегишли ихтиёрий нуқта атрофида (f, G) параметрлаш усули мавжуд бўлиб, бунда $x(u; v), y(u; v), z(u; v)$ функциялар узлуксиз хусусий

ҳосилаларга эга ва $\begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix}$ матрицанинг ранги иккига тенг бўлса, \hat{O} сирт **регуляр сирт**

дейлади, параметрлаш усули эса **регуляр параметрлаш** дейлади.

Сиртнинг регулярлик шартини $\begin{bmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{bmatrix} = \vec{0}$ кўринишда ҳам ёзишимиз мумкин.

Биз курсимизда асосан регуляр сиртларни ўрганамиз.

Эндисиртларнинг берилиш усулларихақида қуйидаги теоремаларни исботлайлик.

Теорема-1. Бизга G соҳада аниқланган силлиқ $x(u; v), y(u; v), z(u; v)$ функциялар берилиб,

ҳар бир нуқтада $\text{rang} \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} = 2$ тенглик ўринли бўлса,

$$\begin{cases} x = x(u; v) \\ y = y(u; v) \\ z = z(u; v) \end{cases} (u; v) \in G$$

система регуляр сиртни аниқлайди.

Исбот. Теоремани исботлаш учун

$$\Phi = \{(x; y; z) : x = x(u; v), y = y(u; v), z = z(u; v), (u; v) \in G\}$$

тўпланинг сода сирт эканлигини кўрсатамиз. Бунинг учун эса \hat{O} тўпламга тегишли ихтиёрий $p_0 = (x(u_0; v_0), y(u_0; v_0), z(u_0; v_0))$ нуқтанинг етарли кичик атрофида \hat{O} элементар сирт эканлигини

кўрсатамиз. Бирорта $\varepsilon > 0$ ва $G_\varepsilon = \{(u; v) \in G : (u_0 - u)^2 + (v_0 - v)^2 < \varepsilon\}$ очик доира учун $f : (u; v) \rightarrow (x(u; v), y(u; v), z(u; v))$ коида Билан аниқланган $f : G_\varepsilon \rightarrow f(G_\varepsilon)$ акслантиришни қараймиз. Берилган $x(u; v), y(u; v), z(u; v)$ функциялар узлуксиз бўлганлиги учун f ҳам узлуксиз акслантиришдир. Агар f ўзаро бир қийматли бўлса, унинг тескараси f^{-1} мавжуд ва узлуксиз бўлади (f^{-1} узлуксизлиги ҳам $x(u; v), y(u; v)$ ва $z(u; v)$ функциялар узлуксизлиги ва теорема шартидан келиб чиқади), демак \hat{O} нинг p_0 нуқтани ўз ичига олувчи $f(G_\varepsilon)$ қисми элементар сирт бўлади.

Шунинг учун бирорта $\varepsilon > 0$ учун f акслантиришнинг ўзаро бир қийматли акслантириш эканлигини исботлаймиз.

Фаразқилайлик, $\varepsilon_i > 0, \varepsilon_i \rightarrow 0, i = 1, 2, 3, \dots$ ва G_{ε_i} доирага тегишли $(u_i^1; v_i^1)$ ва $(u_i^2; v_i^2)$ ҳар хил нуқталар учун $f(u_i^1; v_i^1) = f(u_i^2; v_i^2)$ тенглик ўринли бўлсин. Умумийликни чегараламасдан аниқлик учун $u_i^1 \leq u_i^2$ ва $v_i^1 \leq v_i^2$ деб фараз қилайлик. Шунда,

$$x(u_i^1; v_i^1) - x(u_i^2; v_i^2) = 0, \quad y(u_i^1; v_i^1) - y(u_i^2; v_i^2) = 0, \quad z(u_i^1; v_i^1) - z(u_i^2; v_i^2) = 0$$

тенгликлардан ва Лагранж теоремасидан

$$\begin{aligned} x_u(p_i^1, v_i^1)(u_i^2 - u_i^1) + x_v(u_i^2, q_i^1)(v_i^2 - v_i^1) &= 0 \\ y_u(p_i^2, v_i^1)(u_i^2 - u_i^1) + y_v(u_i^2, q_i^2)(v_i^2 - v_i^1) &= 0 \\ z_u(p_i^3, v_i^1)(u_i^2 - u_i^1) + z_v(u_i^2, q_i^3)(v_i^2 - v_i^1) &= 0 \end{aligned}$$

тенгликларни оламиз. Бу ерда $p_i^1, p_i^2, p_i^3 \in [u_i^1, u_i^2], q_i^1, q_i^2, q_i^3 \in [v_i^1, v_i^2], u_i^2 - u_i^1$ ва $v_i^2 - v_i^1$ сонлари бир вақтда нолга айлана олмайди.

Шунинг учун қоридаги тенгликлардан

$$\frac{x_u(p_i^1; v_i^1)}{x_v(u_i^2; q_i^1)} = \frac{y_u(p_i^2; v_i^1)}{y_v(u_i^2; q_i^2)} = \frac{z_u(p_i^3; v_i^1)}{z_v(u_i^2; q_i^3)}$$

Муносабатни оламиз.

Бумуносабатда x_u, x_v, y_u, y_v ва z_u, z_v

функциялар узлуксизлигидан фойдаланиб, $i \rightarrow \infty$ лимитга ўтсак,

$$\frac{x_u(u_0, v_0)}{x_v(u_0, v_0)} = \frac{y_u(u_0, v_0)}{y_v(u_0, v_0)} = \frac{z_u(u_0, v_0)}{z_v(u_0, v_0)}$$

Муносабатни оламиз. Бумуносабат эса теорема шартига зид бўлган,

$$\text{rang} \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix}_{(u_0, v_0)} < 2$$

Тенгсизлик катенгкучлидир. Демак, фаразimiz нотўғри, ва $\varepsilon > 0$ етарликичик бўлганда

$f : G_\varepsilon \rightarrow f(G_\varepsilon)$ акслантириштопологиякакслантиришдир. Бунданэса, \hat{O} тўпламнинг p_0 нуктаниўзичигаолувчи $f(G_\varepsilon)$ қисмиэлементарсиртэканлигикелибчиқади.

Теорема-2. Регуляр \hat{O} сирт унга тегишли $p(u_0, v_0)$ нуқта атрофида,

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v), (u, v) \in G \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

Параметрик тенгламалар ёрдамида берилиб, p нуқтада $\begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix}$ детерминант нолдан фарқли бўлса, шундай силлиқ $f(x, y)$ функция мавжудки p нуқтанинг атрофида \hat{O} сирт $z = f(x, y)$ функциянинг графигидан иборатдир.

Изоҳ. Биз регуляр сиртларнинг параметрлаш усулини танлаганимизда ҳар доим $x_u, x_v, y_u, y_v, z_u, z_v$ ҳосилалар мавжуд ва узлуксиз бўлишини талаб қиламиз.

Исбот. Теоремани исботлаш учун,

$$\begin{cases} x = x(u; v) & x(u_0, v_0) = x_0 \\ y = y(u; v) & y(u_0, v_0) = y_0 \end{cases}$$

системага математик анализ курсидаги тескари функциялар ҳақидаги теоремани қўллаймиз.

Бу теоремага асосан шундай $\delta > 0$ сонива $\Pi_\delta = \{(x, y) : |x_0 - x| < \delta, |y_0 - y| < \delta\}$

Соҳада аниқланган шундай дифференциалланувчи $u = u(x, y), v = v(x, y)$ функциялар мавжудки,

улар $x(u(x, y), v(x, y)) \equiv x, y(u(x, y), v(x, y)) \equiv y$ тенгликларни қаноатлантирадигана $u(x_0; y_0) = u_0,$

$v(x_0; y_0) = v_0$, муносабатлар ўринли бўлади. Демак, p нуқта атрофида \hat{O} сирт $z = z(u(x, y),$

$v(x, y)) = f(x, y)$ функциянинг графигидан иборатдир.

3. Сиртустида ётувчи эгри чизиклар.

Регуляр \hat{O} сиртнинг $p \in \hat{O}$ нуқта атрофида регуляр (f, G) параметрлаш усули

$$\vec{r} = \vec{r}(u, v) \quad (1)$$

тенглама ёрдамида берилган, сиртустида M нуқтадан ётувчи γ эгри чизик берилган бўлиб, у

$$\vec{\rho} = \vec{\rho}(t), a < t < b. \quad (2)$$

тенглама ёрдамида параметрланган ва $\gamma \subset f(G)$ бўлсин.

Аниқлик учун, M сирт нуқтаси сифатида $(u_0; v_0)$ координаталарга, эгри чизик нуқтаси сифатида t параметрнинг t_0 қийматига мос келсин. Табиийки, ҳар бир $t \in (a; b)$ учун шундай $(u(t), v(t)) \in G$ нуқта мавжуд бўлиб,

$$\vec{\rho}(t) = \vec{r}(u(t), v(t)) \quad (3)$$

тенглик ўринли бўлади. Агар γ силлиқ эгри чизик бўлса, $u(t), v(t)$ функциялар ҳам дифференциалланувчи функциялар бўлади. Буни исботлаш учун \hat{O} сиртнинг регуляр сиртэканлигидан фойдаланамиз. \hat{O} регуляр сирт бўлганлиги учун rang

$$\begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{pmatrix} = 2 \text{ тенглик ўринли. Аниқлик учун } \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} \neq 0 \text{ бўлсин деб фараз қилиб, } \begin{cases} x = x(u; v) \\ y = y(u; v) \end{cases}$$

системани қараймиз.

Агар γ силлиқ эгричи зик бўлса, $\vec{r}(t)$ вектор функциянинг координатлари $x(t), y(t), z(t)$ дифференциалланувчи функциялар бўлади. Бирорта $t^* \in (a; b)$ учун $x^* = x(t^*), y^* = y(t^*), z^* = z(t^*)$.

ва $u^* = u(t^*), v^* = v(t^*)$ белгилашлар киритиб,
$$\begin{cases} x = x(u; v) \\ y = y(u; v) \end{cases}$$

системани

$$\begin{cases} x(u^*, v^*) = x^* \\ y(u^*, v^*) = y^* \end{cases}$$

Назорат саволлари ва топшириқлар:

1. Йўналтирувчи чизиғи $\vec{p} = \vec{p}(u)$ тенглама билан берилган, ясовчилари \vec{e} векторга параллел бўлган цилиндрнинг параметрик тенгламалари тузилсин.

2. Фазода $x = ach\left(\frac{u}{a}\right), y = 0, z = u$ тенгламалар билан берилган чизиқнинг Oz ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган сиртнинг (катеноид) тенгламаларини ёзинг.

3. Гиперболик параболоид

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

каноник тенглама билан берилган бўлса, унинг шундай параметрик тенгламаларини ёзингки, координата чизиқлари ясовчилар даниборат бўлсин.

4. Сфера $x = a \cos u \cos v, y = a \sin u \cos v, z = a \sin v$ параметрик тенгламалари билан берилган бўлса, унинг биринчи квадратик формасини топинг.

Эллиптик параболоид $x = \sqrt{p}v \cos u, y = \sqrt{q}v \sin u, z = \frac{v^2}{2}$ тенгламалар билан берилган, унинг биринчи квадратик формасини топинг.

5. Биринчи квадратик формаси $I = du^2 + (u^2 + a^2)dv^2$ кўринишда бўлган сиртда $u = \frac{1}{2}av^2, u = -\frac{1}{2}av^2, v = 1$ чизиқлар ҳосил қилган уч бурчакнинг периметрини ва бурчакларини топинг.

6. Биринчи квадратик форма 6-масаладаги кўринишда бўлган сиртда $u = av, u = -av, v = 1$ чизиқлар билан чегараланган уч бурчакнинг юзини ҳисобланг.

7. Биринчи квадратик форма 6-масаладаги кўринишда бўлган сиртда $u + v = 0, u - v = 0$ чизиқлар орасидаги бурчакни топинг.

8. Бирпаллали гиперболоид $x = achu \cos v, y = achu \sin v, z = cchu$ тенгламалар билан берилган бўлса, унинг кинчи квадратик формасини топинг.

9. Доиравий цилиндр $x = R \cos v, y = R \sin v, z = u$ тенгламалар билан берилган бўлса, унинг кинчи квадратик формасини топинг.

10. Сирт $F(x, y, z) = 0$ тенглама билан берилган. Унинг Гаусс эгрилигини топинг.

11. Сирт дифференциалланувчи $z = f(x, y)$ функциянинг графиги даниборат бўлса, унинг Гаусс ва ўрта эгрилигини ҳисобланг.

12. Сфера $x^2 + y^2 + z^2 = 169$ тенглама билан берилган. Унинг $M(3,4,12)$ нуктадан ўтувчи уринма текислиги ва нормал тенгламалари тузилсин.

13. Геликоид $x = u \cos v, y = u \sin v, z = av$ тенгламалар билан берилган.

Унинг ўрта эгрилигини топинг.

14. Сирт $xuz = 1$ тенглама билан берилган. Унинг $x + y + z - 3 = 0$ текисликка параллел уринма текисликларини топинг.

15. Геликоид учун геодезик чизикларнинг тенгламаларини ёзинг.

16. Сирт $x = u^2 + v^2, y = u^2 - v^2, z = uv$ тенгламалар билан берилган. Унинг $P(u=1, v=1)$ нуктасидаги $v = u^2$ чизик йўналиши бўйичан нормал эгрилигини топинг.

17. Сирт $z = 2x^2 + \frac{9}{2}y^2$ тенглама билан берилган. Унинг $M(0,0,0)$ нуктасидаги Дюпен индикатрисаси тенгламасини тузинг.

Ўпик тестлар

Савол	Жавоб
Эллиптик цилиндр тенгламаси	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
Гиперболик цилиндр тенгламаси	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
Параболик цилиндр тенгламаси	$y^2 = -2px$
Эллипсоид тенгламаси	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$


Фойдаланилган адабиётлар:

1. Нарманов А.Я. Дифференциал геометрия. Т. Университет, 2003
2. Coxeter H.S. Introduction to Geometry. Sydney-Toronto, 2001
3. Нарманов А.Я., Шарипов А.С., Аслонов Ж. Дифференциал геометрия ва топология фанидан дан машқ ва масалар тўплами. Т. Университет, 2014
4. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М., изд. МГУ, 2004

6-АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАВЗУ: КЎПХИЛЛИКЛАР. КЎПХИЛЛИКЛАР ТУРЛАРИ. КЎПХИЛЛИК ГЕОМЕТРИЯСИ.

1. Риман геометрияси элементлари.

Силлиқ k -ўлчамли N кўпхилликни силлиқ n -ўлчамли кўпхилликка узлуксиз акслантириши $\varphi : N \rightarrow M$ силлиқ дейилади, агар ихтиёрий $p \in N$ нуқтанинг атрофида N ва M даги бирор картада силлиқ функциялар билан берилса, яъни $g\varphi h^{-1}$ функция M да силлиқ функция бўлса (2-расм). Эслатиб ўтамиз, бунда N, M кўпхилликларнинг ўлчамлари k, n ихтиёрий бўлиши мумкин.



2-расм.

Икки силлиқ кўпхилликни ўзаро бир қийматли икки томонлама силлиқ акслантириш диффеоморфизм, бундай акслантириш ўрнатиш мумкин бўлган кўпхилликлар эса диффеоморф дейилади.

M да силлиқ йўл деб $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ силлиқ акслантиришга айтамыз. Локал координаталарда йўл нуқталарининг ҳар бир $x^i \circ \gamma$ координатаси силлиқ функция бўлади. $\gamma(a)$ ва $\gamma(b)$ нуқталар йўлнинг боши ва охири дейилади.

Теорема 3. $\varphi : N \rightarrow M$ - силлиқ кўпхилликларни силлиқ акслантириш ва $\forall q \in M$ φ акслантиришнинг регуляр нуқтаси бўлсин. У ҳолда p нуқтанинг тўла прообрази $B = \varphi^{-1}(q)_N$ да ўлчами $\dim B = \dim N - \dim M = k - n$ бўлган силлиқ қисм кўпхиллик бўлади.

Исбот. $B = \varphi^{-1}(q)$ қатламнинг кўпхиллик эканини исботлаш учун, ҳар бир $p \in B$ нуқтанинг атрофида ошқормас функция ҳақидаги теоремани қўллаш етарли. Натижада ҳар бир $p \in B$ нуқтанинг \mathbf{R}^{k-n} евклид фазосидаги соҳага гомеоморф $p \in U$ атрофга эга бўлади. U атрофда локал координаталар сифатида N кўпхилликнинг p нуқтаси атрофидаги (x_1, \dots, x_n)

локал координаталардан бирор $(n - m)$ тасини олиш мумкин. Агар бу координаталар $(x_{i_1}, \dots, x_{i_{n-m}})$ бўлса, у ҳолда қолган (x_j) локал координаталар $(x_{i_1}, \dots, x_{i_{n-m}})$ орқали силлик функциялар билан ифодаланади. Бундан $B = \varphi^{-1}(q)$ нинг силлик кўпхиллик эканлиги келиб чиқади. $(y_1, \dots, y_n)_N$ кўпхилликнинг P нуқтаси атрофидаги бошқа координата системаси бўлсин. $(y_{j_1}, \dots, y_{j_{n-m}})$ система B да локал координаталар системасини ташкил этади. У ҳолда

$$y_{j_k} = y_{j_k}(x_1, \dots, x_n) = y_{j_k}(x_1(x_{i_1}, \dots, x_{i_{n-m}}), \dots, x_n(x_{i_1}, \dots, x_{i_{n-m}}))$$

Силлик функция бўлади. Теорема исботланди.

Бу эса ошқормас функция ҳақидаги теоремадан келиб чиқади.

Акслантириш дифференциали.

$\varphi : N \rightarrow M$ — силлик N кўпхилликни силлик M кўпхилликка силлик акслантириш бўлсин. N даги ҳар бир γ йўлга M да $\varphi \circ \gamma$ йўл мос келади.

M да бирор $\varphi(p)$ нуқта атрофида берилган ҳар бир f функцияларга, N да бирор p нуқта атрофида берилган $f \circ \varphi$ функция мос келади.

Силлик φ акслантиришнинг p нуқтадаги дифференциали $d_p \varphi$ деб $d_p \varphi : T_p N \rightarrow T_{\varphi(p)} M$ акслантиришга айтилади, у ҳар бир $u \in T_p N$ векторга $d_p \varphi(u) \in T_{\varphi(p)} M$ векторни мос қўйади, M да ихтиёрий f силлик функцияга қуйидаги қоида бўйича таъсир этади:

$$(d_p \varphi(u))f = u(f \circ \varphi).$$

Агар u вектор γ йўлнинг $p = \gamma(t)$ нуқтада тезлик вектори бўлса, у ҳолда $d_p \varphi(u)$ вектор $\varphi \circ \gamma$ йўлнинг t да тезлик вектори бўлади (3-расм),

$$d_p \varphi(\gamma'(t)) = (\varphi \circ \gamma)'(t).$$

Юқоридаги формулалардан кўринадик, ихтиёрий $u, v \in T_p N, a \in \mathbb{R}$ да $d\varphi(u + v) = d\varphi(u) + d\varphi(v), d\varphi(au) = a d\varphi(u)$, яъни $\varphi : N \rightarrow M$ силлик акслантиришнинг дифференциали $d_p \varphi$ чизиқли акслантириш ва шунинг учун, хусусий ҳолларда силлик акслантириш бўлади,

$$d_p \varphi : T_p N \rightarrow T_{\varphi(p)} M$$

Табиий қоида бўйича аниқланган $d_p \varphi(p, u) = (\varphi(p), d_p \varphi(u))$ уринма қатламаларни акслантириш $d\varphi : TN \rightarrow TM$ ни қараймиз. Бу акслантириш умуман олганда чизиқли эмас, балки қатламда чизиқли.

Ботириш, жойлаштириш, субмерсия.

Агар ҳар бир $p \in N$ нуқтада $d_p \varphi$ чизиқли акслантириш ядроси фақат нолдан иборат бўлса, яъни $d_p \varphi : T_p N \rightarrow T_{\varphi(p)} M$ нинг қисм фазосига чизиқли изоморф акслантирса, у ҳолда φ

акслантириши N кўпхилликни M га (силлик) ботириши дейилади. Табиийки, бунда $k = \dim N \leq \dim M = n$ бўлиши зарур.

N да p нуқтани ўз ичига олувчи (V, g) картанинг локал координаталари x^1, \dots, x^k ва M да $\varphi(p)$ нуқтани ўз ичига олувчи (U, h) картанинг y^1, \dots, y^n локал координаталарида φ акслантириши силлик функциялар билан берилади

$$y^i = y^i(x^1, \dots, x^k); \quad i = 1, \dots, n.$$

φ акслантириши ботириши бўлиши учун $k \leq n$ бўлиб, ҳар бир $p \in N$ нуқтада Якоби матрицаси $\left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right)_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, k}$ нинг ранги k га тенг бўлиши, яъни максимал бўлиши зарур ва етарлидир.

Якоби матрицасининг ранги локал координаталарни қандай танлашга боғлиқ эмас ва φ акслантиришининг p нуқтадаги дифференциали $d\varphi$ нинг ранги дейилади.

Агар $\varphi : N \rightarrow M$ акслантиришида N ўзининг образига диффеоморф бўлса, у ҳолда φ акслантириши (силлик) жойлаштириши дейилади. Бу ботиришининг хусусий ҳолидир.

Ихтиёрий ботириши локал жойлаштириши бўлади.

Агар $k > n$ да Якоби матрицасининг ранги ҳар бир нуқтада максимал бўлса, яъни n га тенг бўлса, у ҳолда φ акслантириши субмерсия дейилади.

Мисоллар. 1. Силлик акслантириши $\pi : TM^{2n} \rightarrow M^n$ проекциялаш TM даги ҳар бир (p, u) (бунда $p \in M, u \in T_p M$) векторга унинг нуқтасини $\pi(p, u) = p$ мос қўяди. Бу акслантиришининг ҳар бир нуқтада ранги максимал, яъни n га тенг бўлгани учун субмерсия бўлади.

2. $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^1$ акслантириши қуйидаги қоида бўйича аниқланади: $\varphi(x, y) = x$, унинг ранги 1 га тенг субмерсия бўлади. Унинг $\varphi^{-1}(c) = 0$ қатламлари тўғри чизиқлар бўлади.

4.2. Эгрилиги номанфий кўпхилликлар геометрияси.

Кўпхилликларда вектор майдонлар.

M силлик кўпхилликнинг A қисм тўпламида X вектор майдон берилган дейилади, агар ҳар бир $x \in A$ нуқтага бирор $X_x \in T_x M$ вектор мос қўйилса.

X вектор майдонни $x \mapsto X_x$ акслантириш сифатида қараш учун барча X_x векторлар ётувчи ягона тўпламни кўрсатиш лозим, чунки турли нуқталарга турли уринма фазолардан векторлар

мос қўйилади. Бундай тўпلام Уринма қатлама ТМ ҳисобланади. Шунинг учун вектор майдонни қуйидаги акслантириш каби аниқлаш қулайдир:

$$X : A \rightarrow TM, \text{ бунда } A \subset M$$

қўшимча хоссани қаноатлантирувчи : итхтиёрий $x \in A$ нукта учун проекция $\pi(X_x) = x$, яъни $\pi \circ X = id_A$. Бундай акслантиришлар ТМ нинг кесимлари ҳам дейилади.

$G \subset M$ соҳада берилган X вектор майдон силлиқ дейилади, агар уч тенгкучли тасдиқлардан бири бажарилса:

а) $X : A \rightarrow TM$ акслантириш сифатида қаралаётган вектор майдон $A = G$ силлиқ кўпхилликни ТМ силлиқ кўпхилликка акслантирса, силлиқ бўлади;

б) M даги G соҳада берилан ихтиёрий силлиқ функция f учун $(Xf)(x) = X_x f$ тенглик билан аниқланувчи Xf функция силлиқ бўлса;

в) ҳар бир $x \in G$ учун (U, h) карта топилсаки, унда X_x векторнинг координатлари X_x^i ларх нуктанинг x^1, \dots, x^n координаталарига силлиқ боғлиқ бўлса.

$A \subset M$ тўпلامда аниқланган X вектор майдон силлиқ дейилади, агар камида битта $G \supset A$ очик тўпلامда аниқланган силлиқ Y вектор майдон мавжуд бўлиб, A тўпلامда X вектор майдон билан устма-уст тушади, $Y|_A = X$. Бундай Y майдон X вектор майдоннинг кенгайтмаси дейилади.

Вектор майдонлар фазоси. Битта $A \subset M$ тўпلامда берилган X, Y вектор майдонларни қуйидаги қоида бўйича қўшиш ва сонга кўпайтириш мумкин: $(aX + bY)_x = aX_x + bY_x$, бунда $a, b \in \mathbf{R}$. Бу амалларга нисбатан A даги вектор майдонлар чизиқли фазо ташкил этади. Бундан ташқари, $A \subset M$ даги вектор майдонларни функцияга қуйидагича кўпайтириш мумкин:

$$f(X)_x = f(x) X_x$$

M даги силлиқ вектор майдонлар чизиқли фазосини $(\mathbf{R}$ устида) χ билан белгилаймиз.

Ли қавси

V вектор фазо унда аниқланган $[,]$ (Ли қавси деб номланувчи) бинар амал билан Ли алгебраси дейилади, агар ихтиёрий $u, v, w \in V$ ва $a, b \in \mathbf{R}$ учун қуйидаги аксиомалар бажарилса:

$$1) \text{ косо симметриклик } [u, v] = -[v, u];$$

$$2) \text{ чизиқлилиқ } [au + bv, w] = a[u, w] + b[v, w];$$

$$3) \text{ Якоби айнияти } [[u, v], w] + [[v, w], u] + [[w, u], v] = 0.$$

Таъкидлаб ўтамазки, ассоциативлик талаб этилмайди.

Ли алгебрасига мисол қилиб \mathbf{R}^3 евклид вектор фазосидаги оддий вектор кўпайтмани келтириш мумкин.

$G \subset M$ соҳанинг $x \in G$ нуктасидаги ҳар икки силлиқ вектор майдонга силлиқ функцияларга қуйидаги қоида бўйича таъсир этувчи $[X, Y]_x$ функционал мос қўйилади

$$[X, Y]_x f = X_x(Yf) - Y_x(Xf)$$

Бу функционал ҳам вектор бўлади. Бу функционалнилокал координаталарда қарасак,

$$\begin{aligned} [X, Y]_x f &= X_x(Y^i \partial_i f) - Y_x(X^i \partial_i f) = \\ &= X_x^j (\partial_j Y^i) \partial_i f + X_x^j Y_x^i \partial_j \partial_i f - Y_x^j (\partial_j X^i) \partial_i f - Y_x^j X_x^i \partial_j \partial_i f = \quad \text{Худди} \\ &= (X^j \partial_j Y^i - Y^j \partial_j X^i)_x \partial_i f, \end{aligned}$$

шундай, M да (ёки соҳада) $X, Y \in \mathfrak{X}$ ҳар икки вектор майдонларга $[X, Y]$ янги вектор майдонни мос қўямиз. У X ва Y вектор майдонларнинг Ли қавси дейилади.

Агар X, Y вектор майдонлар C^k –силлик бўлса, у ҳолда уларнинг Ли қавси C^{k-1} – силлик вектор майдон бўлади.

Ли қавси хоссалари:

а. Ихтиёрий локал координаталар системасининг базис майдонлари учун

$$[d_i, d_j] = 0.$$

Ҳақиқатдан ҳам $X = d_j$ вектор майдон $X^i = \delta_j^i$ локал координаталарга эга, бунда δ_j^i — Кронекер символи. Шунинг учун барча $d^i / dx^k = 0$ ва $[d_i, d_j] = 0$. ■

б. Ихтиёрий $X, Y \in \mathfrak{X}$ ва φ силлик функциялар учун

$$[X, \varphi Y]_x = \varphi(x)[X, Y]_x + (X_x \varphi) Y_x.$$

в. Агар N — M га жойлаштирилган қисм кўпхиллик ва X, Y — N да силлик вектор майдонлар, \tilde{X}, \tilde{Y} , — уларнинг N қисм кўпхилликнинг M даги атрофида кенгайтмаси бўлса, у ҳолда $x \in N$ да

$$[X, Y]_x = [\tilde{X}, \tilde{Y}]_x.$$

Риман кўпхиллиги.

Агар ҳар бир $T_x M$ уринма фазода x нуқтага силлик боғлиқ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ скаляр кўпайтма аниқланган бўлса, M кўпхилликда риман структураси берилган дейилади, яъни M даги ихтиёрий X, Y силлик вектор майдонлар учун $\langle X, Y \rangle$ M да силлик функция бўлади.

Боғланишли силлик M кўпхилликда риман структураси берилган бўлса, M риман кўпхиллиги дейилади.

(U, h) локал координаталарда M даги ихтиёрий $x \in h(U)$ нуқта учун қуйидагини ҳосил қиламиз: $\langle X, Y \rangle_x = \langle X^i \partial_i, Y^j \partial_j \rangle_x = X_x^i Y_x^j \langle \partial_i, \partial_j \rangle_x = g_{ij}(x) X_x^i Y_x^j$, бунда d_i — x нуқтанинг (U, h) координаталарининг базис $g_{ij}(x)$ билан эса $\langle \partial_i, \partial_j \rangle_x$ белгиланган. $g_{ij}(x)$ қиймат M риман кўпхиллигининг x нуқтасининг (U, h) координаталарининг „метрик тензори“ коэффициентлари дейилади.

$\langle X, Y \rangle$ функция M да ихтиёрий X, Y силлиқ вектор майдонлар учун силлиқ бўлиши учун барча g_{ij} функциялар силлиқ бўлиши зарур ва етарлидир, бу (x^1, \dots, x^n) локал координаталардаги $\bar{g}_{ij} = g_{ij} \circ h$ функция билан тенг кучлидир.

Икки M_1, M_2 риман кўпхилликлари изометрик дейилади, агар улар ўртасида ихтиёрий $x \in M_1$ нукта ва ихтиёрий $u, v \in T_x M$ векторлар учун шундай диффеоморфизм $\phi: M_1 \rightarrow M_2$ ўрнатиш мумкин бўлсин: $\langle u, v \rangle_{M_1} = \langle d\phi(u), d\phi(v) \rangle_{M_2}$

ϕ акслантиришнинг ўзи эса изометрия дейилади.

Агар ϕ — изометрия, (U, h) — M_1 даги карта, $(U, \phi \circ h)$ — эса M_2 даги карта бўлса, у холда \bar{g}_{ij} функциянинг қийматлари x^1, \dots, x^n локал координаталарда бир хил бўлади.

Мисол. Риман кўпхиллигига энг содда мисол нуқтавий евклид фазосидир.

$\gamma: [a, b] \rightarrow M$ да бўлакли-силлиқ йўл бўлсин.

Ҳар бир $t \in [a, b]$ учун $\gamma'(t)$ тезлик вектори аниқланган. γ' вектор $|\gamma'| = \sqrt{\langle \gamma', \gamma' \rangle}$ узунликка эга. γ йўл узунлиги қуйидагича аниқланади:

$$s(\gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{\langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle} dt.$$

M —

риман кўпхиллиги бўлсин. Таърифга кўра у боғланишли. Боғланишли силлиқ кўпхилликнинг ихтиёрий икки нуқтасини силлиқ йўл билан туташтириш мумкин. $p, q \in M$ нуқталар орасидаги масофа деб $\rho(p, q) = \inf s(\gamma)$ сонга айтилади, бунда p ва q ни туташтирувчи бўлакли-силлиқ γ йўлларнинг \inf олинади.

Теорема 4. $\rho(p, q) = \inf s(\gamma)$ тенглик билан аниқланган ρ функция M да метрика бўлади, яъни

- 1) $\rho(p, q) > 0$,
- 2) $\rho(p, q) = \rho(q, p)$,
- 3) $\rho(p, l) + \rho(l, q) > \rho(p, q)$,
- 4) $\rho(p, p) = 0$,
- 5) агар $p \neq q$ бўлса, у холда $\rho(p, q) > 0$ бўлади.

ρ функцияга риман метрикаси дейилади.

N риман кўпхиллигини M риман кўпхиллигига ботириш $\phi: N \rightarrow M$ изометрик дейилади, агар если ϕ ботириш индуцирлаган скаляр кўпайтма N даги билан устма-уст тушади, яъни ихтиёрий $x \in N$ нукта ва $u, v \in T_x N$ учун $\langle d_x \phi(u), d_x \phi(v) \rangle_M = \langle u, v \rangle_N$ бажарилса.

4.3. Замонавий геометрия бўйича халқаро конференцияларда таклиф этилган

муаммолар ва уларнинг ечимларининг таҳлили

Ковариантдифференциаллаш.

M — силлиқ кўпхиллик ва $x \in M$ бўлсин. ∇ қоида ҳар бир $u \in T_x M$ вектор ва x нукта атрофида берилган X силлиқ вектор майдонга бирор $\nabla_u X \in T_x M$ векторни мос қўйса, x нуктада ковариант дифференциаллаш дейилади, агар ихтиёрий $u, v \in T_x M$, $a, b \in \mathbb{R}$ лар, X, Y силлиқ вектор майдонлар ва f силлиқ функциялар учун x нукта атрофида қўйидаги тенглик бажарилса:

$$\begin{aligned}\nabla_{au+bv} X &= a\nabla_u X + b\nabla_v X, \\ \nabla_u (aX + bY) &= a\nabla_u X + b\nabla_u Y, \\ \nabla_u (fX) &= (uf)_x X + f(x)\nabla_u X\end{aligned}$$

Бу ерда, одатдагидек, uf - f функциянинг u вектор йўналишидаги ҳосиласи, X_x — эса X майдоннинг x нуктадаги қиймати. $\nabla_u X$ вектор X вектор майдоннинг u вектор йўналишидаги ковариант ҳосиласи дейилади.

$G \subset M$ соҳанинг барча нукталарида берилган ковариант дифференциаллаш ∇ ҳар жуфт X, Y силлиқ вектор майдонларга G да янги $\nabla_X Y$ вектор майдонни мос қўяди. Таърифга кўра бу майдоннинг $x \in G$ нуктадаги қиймати X_x векторга боғлиқ ва X майдоннинг бошқа нукталардаги қийматига боғлиқ эмас. Агар $\nabla_X Y$ майдон ихтиёрий силлиқ X и Y майдонлар учун силлиқ бўлса, u холда ковариант дифференциаллаш ∇ силлиқ дейилади. Силлиқ ковариант дифференциаллаш чизиқли боғлиқлик ҳам дейилади.

Л е м м а. Агар $u \in T_p M$ ва X, \tilde{X} вектор майдонлар p нуктанинг бирор атрофида устма-уст тушса, u холда p нуктада $\nabla_u X = \nabla_u \tilde{X}$.

Леви-Чивита боғланиши.

1. Т е о р е м а. Ихтиёрий M риман кўпхиллигида симметрик риман боғланиши мавжуд ва u ягонадир. u M даги Леви-Чивита боғланиши дейилади.

2. И с б о т. Ягоналиги. ∇ — шундай боғланиш бўлсин. Риччи айниятини X, Y, Z майдонларни циклик алмаштириб уч марта ёзамиз:

$$\begin{aligned}X\langle Y, Z \rangle - \langle \nabla_X Y, Z \rangle - \langle Y, \nabla_X Z \rangle &= 0, \\ Y\langle Z, X \rangle - \langle \nabla_Y Z, X \rangle - \langle Z, \nabla_Y X \rangle &= 0, \\ Z\langle X, Y \rangle - \langle \nabla_Z X, Y \rangle - \langle X, \nabla_Z Y \rangle &= 0.\end{aligned}\tag{4}$$

Дастлабки икки тенгликни қўшиб, учинчисини айирамиз.

$$\begin{aligned}X\langle Y, Z \rangle - \langle \nabla_X Y, Z \rangle - \langle Y, \nabla_X Z \rangle + Y\langle Z, X \rangle - \langle \nabla_Y Z, X \rangle - \langle Z, \nabla_Y X \rangle - Z\langle X, Y \rangle + \langle \nabla_Z X, Y \rangle + \\ + \langle X, \nabla_Z Y \rangle = 0.\end{aligned}\tag{4*}$$

Боғланиш симметрик эканидан:

$$\nabla_x Y - \nabla_y X = [X, Y], \nabla_x Z - \nabla_z X = [X, Z], \nabla_y Z - \nabla_z Y = [Y, Z].$$

(4*) тенгликнинг чап томонига $\langle \nabla_x Y, Z \rangle$ ҳадни қўшиб, айирсак қуйидагига эга бўламиз:

$$2\langle \nabla_x Y, Z \rangle = \{X\langle Y, Z \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle\} + \{Y\langle Z, X \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle\} - \{Z\langle X, Y \rangle - \langle Z, [X, Y] \rangle\}. \quad (5)$$

бўларни ҳисоблаб, Кошуль формуласи деб номланувчи (5) формулани ҳосил қиламиз: (5) нинг ўнг томони ∇ га боғлиқ эмас. Шунинг учун амалда иккита шундай ∇ и ∇' боғланиш мавжуд бўлади, ихтиёрий $x \in M$ нуктада қуйидаги тенглик бажарилади:

$$\langle \nabla_{x_x} Y, Z_x \rangle = \langle \nabla'_{x_x} Y, Z_x \rangle$$

ихтиёрий Z майдон учун бажарилишидан, яъни

$$\langle \nabla_{x_x} Y - \nabla'_{x_x} Y, Z_x \rangle = 0$$

Натижада, $(\nabla_{x_x} Y)_x = (\nabla'_{x_x} Y)_x$. Бу тенглик ихтиёрий нуктада ва ихтиёрий X, Y майдонлар учун ўринли. Демак, $\nabla = \nabla'$. ■

Ҳисоб-китобни осонлаштириш учун аввал исботланганлардан фойдаланамиз. M да ихтиёрий симметрик $\tilde{\nabla}$ боғланиш киритамиз. (4) нинг ҳар бир тенглигининг чап томони талаб қилинган хоссаларни қаноатлантиради, 8.1.3 леммага кўра, (5) тенгликнинг ўнг ва чап томонлари айирмаси ҳам X, Y, Z вектор майдонларнинг x нуктадаги қийматига боғлиқ. Лекин (5) нинг чап томони, яъни $2\langle \tilde{\nabla}_{x_x} Y, Z_x \rangle$, ва худди шундай ўнг томони ҳам Z майдоннинг x нуктадан бошқа нуктадаги қийматига боғлиқ эмас.

Энди аниқки, (5) нинг ўнг томони X, Y майдонларнинг фиксирланган қийматида $x \in M$ нуктада фақат $Z_x \in T_x M$ га боғлиқ бўлса, у ҳолда (5) ўнг томони $T_x M$ да L чизиқли функционални аниқлайди.

Шунинг учун барча $Z_x \in T_x M$ учун $\langle w, Z_x \rangle = L(Z_x)$ бўладиган (X, Y майдонларга боғлиқ) $w \in T_x M$ мавжуд бўлади.

Таърифга кўра $\nabla_{x_x} Y = w/2$ деб олсак, Леви-Чивита боғланишини ҳосил қиламиз. Ҳақиқатдан ҳам, киритилган ∇ амал 7.2 даги (6) нинг дастлабки икки шартини қаноатлантиради. Қурилишига кўра ∇ ихтиёрий X, Y, Z майдонлар учун (5) муносабатни қаноатлантиради. (5) ни X, Y, Z ва X, Z, Y учун қўлласак ва натижаларни қўшсак, ∇ амал Риччи (1) айниятини қаноатлантиришига амин бўламиз:

$$\begin{aligned} 2\langle \nabla_x Y, Z \rangle + 2\langle \nabla_x Z, Y \rangle &= \{X\langle Y, Z \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle\} + \{Y\langle Z, X \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle\} - \{Z\langle X, Y \rangle - \langle Z, [X, Y] \rangle\} \\ &+ \{X\langle Z, Y \rangle - \langle Z, [X, Y] \rangle\} + \{Z\langle Y, X \rangle - \langle X, [Z, Y] \rangle\} - \{Y\langle X, Z \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle\}. \\ \Rightarrow 2\langle \nabla_x Y, Z \rangle + 2\langle \nabla_x Z, Y \rangle &= 2X\langle Y, Z \rangle \end{aligned}$$

(1) ни ихтиёрий X, fY, Z майдонлар учун қўлласак,

$$X \langle fY, Z \rangle_x = \langle \nabla_{X_x} fY, Z_x \rangle + \langle f(x)Y_x, \nabla_{X_x} Z \rangle = f(x) \langle \nabla_{X_x} Y, Z_x \rangle + X(f) \langle Y_x, Z_x \rangle + \langle f(x)Y_x, \nabla_{X_x} Z \rangle$$

$$\Rightarrow \langle (Xf) \cdot Y, Z \rangle + f \cdot \langle \nabla_X Y, Z \rangle = \langle \nabla_X (fY), Z \rangle$$

га эга бўламиз.

Бундан, Z майдоннинг ихтиёрийлигидан келиб чиқиб, қуйидагига эга бўламиз

$$\nabla_X (fY) = (Xf) \cdot Y + f \cdot \nabla_X Y,$$

бу эса 7.2 даги (6) нинг учинчи шарти бажарилгани билдиради ва ∇ — боғланиш эканини исботлайди. (5) ни X, Y, Z ва Y, X, Z учликларга қўллаб, натижаларни айирсак, қуйидагига эга бўламиз:

$$2 \langle \nabla_X Y, Z \rangle - 2 \langle \nabla_Y X, Z \rangle = \{X \langle Y, Z \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle\} + \{Y \langle Z, X \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle\} - \{Z \langle X, Y \rangle - \langle Z, [X, Y] \rangle\} - (\{Y \langle X, Z \rangle - \langle X, [Y, Z] \rangle\} + \{X \langle Z, Y \rangle - \langle Y, [X, Z] \rangle\} - \{Z \langle Y, X \rangle - \langle Z, [Y, X] \rangle\})$$

$$\langle \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y], Z \rangle = 0.$$

Бу $\langle \nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y] \rangle$ эканини кўрсатади, яъни киритилган боғланиш симметриклигини кўрсатади. ■

(2) Риччи айнияти локал координаталарда қуйидаги тенгламалар системасига тенг кучли

$$\partial_i g_{jk} - \langle \nabla_{\partial_i} \partial_j, \partial_k \rangle - \langle \partial_j, \nabla_{\partial_i} \partial_k \rangle = 0; \quad i, j, k=1, \dots, n, \quad (6)$$

ёки

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma_{ij}^s \partial_s, \quad \langle \partial_s, \partial_k \rangle = g_{sk}. \quad (8)$$

эканини ҳисобга олсак қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\partial_i g_{jk} - \Gamma_{ij}^s g_{sk} - \Gamma_{ik}^s g_{sj} = 0 \quad (7)$$

Ҳақиқатан, (6) нинг ҳар бир тенгламаси $\partial_i, \partial_j, \partial_k$ базис майдонларга қўлланган (2) Риччи айниятини беради, шунинг учун (6) тенгликлар (2) дан келиб чиқади. (2) ни (6) дан келтириб чиқариш учун, воспомним, 8.1.3 га кўра (2) нинг чап томонининг қиймати ҳар бир $x \in M$ нуктада фақат X, Y, Z вектор майдонларнинг шу нуктадаги қийматлари X_x, Y_x, Z_x га боғлиқ бўлади. Шунинг учун ихтиёрий X, Y, Z майдонлар учун (2) нинг чап томонини мумкин бўлган барча базис майдонлар учлиги учун аналогик ифодаларнинг чизиқли комбинацияси кўринишида ифодалаш мумкин. Лекин улар учун (6) га кўра бу ифодалар нолга тенг.

Локал координаталарда $\partial_i, \partial_j, \partial_k$, базис майдонлар учун (5) тенглик қуйидаги кўринишни олади:

$$2\Gamma_{ij}^s g_{sk} = \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \quad (9)$$

i, j фиксирланганда (9) тенгламалар системасидан $s = 1, \dots, n$ да Кристоффел символларини аниқ топиш мумкин

$$\Gamma_{ij}^s = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right) g^{sk}, \quad (10)$$

бунда (g^{sk}) — матрица, (g_{sk}) га тескари матрица.

Лекин ҳар бир симметрик боғланиш бирор риман метрикаси учун Леви-Чивита боғланиши бўлавермайди.

Назорат саволлари:

2. Дифференциал 1-формалар. Функция дифференциали – дифференциал 1-форма.
3. Функция градиенти ва функция дифференциали.
4. Сиртларнинг биринчи ва иккинчи квадратик формалари – дифференциал формалар.
5. Риман кўпхилликлари таърифи ва мисоллар. Ковариант дифференциал ва Кристоффел символлари.
6. Симметрик боғланишлик. Риман ва Леви – Чивита боғланишлиги.
7. Акслантириш бўйлаб вектор майдон. Йўл бўйлаб ковариант дифференциаллаш. Параллел вектор майдонлар.
8. Параллел кўчириш ва геодезик чизиқлар. Геодезик чизиқларнинг мавжудлиги.
9. Экспоненциал ва геодезик акслантиришлар.
10. Экспоненциал акслантиришларнинг хосслари. Геодезик акслантиришларнинг хосслари.
11. Гаусс леммаси. Шарлар ва қисқа чизиқлар.
12. Хопф-Ринов теоремаси.
13. Ёпиқ геодезик чизиқлар. Берже леммаси.
14. Эгрилик тензори ва унинг алгебраик хоссалари.
15. Риман эгрилиги. Секцион эгрилик. Эгрилиги ўзгармас фазолар.
16. Риччи эгрилиги ва скаляр эгрилик. Локал изометриялар.
17. Риман субмерсиялари ва О'Нейл формулалари.
18. Қисм кўпхилликлар. Индуцирланган боғланишлик. Иккинчи асосий форма.

Ёпиқ тестлар

Савол	Жавоб
V вектор фазо Ли алгебраси дейилиши учун нечта аксиома ўринли?	4
$k > n$ да Якоби матрицасининг ранги ҳар бир нуктада n га тенг бўлса, u холда	акслантириш субмерсия дейилади
Икки силлиқ кўпхилликни ўзаро бир қийматли икки томонлама силлиқ акслантириш нима деб аталади?	диффеоморфизм
Ихтиёрий ботириш	локал жойлаштириш бўлади


Фойдаланилган адабиётлар:

1. Izu Vaisman Analytical Geometry World Scientific 1997
2. Narmanov A. Ya. Analitik geometriya. T. O'zbekiston Respublikasi faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2008 y.
3. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр 1. М., Наука, 1983.
4. Вахвалов S.V., Modenov P.S., Parxomenko A.S. Analitik geometriyadan masalalar to'plami T. Universitet, 2006.
5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия М. Наука, 1981.
6. Сборник задач по дифференциальной геометрии. Под ред. Феденко А.С. М., 1979.

VI. КЕЙСЛАР БАНКИ

1-масала. xOz текислигида Oz ўқини кесмайдиган $x = \varphi(u)$, $z = \psi(u)$ чизик берилган. Бу чизикни Oz ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган айланма сиртнинг тенгламаси тузилсин.

Ечиш. Умумийликка зиён етказмасдан берилган $x = \varphi(u)$, $z = \psi(u)$ чизик учун $\varphi(u) > 0$ шарт ўринли деб фараз қиламиз. Эгри чизикли координаталар сифатида $\angle XOP = v$ бурчакни ва берилган чизикнинг u параметрини оламиз (16-расм).



Чизик устидаги ҳар бир $L(u)$ нукта маркази Oz ўқида ётган ва радиуси $x = \varphi(u)$ га тенг бўлган айланани чизади: $MA = OP = \varphi(u)$.

Координат чизиклари: $u = const$ – параллеллар (айланалар), $v = const$ – меридианлар бўлади. Сиртнинг вектор тенгламаси:


$$\vec{r} = \varphi(u) \cos v \vec{i} + \varphi(u) \sin v \vec{j} + \psi(u) \vec{k},$$

Координат кўринишдаги тенгламалари эса:

$$x = \varphi(u) \cos v, \quad y = \varphi(u) \sin v, \quad z = \psi(u).$$

Берилган чизик билан айланма сиртнинг учинчи координатаси бир хилдир, чунки чизик Oz ўқ атрофида айланмоқда.

2-масала. Oz ўққа перпендикуляр AB тўғри чизикнинг шу ўқ атропоида айланишидан ва шунингдек, айланиш бурчагига пропорционал тезлик билан Oz бўйлаб силжишидан ҳосил бўлган сирт тўғри геликоид дейилади. Тўғри геликоид тенгламасини тузинг.



Ечиш. Координаталарни қуйидагча танлаймиз (17-расм):

$$MA = u, \angle XOP = v$$

Шартга кўра $OA = av$, бунда $a = const$. Координата чизиклари: $u = const$ - винт чизиклар, $v = const$ - ясовчилар (ҳаракатланувчи тўғри чизиклар)дан иборат бўлади.

1-масаладан фойдалб геликоиднинг вектор тенгламаси

$$\vec{r} = u \cos v \vec{i} + u \sin v \vec{j} + av \vec{k},$$

параметрик тенгламалари эса

$$x = u \cos v, y = u \sin v, z = av$$

кўринишда бўлишини ҳосил қиламиз.

2-кейс

1. Қуйидаги сфера марказининг координаталари ва радиуси аниқлансин.

1) $x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 4y - 6z = 0,$

2) $x^2 + y^2 + z^2 + 8x = 0,$

3) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 22 = 0,$

4) $x^2 + y^2 + z^2 - 6z - 7 = 0.$

2. Қуйидаги айлана марказининг координаталари ва радиуси аниқлансин.

$x^2 + y^2 + z^2 - 12x + 4y - 6z + 24 = 0, 2x + 2y + z + 1 = 0.$

3. Қуйидаги айлананинг маркази аниқлансин.

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2, Ax + By + Cz + D = 0$$

4. $A(3;0;4), B(3;5;0), C(3;4;4), D(5;4;6)$ нукталарнинг

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 49$$

сферага нисбатан вазияти аниқлансин.

5. Қуйидаги текистликларнинг ушбу

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 25$$

сферага нисбатан вазияти аниқлансин.

1) $2x + 2y + z + 2 = 0,$

2) $2x + 2y + z + 5 = 0,$

3) $2x + 2y + z + 11 = 0.$

6. $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$

сферанинг ушбу

$$x = x_0 + lt, y = y_0 + mt, z = z_0 + nt$$

тўғричиликка қўшма бўлган диаметрлик текислигининг тенгламаси тузилсин.

7. Ушбу

$$(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z+1)^2 = 25$$

Сферанинг $M(3,5,1)$ нуктада тенг кичик бўлинадиган ватарларининг геометрик ўрнитопилсин.

8. $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$

сферанинг $S(x_0$

y_0

$z_0)$ нуктадан ўтувчи ватарлари ўрталарининг геометрик ўрнитопилсин.

9. $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$

сферанинг (-

$R, 0, 0)$ нуктадан ўтувчи ватарлари ўрталарининг геометрик ўрнитопилсин.

10. $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$

сферанинг $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктадан ўтувчи ватарлари ўрталарининг геометрик ўрнитопилсин.

11.

$S(x_0$

y_0

$z_0)$ нуктадан $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ сферага ўтказилган уринматекиклик кататуширилган перпендикуляр осларининг геометрик ўрнитопилсин.

12. $(x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 49$ сферага M

(7,

-1,

5) нуктада ўтказилган уринматекиклик тенгламаси тузилсин.

13. $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ сферага M_0

(x_0

y_0

$z_0)$ нуктада ўтказилган уринматекиклик тенгламаси тузилсин.

14. $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ сферага M_0

(x_0

y_0

$z_0)$ нуктада ўтказилган уринматекиклик тенгламаси тузилсин.

15. $x^2 + y^2 = 9,$

$z = 0$

va

$x^2 + y^2 = 25,$

$z = 2$ айланалардан ўтувчи сфератенгламаси тузилсин.

16. Координаталарбошиданва $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=49$, $2x+2y-z+4=0$ айланаданўтадигансфератенгламаситузилсин.

17. $(1, -2, 0)$ нуктаданва $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=49$, $2x+2y-z+4=0$ айланаданўтувчисфератенгламаситузилсин.

3-кейс

18. Тўғричизикларнингбоғлами S_1 вабубоғламдагитўғричизикларгаперпендикулярбўлгантекисликларбоғлами S_2 берилган. S_1 боғламинингтўғричизикларива S_2 боғламнингтекисликларикесишади.

Кесишнукталарининггеометрикўрнитопилсин.

S_1 боғламтекисликларибилан S_2 боғламнингшутекисликларгаперпендикулярбўлган тўғричизикларнингкесишганнукталариданҳосилбўлгангеометрикўрниаввалгигеометрикўрнинингўзиданиборатлигиисботлансин.

19.

Қандайзарурийваестарлишартбажарилганда $Ax+By+Cz+D=0$ текислик $x^2+y^2+z^2=R^2$ сферагауринади?

Бушартбажарилгандебуринишнуктасинингкоординаталаритопилсин.

20.

Ўқлари координатаўқлари биланустма-усттушувчи,

Oxz ва Ouz текисликларнимосравишда $u=0$, $\frac{x^2}{25} + \frac{z^2}{16} = 1$, $x=0$ $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16}$

$=1$ чизикларбўйлабкесибўтувчиэллипсоидтенгламаситузилсин.

4-кейс

21. Ўқлари координатаўқлариданиборат, $z=0$, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ эллипсва $M(1, 2, \sqrt{23})$

нуктаорқалиўтувчиэллипсоидтенгламаситузилсин.

22 Ўқлари координатаўқлариданиборатбўлганва $x^2+y^2+z^2=9$, $z=x$

айланаданҳамда $M(3, 1, 1)$ нуктаданўтганэллипсоидтенгламаситузилсин.

23.

$$\frac{x^2}{27} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{75}$$

$=1$ эллипсоиднинг $M(3, 2, 5)$ нуктасидагиуринматекислигитенгламаситузилсин.

24. $Ax+By+Cz+D=0$ текисликнинг $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоидгауринишиучунзарурийваатарлишарттопилсин.

25. $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликнинг $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоидбиланкесишишиучунқандайшартнингбажарилишизарурваатарли?

26. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоиднингмарказиданунингуруинматекислигигатушурилганперпендикуларларларасосларининггеометрикўрнитопилсин.

27. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоиднинг $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликбиланкесишишчизифинингмарказитопилсин.

28. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ эллипсоиднинг $M(x_1, y_1,$

$z_1)$ нуктадатенгиккигабўлинадиганватарларининггеометрикўрнитопилсин.

29. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{4} = 1$ эллипсоиднинг $a(2, 1, 2)$ векторгапараллел,

ватарларинитенгиккигабўлувчидиаметралтекислигинингтенгламаситузилсин.

30. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ эллипсоиднинг $P(x_0, y_0,$

$z_0)$ нуктаданўтувчиватариўрталарининггеометрикўрнианиқлансин.

31. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоидбилан $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ сферауринматекисликларинингкесишишиданҳосилқилинганэллипсмарказларининггеометрикўрнианиқлансин.

5-кейс

32. Ўқларикоординатаўқларигапараллел, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоидбилан $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликнингкесишишчизифиданўтувчиэллипсоидтенгламаси

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 + \lambda (Ax + By + Cz + D)$ кўринишдабўлишиисботлансин.

33. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 - \lambda$

$(Ax+By+Cz+D)=0$ тенглама билананиқланган эллипсоидлар марказларининг геометрик ўрнитопилсин (λ – ихтиёрий қийматларни қабул қилади).

34. Иккита $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$

$= 1 (a > b)$ эллипсоид қандай чирик бўйлаб кесилди?

35. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1,$ $(a > b > c)$

эллипсоидни айланалар бўйича кесиб ўтадиган ҳамма текикликлар тенгламаси тузилсин.

36. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

эллипсоиднинг марказидан барчануқталарида унга ўтказилган уринма текикликларга чабулган масофалар d га тенг бўладиган нуқталарнинг геометрик ўрнитопилсин.

37. 36-масалани $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$ эллипсоиди учун чинг.

38. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

$(a > b > c)$ эллипсоиддо иррадий кесимлари марказларидан тузилган нуқталарнинг геометрик ўрнитопилсин.

ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
аналитик геометрия	иккинчи тартибли чизиқлар ва сиртларни ўрганувчи фан	the subject which studies second order lines and second order surfaces
иккинчи тартибли чизиқнинг маркази	иккинчи тартибли чизиқнинг симметрия маркази	symmetry center of the second order line
иккинчи тартибли чизиқнинг диаметри	параллел ватарлар ўрталаридан ўтувчи тўғри чизиқ	The line which through centers of parallel chords
конус кесимлар	конусни текислик билан кесиш натижасида ҳосил бўлган иккинчи тартибли чизиқлар	Second order lines which are intersection of the cone and plane
дифференциал геометрия	дифференциалланувчи функциялар ёрдамида параметрланган чизиқлар ва сиртларни ўрганувчи фандир	the subject which studies curves and surfaces, parametrized by differentiable functions
элементар эгри чизиқ	очик интервалнинг топологик (гомеоморф) акслантиришдаги образи	The image of open segment under topological (homeomorf) mapping
сода эгри чизиқ	ўзига тегишли ҳар қандай нуктанинг бирорта атрофида элементар эгри чизиқ бўладиган боғланишли тўплам	Connected set which is a elementary curve in some neighborhood of any point
Топология	геометрик объектларнинг топологик хоссаларини ўрганувчи фандир	the subject which studies topological properties of geometric objects
Геодезик чизиқ	сиртларда евклид геометриясидаги тўғри чизиқларнинг аналогидир	It is analog of straight line of Euclidean geometry
Топологик хоссалар	геометрик фигураларнинг гомеоморф акслантиришда сақланувчи хоссаларидир	Properties of geometric figures which is preserved under homeomorf mappings
сиртнинг қалби (soul)	сиртнинг абсолют қаварик компакт қисм тўпландир	absolute convex compact subset of a surface

<p>сиртнинг йўналиш бўйича нормал эгрилиги</p>	<p>берилган йўналишга параллел ва сиртни тик кесувчи текислик билан кесиш ёрдамида ҳосил бўлган чизиқнинг эгрилиги</p>	<p>The curvature of a curve which is normal section</p>
<p>пуанкаре гипотезаси</p>	<p>компакт чегарасиз бир боғланишли уч ўлчамли сирт уч ўлчамли сферага гомеоморфдир</p>	<p>simply connected compact three-dimensional manifold without boundary is homeomorphic to the three-dimensional sphere</p>
<p>Г.Я.Перелман</p>	<p>Пуанкаре гипотезасини ҳал қилган Санкт-Петербурглик математик</p>	<p>Mathematician from Saint Petersburg who solved Puankare hypothesis</p>
<p>Громол-Чигер гипотезаси</p>	<p>ҳар қандай нонанфий эгриликли тўлиқ нокомпакт сирт ўз қалбининг нормал қатламасига диффеоморфдир</p>	<p>complete non-compact surface of negative curvature is diffeomorphic to the normal bundle of its soul</p>

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-ЖИЛД / Ш.М. Мирзиёев. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 592 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-ЖИЛД / Ш.М. Мирзиёев. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 400 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-ЖИЛД / Ш.М. Мирзиёев. – Т.: “Ўзбекистон”, 2018. – 592 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 488 б.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз – Т.: “Ўзбекистон”. 2017. – 592 б.

II. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июнь “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли Фармони.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февраль “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрель “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли Қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрь “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 май “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сон Фармони.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июнь “2019-2023 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4358-сонли Қарори.

14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 август “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли Фармони.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрь “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.

Ш. Махсус адабиётлар

16. Andrea Prosperetti, *Advanced Mathematics for Applications*, Cambridge University Press, 2011.

17. Bauer, H. *Measure and Integration Theory*, Berlin: de Gruyter, ISBN-13: 978-3110167191, 2001.

18. Bear, H.S. *A Primer of Lebesgue Integration*, San Diego: Academic Press, 2nd Edition, 2001.

19. Bobenko A.I. (Ed.) *Advances in Discrete Differential Geometry*//Springer, 2016. — 439 p. — (Mathematics). — ISBN: 3662504464

20. Bogachev, V. I. *Measure theory*, Berlin: Springer, 2006.

21. David Spencer “Gateway”, Students book, Macmillan 2012.

22. English for Specific Purposes. All Oxford editions. 2010. 204.

23. Evan M. Glazer, John W. McConnell *Real-Life Math: Everyday Use of Mathematical Concepts*//2013, ISBN-13: 978-0313319983

24. Georgii H.O. *Gibbs measures and phase transitions*. Berlin:de Gruyter, 657 p., 2011.

25. H.Q. Mitchell “Traveller” B1, B2, MM Publications. 2015. 183.

26. H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni “PIONEER”, B1, B2, MM Publications. 2015. 191.

27. I. M. Rikhsiboev and N. S. Mohamed, *Engineering Mathematics 2*, Malaysia, 2019.

28. Jim Libby, *Math for Real Life: Teaching Practical Uses for Algebra, Geometry and Trigonometry*// 2019, 234p. ISBN: 978-1476667492

29. Karl Berry, *The TEX Live Guide*—2020

30. Lindsay Clandfield and Kate Pickering “Global”, B2, Macmillan. 2013. 175.

31. Manfredo P. Do Carmo. Differential geometry of Curves and surface // Dover publications, Inc. Mineola, New York, 2016. – 529 pp.
32. Maple 15 user manual, Maplesoft, 2016, 462 p.
33. Margaret L. Lial, Thomas W. Hungerford, John P. Holcomb, Bernadette Mullins, Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences (11th Edition), Pearsonб 2018.
34. Rao, M. M. Random and Vector Measures, Series on Multivariate Analysis, 9, World Scientific, 2012.
35. Steve Taylor “Destination” Vocabulary and grammar”, Macmillan 2010.
36. Tao, Terence. An Introduction to Measure Theory. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 2019.
37. Weaver, Nik Measure Theory and Functional Analysis. World Scientific, 2013, 423 p.
38. Авилова Л.В., Болотюк В.А., Болотюк Л.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра// 2013. Издание: 1-е изд. 421 с.
39. Александров А.Д., Нецветаев Н.Ю. Геометрия, М.: Наука, 1990. – 672 с.
40. Белогуров А.Ю. Модернизация процесса подготовки педагога в контексте инновационного развития общества: Монография. — М.: МАКС Пресс, 2016. — 116 с. ISBN 978-5-317-05412-0.
41. Гулобод Қудратуллоҳ кизи, Р.Ишмухамедов, М.Нормухаммедова. Анъанавий ва ноанъанавий таълим. – Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази” нашриёти, 2019. 312 б.
42. Ибраймов А.Е. Масофавий ўқитишнинг дидактик тизими. методик қўлланма/ тузувчи. А.Е.Ибраймов. – Тошкент: “Lesson press”, 2020. 112 бет.
43. Ишмухамедов Р.Ж., М.Мирсолиева. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. – Т.: «Fan va texnologiya», 2014. 60 б.
44. Кирянов Д. Mathcad 15/Mathcad Prime 1.0. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 432 с.
45. Муслимов Н.Ава бошқалар. Инновацион таълим технологиялари. Ўқув-методик қўлланма. – Т.: “Sano-standart”, 2015. – 208 б.
46. Образование в цифровую эпоху: монография / Н. Ю. Игнатова; М-во образования и науки РФ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). – Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2017. – 128 с. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54216/1/978-5-9544-0083-0_2017.pdf

47. Олий таълим тизимини рақамли авлодга мослаштириш концепцияси. Европа Иттифоқи Эрасмус+ дастурининг кўмагида. https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/pimages/34/3_UZBEKISTAN-CONCEPT-UZ.pdf

48. Современные образовательные технологии: педагогика и психология: монография. Книга 16 / О.К. Асекретов, Б.А. Борисов, Н.Ю. Булгакова и др. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 318 с. <http://science.vvsu.ru/files/5040BC65-273B-44BB-98C4-CB5092BE4460.pdf>

49. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш.–Т.: “ТКТИ” нашриёти, 2019.

IV. Интернет сайтлар

50. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги: www.edu.uz.

51. Бош илмий-методик марказ: www.bimm.uz

52. www.Ziyonet.Uz

53. Открытое образование. <https://openedu.ru/>

54. <https://www.ucl.ac.uk/ioe/courses/graduate-taught/mathematics-education-ma>

55. <https://www.onlinestudies.com/Courses/Mathematics/Europe/>

56. <https://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=mathematics-&op=Search>

57. <https://www.msu.ru/en/projects/proekt-vernadskiy/news/math-teachers-advanced-training.html>

58. <https://english.spbu.ru/education/graduate/master-in-english/90-program-master/2455-advanced-mathematics>.